

Navodilo za uporabo

SCANDONEST 20 mg/0,01 mg v 1 ml raztopina za injiciranje mepivakainijev klorid/adrenalin

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte s svojim zobozdravnikom.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zobozdravnikom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo SCANDONEST in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo SCANDONEST
3. Kako uporabljati zdravilo SCANDONEST
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila SCANDONEST
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo SCANDONEST in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo SCANDONEST je lokalni anestetik indiciran za anestezijo pri zobozdravstvenih posegih pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starejših od 4 let (telesna masa približno 20 kg).

Zdravilo SCANDONEST vsebuje lokalni anestetik mepivakain in vazokonstriktor adrenalin.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo SCANDONEST

Ne uporabljajte zdravila SCANDONEST:

- če ste alergični na mepivakain ali adrenalin ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če ste alergični na druge lokalne anestetike amidnega tipa,
- pri otrocih, mlajših od 4 let (telesna masa približno 20 kg).

Zaradi prisotnosti anestetika mepivakaina, ne uporabljajte tega zdravila:

- če imate zelo neenakomerno bitje srca zaradi nenormalne električne aktivnosti srca,
- če imate epilepsijo, ki ni ustrezno nadzorovana z zdravljenjem.

Zaradi prisotnosti vazokonstriktorja adrenalina, ne uporabljajte tega zdravila:

- če imate slabo urejeno/hudo hipertenzijo (visok krvni tlak)
- če imate hudo srčno popuščanje (ishemično srčno bolezen),
- če se pri vas pojavlja hitro nenormalno bitje srca (tahiaritmija),
- če imate močno povečano delovanje ščitnice (tirotoksikozo),
- če imate feokromocitom (tumor nadledvične žleze).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila SCANDONEST se posvetujte z zobozdravnikom:

- če imate težave s krvnimi žilami (npr. zoženje in otrditev arterij, ki s krvjo oskrbujejo noge in stopala),
- če se pri vas pojavljajo motnje srčnega ritma (aritmija),
- če imate srčno popuščanje,
- če imate nizek krvni tlak (hipotenzijo),
- če imate epilepsijo,

- če imate bolezen jeter,
- če imate bolezen ledvic,
- če se zdravite z zaviralci agregacije trombocitov/antikoagulanti,
- če imate bolezen, ki prizadene živčni sistem in se kaže v nevroloških motnjah (porfirija),
- če imate nenadzorovano sladkorno bolezen,
- če imate bolezen, imenovano glavkom ozkega zakotja, ki prizadene oči,
- če ste starejši od 70 let,
- če imate vnetje ali okužbo na predelu, kamor se bo injiciralo zdravilo.

Druga zdravila in zdravilo SCANDONEST

Obvestite zobozdravnika, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. To je še posebej pomembno, če jemljete spodaj navedena zdravila, saj mora zobozdravnik upoštevati previdnostne ukrepe:

- druge lokalne anestetike, ker obstaja tveganje za aditivno medsebojno delovanje
- pomirjevala, v tem primeru je potrebna prilagoditev odmerka anestetika
- zdravila za zdravljenje zgage in želodčnih razjed (kot je cimetidin),
- zdravila za srce in krvni tlak (npr. gvanadrel, gvanetidin in zaviralce adrenergičnih receptorjev beta kot sta propranolol in nadolol),
- sočasna uporaba določenih antibiotikov (kot so fluorokinoloni, ciprofloksacin), antiaritmikov (kot so verapamil, zdravila za zdravljenje srčnega popuščanja (na primer zaviralci kalcijevih kanalčkov)) ali določenih antidepresivov (selektivni zaviralci privzema serotonina),
- nekatere anestetike, ki se inhalirajo,
- triciklične antidepresive, ki jih uporabljamo za zdravljenje depresije (kot so amitriptilin, dezipramin, imipramin, nortriptilin, maprotilin in protriptilin),
- zaviralce MAO, ki jih uporabljamo za zdravljenje depresije in anksioznosti (kot so brofaromin, moklobemid, toloksaton, fenelzin, tranilcipromin, linezolid),
- zaviralce COMT, ki jih uporabljamo za zdravljenje Parkinsonove bolezni (kot sta entakapon ali tolkapon),
- zdravila z adrenergično-serotoninergičnim učinkom, ki se uporabljajo za zdravljenje depresije, obsesivno-kompulzivne motnje in anksioznosti (kot so venlafaksin, milnacipran, sertralin),
- zdravila za zdravljenje motenj srčnega ritma (npr. digitalis, kinidin),
- zdravila za zdravljenje napadov migrene (kot sta metizergid ali ergotamin),
- simpatikomimetični vazopresorji, kot je oksimetazolin, ki jih uporabljamo za zdravljenje otekline ali vnetja nosne sluznice,
- druge simpatomimetike,
- nevroleptike (npr. fenotiazin).

Če ste v zadnjih 24 urah uporabili kokain, je načrtovani zobozdravstveni poseg treba odložiti.

Zdravilo SCANDONEST skupaj s hrano

Ne žvečite žvečilnih gumijev in ne uživajte hrane dokler se po uporabi tega zdravila ne povrne normalna čutna zaznava. V nasprotnem primeru obstaja tveganje ugriza v ustnice, lica ali jezik, še posebej pri otrocih.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zobozdravnikom, zdravnikom ali farmacevtom preden vzamete to zdravilo.

Iz previdnostnih ukrepov se je med nosečnostjo uporabi tega zdravila bolje izogibati.

Doječe matere naj ne dojijo 10 ur po anesteziji s tem zdravilom.

Ni podatkov o vplivu zdravila na plodnost pri človeku.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Mepivakain v kombinaciji z adrenalinom ima lahko blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Omotica (vključno z vrtoglavico, motnjami vida in utrujenostjo) se lahko pojavi po uporabi tega zdravila (glejte poglavje 4. Možni neželeni učinki). V primeru pojava navedenih simptomov ne

smete voziti vozil ali upravljati strojev, dokler ti simptomi popolnoma ne izzvenijo.

Zdravilo SCANDONEST vsebuje natrij in kalijev metabisulfit (E224)

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na vložek, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

To zdravilo vsebuje kalijev metabisulfit (E224): Redko lahko povzroči resne preobčutljivostne reakcije in bronhospazem.

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (39 mg) kalija na vložek, kar v bistvu pomeni "brez kalija".

3. Kako uporabljati zdravilo SCANDONEST

Le zobozdravniki in drugi strokovnjaki s področja stomatologije lahko uporabljajo zdravilo SCANDONEST, v obliki počasne lokalne injekcije.

Zobozdravnik vam bo razložil zakaj bo uporabil zdravilo SCANDONEST. Zobozdravnik bo prilagodil odmerjanje glede na vašo leta, telesno maso, zdravstveno stanje in zobozdravstveni poseg.

Uporabiti je treba najmanjši odmerek, ki zagotovi učinkovito anestezijo.

To zdravilo se daje v obliki injekcije v ustno votlino.

Uporaba pri otrocih

Posebno pozornost je potrebna pri zdravljenju otrok.

Zobozdravniki bodo prilagodili odmerjanje glede na starost, telesno maso otroka in zobozdravstveni poseg. Uporabili bodo neboleče postopke anestezije ter skrbno spremljali otrokovo vedenje med zdravljenjem.

Uporaba pri posebnih skupinah bolnikov

Zaradi pomanjkanja kliničnih podatkov je potrebna posebna pozornost pri odmerjanju, da se uporabi najmanjši odmerek, ki zagotovi učinkovito anestezijo, pri:

- starejših oseb
- bolnikov z okvaro ledvic ali jeter

Če je zobozdravnik uporabil večji odmerek zdravila SCANDONEST, kot bi smel

Če se pojavijo znaki akutne sistemske toksičnosti, je injiciranje zdravila treba takoj prekiniti in začeti z nujno medicinsko pomočjo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zobozdravnikom, zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pogosti neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- glavobol,
- neprijetni občutki ob hitrem in močnem utripanju srca (palpitacija),
- nizek krvni tlak (hipotenzija), visok krvni tlak (hipertenzija),
- bledica,
- nezmožnost normalno odpreti usta (trizmus).

Redki neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- preobčutljivostne reakcije (alergijske ali alergijam podobne reakcije),
- bolečina zaradi poškodbe živcev (nevropatska bolečina),
- nenormalen občutek v ustih in njihovi okolici (hipestezija),
- kovinski okus, spremenjen okus ali izguba okusa (paragevzija),
- Hornerjev sindrom – kombinacija povešenosti očesne veke in zoženja zenice,

- pomik očesnega zrkla nazaj v orbito zaradi sprememb volumna orbite, kar imenujemo enoftalmus,
- tresenje,
- nehotni gibi očesnih zrkel (nistagmus),
- omotica (rahla vrtočlavica),
- okvara vida, zamegljen vid, težave z izostritvijo predmeta,
- težave s koordinacijo srčnega utripa (motnje prevajanja, atrioventrikularni blok), nenormalno počasno bitje srca (bradikardija), nenormalno hitro bitje srca (tahikardija),
- oteženo dihanje (dispneja),
- težave pri dihanju, piskajoče dihanje (bronhospazem, astma),
- siljenje na bruhanje, bruhanje,
- pekoč občutek, zbadajoč občutek na koži, mravljinčenje brez očitnega fizičnega razloga v okolici ust in ustih (parestezija),
- angioedem (obraza/jezika/ustnic/žrela/grla/periorbitalni edem),
- izpuščaj, srbenje (pruritus), koprivnica (urtikarija), rdečica (eritem),
- bolečina na mestu injiciranja, hematoma na mestu injiciranja,
- bolečina med/po postopku, poškodba živca.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- vnetje dlesni (gingivitis),
- zmedenost, dezorientiranost,
- tesnoba, nervoznost, vznemirljivost, nemir,
- pretirano dobro razpoloženje (evforično razpoloženje), prekomerna zgovornost,
- izguba zavesti, koma, krči, presinkopa/sinkopa, motnje ravnotežja, motnje govora, zaspanost, slepota (amavroza), dvojni vid (diplopija), razširjenost zenice (midriaza), zoženje zenice (mioza),
- občutek nelagodja v ušesih, zvenenje v ušesih (tinitus), prevelika občutljivost na neznatno glasnost (hiperakuzija), vrtočlavica,
- srčni zastoj, depresija miokarda, hiter in nereden srčen utrip (tahiaritmija), napad hude bolečine v prsnem košu za prsnico (angina pectoris),
- širjenje krvnih žil (vazodilatacija), ožjenje krvnih žil (vazokonstrikcija),
- depresija dihanja, zastoj dihanja (apneja), pomanjkanje preskrbe s kisikom v krvi (hipoksija), zvečana frekvenca dihanja (tahipneja), nenormalno nizka frekvenca dihanja (bradipneja), povečana količina ogljikovega dioksida v krvi (hiperkapnija), zehanje, hripavost (disfonija),
- razjede v ustih ali na dlesni, oteklost jezika, ustnic ali dlesni,
- prekomerno izločanje slin,
- čezmerno znojenje (hiperhidroza),
- trzanje mišic,
- oteklina na mestu injiciranja,
- utrujenost, slabo počutje, nelagodje,
- mrzlica (drgetanje),
- težave pri požiranju,
- občutek vročine ali občutek mraza,
- šibkost.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zobozdravnikom, zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanja zdravila SCANDONEST

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne zamrzujte.

Vložke shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake »EXP:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravilo je treba uporabiti takoj po odprtju vložka. Raztopina mora biti bistra in brezbarvna. Vložki so za enkratno uporabo. Neuporabljeno raztopino v vložku morate zavreči.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo SCANDONEST

Učinkovini sta mepivakainijev klorid in adrenalin.

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 20 mg mepivakainijevega klorida in 0,01 mg adrenalina.

En vložek z 1,8 ml raztopine za injiciranje vsebuje 36 mg mepivakainijevega klorida in 0,018 mg adrenalina.

Druge sestavine zdravila so natrijev klorid, kalijev metabisulfit (E224), dinatrijev edetat, klorovodikova kislina (za uravnavanje pH), natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) in voda za injekcije.

Izgled zdravila SCANDONEST in vsebina pakiranja

To zdravilo je bistra in brezbarvna raztopina za injiciranje.

Na trgu je škatla s 50 vložki po 1,8 ml raztopine za injiciranje.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila SCANDONEST

ZZ – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

SEPTODONT

58 rue du Pont de Créteil

F - 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Tel. + 33 (0)1 49 76 70 00

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 07.11.2022.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Odrasli

Ker je zaznavanje bolečine odvisno od posameznikove občutljivosti, je treba uporabiti najmanjši odmerek, ki zagotovi učinkovito anestezijo.

Pri rutinskem posegu je običajen odmerek za odraslega bolnika 1 vložek, vendar pa je lahko učinkovita anestezija zagotovljena že z manjšim odmerkom. Zobozdravnik lahko presodi, da je za obsežnejše posege potrebnih več vložkov, vendar se pri tem ne sme preseči največjega priporočenega odmerka.

Največji odmerek uporabljen v submukozni infiltraciji in/ali za živčni blok pri zdravem odraslem s telesno maso 70 kg ne sme preseči 4,4 mg/kg (0,22 ml/kg) telesne mase, absolutni odmerek pa ne sme preseči 300 mg mepivakainijevega klorida na en poseg.

Največji priporočeni odmerki so navedeni v naslednji preglednici glede na količino v vložku in bolnikovo telesno maso.

Masa (kg)	Odmerek mepivakainijevega klorida (mg)	Odmerek adrenalina (mg)	Količina (ml)	Ekvivalent v številu vložkov (1,8 ml)
50	220	0,110	11,0	6
60	264	0,132	13,2	7
70 in več	300	0,150	15,0	8

Pediatrična populacija

Zdravilo SCANDONEST je kontraindicirano pri otrocih do 4. leta starosti (telesna masa približno 20 kg).

Priporočeni terapevtski odmerek:

Količino za injiciranje je treba določiti glede na otrokovo starost in telesno maso ter velikost operacije. Povprečen odmerek je 0,75 mg/kg = 0,025 ml raztopine mepivakaina na kilogram telesne mase.

Posebna previdnost je potrebna pri zdravljenju pediatrične populacije. Postopek anestezije je treba skrbno izbrati, bolečim postopkom anestezije pa se je treba izogibati. Vedenje otrok med zdravljenjem je treba skrbno spremljati.

Pri rutinskem posegu je običajen odmerek 1 vložek, vendar pa je lahko učinkovita anestezija zagotovljena že z manjšim odmerkom. Zobozdravnik lahko presodi, da je za obsežnejše posege potrebnih več vložkov, vendar se pri tem ne sme preseči največjega priporočenega odmerka.

Največji priporočeni odmerek:

Ne sme preseči ekvivalenta 3 mg mepivakaina/kg (0,15 ml mepivakainijevega klorida/kg) telesne mase.

Spodnja preglednica prikazuje največji priporočeni odmerek:

Masa (kg)	Odmerek mepivakainijevega klorida (mg)	Odmerek adrenalina (mg)	Količina (ml)	Ekvivalent v številu vložkov (1,8 ml)
20	60	0,03	3	2
30	90	0,045	4,5	2
40	120	0,06	6	3
50	150	0,075	7,5	4

Posebne skupine bolnikov

Zaradi pomanjkanja kliničnih podatkov je potrebna posebna pozornost pri odmerjanju, da se uporabi najmanjši odmerek, ki zagotovi učinkovito anestezijo, pri:

- starejših oseb,

- bolnikov z okvaro ledvic ali jeter.

Način uporabe

Infiltracija in perinevralna uporaba v ustni votlini.

Pred vsakim injiciranjem je priporočljivo izvesti aspiracijo, da se prepreči intravaskularno injiciranje.

Večjim sistemskim reakcijam, ki so posledica nenamernega intravaskularnega injiciranja, se lahko v večini primerov izognemo s postopkom injiciranja s počasno injekcijo po aspiraciji: hitrost injiciranja ne sme preseči 1 ml raztopine na minuto.

Za preprečitev tveganja za okužbo (npr. prenos hepatitisa) morate pri vsaki aplikaciji raztopine uporabiti novo in sterilno injekcijsko brizgo in iglo.

Za enkratno uporabo. Neuporabljeno raztopino je treba zavreči.

Če je raztopina motna in obarvana, zdravila ne smete uporabljati.

Previdnostni ukrepi

Pred uporabo tega zdravila je pomembno:

- vprašati, ali ima bolnik diatezo, ter poizvedeti o trenutnem zdravljenju in anamnezi.
- ohraniti verbalni stik z bolnikom.
- imeti pri roki opremo za reanimacijo (glejte poglavje Preveliko odmerjanje).

Tveganje povezano z nenamernim intravaskularnim injiciranjem:

Naključno injiciranje v žilo (npr. nenamerno intravensko injiciranje v sistemski obtok, nenamerno intravensko ali intraarterijsko injiciranje v predelu glave ali vratu) lahko spremljajo resni neželeni učinki, npr. krči, ki jim sledijo depresija osrednjega živčevja in kardiorespiratorna depresija ter koma, ki zaradi nenadne velike koncentracije mepivakaina v sistemskem obtoku napreduje do respiratornega zastoja.

Za zagotovitev, da igla pri vbodu ni predrila krvne žile, je pred injiciranjem lokalnega anestetika treba izvesti aspiracijo. Vendar pa odsotnost krvi v injekcijski brizgi ne zagotavlja, da ne bo prišlo do intravaskularnega injiciranja.

Tveganje povezano z intranevralnim injiciranjem:

Nenamerno intranevralno injiciranje lahko povzroči retrogradno potovanje zdravila po živcu.

Za preprečitev intranevralnega injiciranja in preprečitev okvare živca pri živčnih blokadah je iglo treba vedno nekoliko izvleči, če bolnik ob vbodu občuti električni šok ali če je vbod še posebej boleč. V primeru poškodbe živca z iglo se lahko poslabša nevrotoksični učinek mepivakaina zaradi njegove možne kemične nevrotoksičnosti in prisotnosti adrenalina, ki lahko zmanjša perinevralno oskrbo s krvjo in prepreči lokalno izpiranje mepivakaina.

Tveganje za takotsubo kardiomiopatijo ali stresno kardiomiopatijo:

Poročali so o stresni kardiomiopatiji, inducirani z injiciranjem kateholaminov.

Zaradi vsebnosti adrenalina sta v naslednjih primerih potrebna posebna previdnost in spremljanje bolnikov: pri bolnikih, ki so pod stresom pred zobozdravstvenimi posegi ali pri pogojih uporabe, ki lahko prispevajo k spodbujanju sistema prehoda adrenalina (npr. pri uporabi večjega odmerka od priporočenega ali v primeru nenamernega intravaskularnega injiciranja).

Pri bolnikih, ki potrebujejo anestezijo, je potrebno upoštevati prisotne pogoje in uporabiti najmanjši odmerek lokalnega anestetika z vazokonstriktorjem.

Preveliko odmerjanje

Vrste prevelikega odmerjanja

Preveliko odmerjanje lokalnega anestetika se v širšem smislu pogosto uporablja za opis:

- absolutnega prevelikega odmerjanja
- relativnega prevelikega odmerjanja, kot je:
 - o nenamerno injiciranje v krvno žilo,
 - o neobičajno hitra absorpcija v sistemski krvni obtok,
 - o upočasnjena presnova in izločanje zdravila.

Simptomatika

o Zaradi mepivakaina:
 Simptomi so odvisni od odmerka, njihova resnost pa se postopoma večja. Simptomi obsegajo nevrološke znake, ki jim sledijo znaki toksičnosti za ožilje, dihala in nazadnje znaki toksičnosti za srce (za več informacij glejte poglavje 4).

o Zaradi adrenalina:
 Preveliko odmerjanje adrenalina lahko povzroči kardiovaskularne učinke.

Zdravljenje prevelikega odmerjanja

Pred začetkom dentalne anestezije z lokalnimi anestetiki je treba razpolagati z vso potrebno opremo za reanimacijo.

V primeru suma na pojav znakov akutne toksičnosti je treba injiciranje tega zdravila nemudoma prekiniti.

Bolniku je nemudoma treba zagotoviti kisik, po potrebi z asistirano ventilacijo. Bolnika je po potrebi treba namestiti v ležeči položaj na hrbtu.

V primeru srčnega zastoja je nemudoma treba začeti s kardiopulmonalno reanimacijo.

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Kot pri vseh vložkih je potrebno membrano pred uporabo razkužiti. Pozorno jo obrišite:

- s 70 % etanolom ali
- z 90 % čistim izopropilnim alkoholom za farmacevtsko uporabo.

Vložkov ne smete potopiti v katero koli raztopino.

Posamezen vložek se lahko uporabi samo za enega bolnika za en poseg.

Raztopine lokalnega anestetika iz že odprtega vložka se ne sme ponovno uporabiti. Neporabljeno raztopino v vložku morate zavreči.

Neuporabljen zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.