



Maridol

paracetamol svečke 500 mg

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če povišana temperatura traja več kot 3 dni, bolečine več kot 5 dni, bolečine v žrelu več kot 2 dni ali pa se med jemanjem zdravila znaki vaše bolezni celo poslabšajo, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Maridol paracetamol svečke 500 mg in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Maridol paracetamol svečke 500 mg
3. Kako uporabljati zdravilo Maridol paracetamol svečke 500 mg
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO MARIDOL PARACETAMOL SVEČKE 500 MG IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Maridol paracetamol svečke 500 mg vsebujejo paracetamol. Paracetamol lajša bolečine in znižuje povišano telesno temperaturo.

Maridol paracetamol svečke 500 mg priporočamo za zniževanje povišane telesne temperature (vročine) ter za lajšanje blagih ali zmernih bolečin (zobobol, glavobol, bolečine po poškodbah, pri gripi in prehladu).

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO MARIDOL PARACETAMOL SVEČKE 500 MG

Ne uporabljajte zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg

Ne uporabljajte zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) katerokoli sestavino zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg,
- če imate prirojeno pomanjkanje encima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (redka dedna bolezen rdečih krvničk),
- če imate hudo jetrno okvaro ali ledvično odpoved.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg

Pred uporabo zdravila se posvetujte z zdravnikom, če imate blago ali zmerno jetrno ali ledvično okvaro.

Dolgotrajnejša uporaba paracetamola lahko povzroči motnje v delovanju ledvic in jeter, zato je tudi v tem primeru potreben posvet z zdravnikom.

Paracetamol lahko prikrije znake infekcijskih bolezni.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Paracetamol vsebujejo tudi nekatera druga zdravila, zato teh zdravil ne smete jemati sočasno, ker lahko presežete največji priporočeni odmerek.

Opozorite zdravnika ali farmacevta, če jemljete antiepileptike (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin), izoniazid, metoklopramid, domperidon,olestiramin, rifampicin, kloramfenikol, zdravila proti strjevanju krvi (npr. varfarin) ali zidovudin.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO MARIDOL PARACETAMOL SVEČKE 500 MG

Pri uporabi zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če zdravnik ali farmacevt ne svetujeta drugače, upoštevajte naslednja navodila za odmerjanje

Otroci, stari od 6 do 12 let: 1 svečka 2 do 3-krat dnevno.
Mladostniki, stari več kot 12 let: 1 svečka 3-krat dnevno.
Odrasli: 1 do 2 svečki 3 do 4-krat dnevno.

Dvojni trak (ovoj) pretrgajte po zarezi, izluščite svečko in jo vstavite v prazno danko.

Če se svečke zmehčajo, jih pred odpiranjem ovoja splaknite z mrzlo vodo ali pustite nekaj časa v hladilniku ter šele potem uporabite.

Predpisanega odmerka ne smete prekoračiti.

Presledek med posameznimi odmerki mora biti najmanj 4 ure.

Učinek nastopi v 15 do 60 minutah in traja do 6 ur.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Preveliki odmerki lahko povzročijo slabost, bruhanje, utrujenost in povečano aktivnost jetrnih encimov (kar ugotovimo s pomočjo laboratorijske preiskave). Hujše zastrupitve s paracetamolom, pri katerih nastopi slabost, bruhanje, zlatenica in huda jetrna ter ledvična okvara, so glede na način uporabe malo verjetne.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Maridol paracetamol svečke 500 mg

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Maridol paracetamol svečke 500 mg, ga vzemite takoj, ko se spomnite. Če je že skoraj čas za naslednji odmerek, pozabljeni odmerek izpustite in nadaljujte z jemanjem zdravila po navodilu naprej.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Maridol paracetamol svečke 500 mg neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg se lahko pojavijo kljub temu, da ste zdravilo uporabljali pravilno in v predpisanih odmerkih. Najpogostejša neželena učinka sta rdečica in/ali koprivnica. Če se pojavita, zdravljenje prekinite in se takoj posvetujte z zdravnikom.

V redkih primerih so zasledili utrujenost, zlatenico, povečano aktivnost jetrnih encimov, slabost, bruhanje, lokalno draženje črevesne sluznice ter spremembe v krvni sliki.

Če se pojavi katerikoli neželeni učinek, prenehajte z jemanjem in se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA MARIDOL PARACETAMOL SVEČKE 500 MG

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte zaščiteno pred svetlobo v originalni ovojni.

Rok uporabnosti

Zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojni poleg oznake »Uporabno do:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Maridol paracetamol svečke 500 mg

Zdravilna učinkovina je paracetamol (Paracetamololum). Pomožna snov je trda mast (Adeps solidus).

1 svečka vsebuje 500 mg paracetamola.

Videz zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg in vsebina pakiranja

Zdravilo Maridol paracetamol svečke 500 mg so svečke bele barve. V škatli je 2-krat po 5 svečk v dvojnem traku.

Način in režim izdaje zdravila Maridol paracetamol svečke 500 mg

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Proizvajalec in izdelovalec
Mariborske lekarne Maribor
Minařikova ulica 6, Maribor

Zdravilo Maridol paracetamol svečke 500 mg je galenski izdelek, izdelan v OE Galenski laboratorij.

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na Službo za raziskave in razvoj proizvajalca:

Služba za raziskave in razvoj, Mariborske lekarne Maribor
Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor
telefon: + 386 (0)2 2208211, e-pošta: info@mb-lekarne.si

Datum zadnje revizije besedila: 4. april 2008