

NAVODILO ZA UPORABO

Ramilife HCT 5 mg/12,5 mg tablete

ramipril/hidroklorotiazid

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Ramilife HCT in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ramilife HCT
3. Kako jemati zdravilo Ramilife HCT
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Ramilife HCT
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Ramilife HCT in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Ramilife HCT je kombinacija dveh zdravilnih učinkovin, ramiprila in hidroklorotiazida. Ramipril spada v skupino zdravil, imenovanih "zaviralci ACE" (zaviralci angiotenzinske konvertaze). Deluje tako, da:

- v telesu zmanjša nastajanje določenih snovi, ki zvišujejo krvni tlak,
- sprosti in razširi žile,
- olajša srcu črpanje krvi po telesu.

Hidroklorotiazid spada v skupino zdravil, imenovanih "tiazidni diuretiki" ali tablete za odvajanje vode. Deluje tako, da poveča nastajanje vode (urina). To zniža krvni tlak.

Zdravilo Ramilife HCT se uporablja za zdravljenje visokega krvnega tlaka. Obe zdravilni učinkovini delujeta skupaj in znižata krvni tlak. Skupaj se uporabljata, če zdravljenje z eno samo od njiju ni bilo učinkovito.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ramilife HCT

Ne jemljite zdravila Ramilife HCT:

- če ste alergični na ramipril, hidroklorotiazid ali katerokoli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če ste alergični na zdravila, podobna zdravilu Ramilife HCT (druge zaviralce ACE ali zdravila iz skupine sulfonamidov).
- Med znaki alergijske reakcije so lahko izpuščaj, težave s požiranjem ali dihanjem, oteklost ustnic, obraza, žrela ali jezika.
- če ste kdaj imeli resno alergijsko reakcijo, imenovano "angioedem". Med njenimi znaki so srbenje, koprivnica (urtikarija), rdeče spremembe na rokah, stopalih in v žrelu, oteklost žrela in jezika, oteklost okrog oči in ustnic, težko dihanje in težko požiranje.
- če se zdravite z dializo ali kakšno drugo vrsto filtracije krvi. Odvisno od naprave, ki se za to uporablja, zdravilo Ramilife HCT morda ni primerno za vas.

- če imate hude težave z jetri.
- če imate nenormalno količino soli (kalcija, kalija, natrija) v krvi.
- če imate težave z ledvicami, pri katerih je zmanjšana preskrba s krvjo (zožitev ledvične arterije).
- v zadnjih 6 mesecih nosečnosti (glejte poglavje spodaj »Nosečnost in dojenje«).
- če dojite (glejte poglavje spodaj "Nosečnost in dojenje").
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za znižanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren.

Če kaj od naštetega velja za vas, ne jemljite zdravila Ramilife HCT. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete zdravilo Ramilife HCT.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred vzamete to zdravilo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate težave s srcem, jetri ali ledvicami.
- če ste izgubili veliko telesnih soli ali tekočin (zaradi slabosti (bruhanja), driske, močnejšega znojenja kot običajno, uživanja diete z malo soli, dolgotrajnega jemanja diuretikov (tablet za odvajanje vode) ali dialize).
- če imate predvideno zdravljenje za odpravljanje alergije na pike čebel ali os (desenzibilizacijo).
- če boste dobili anestetik. Dobite ga lahko za operacijo ali kakšen zobozdravstveni poseg. Morda boste morali en dan pred tem nehati jemati zdravilo Ramilife HCT; o tem se posvetujte s svojim zdravnikom.
- če imate v krvi veliko kalija (to pokaže preiskava krvi).
- če jemljete zdravila ali imate stanja, ki lahko znižajo raven natrija v krvi. Vaš zdravnik bo morda opravljal redne krvne preiskave, zlasti za preverjanje ravni natrija v krvi, še posebej če ste starejši.
- če imate kakšno kolagensko žilno bolezen, npr. sklerodermo ali sistemski eritematozni lupus.
- Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči ali če načrtujete nosečnost. Uporaba zdravila Ramilife HCT ni priporočljiva v zgodnjem obdobju nosečnosti, uporaba po tretjem mesecu nosečnosti pa lahko povzroči resno škodo vašemu otroku (glejte poglavje spodaj »Nosečnost in dojenje«).
- Zdravilna učinkovina hidroklorotiazid lahko povzroči nenavadne reakcije, kar ima za posledico zmanjšanje vida in bolečine v očeh. To so lahko znaki povečanja pritiska v očesu in se lahko pojavijo po nekaj urah do nekaj tednih jemanja zdravila Ramilife HCT. Če tega ne zdravimo, lahko pride do trajne okvare vida.
- če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
 - antagonist receptorjev angiotenzina II (AIIRA) (ta zdravila imenujemo tudi "sartani" – mednje spadajo na primer valsartan, telmisartan in irbesartan), še zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo.
 - aliskiren.

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija) v krvi.

Glejte tudi informacije pod naslovom "Ne jemljite zdravila Ramilife HCT".

Otroci in mladostniki

Zdravilo Ramilife HCT ni priporočljivo za otroke in mladostnike, mlajše od 18 let, ker v teh starostnih skupinah še nikoli ni bilo uporabljeno.

Če kaj od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete zdravilo Ramilife HCT.

Druga zdravila in Ramilife HCT

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta (vključno z zeliščnimi

zdravili). Zdravilo Ramilife HCT namreč lahko vpliva na delovanje nekaterih drugih zdravil. Tudi nekatera zdravila lahko vplivajo na delovanje zdravila Ramilife HCT.

Zdravnika morate obvestiti, če jemljete katero od naslednjih zdravil. Naslednja zdravila lahko poslabšajo delovanje zdravila Ramilife HCT:

- zdravila proti bolečinam in vnetju (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID)), kakršna so ibuprofen, indometacin in acetilsalicilna kislina).
- zdravila za zdravljenje nizkega krvnega tlaka, šoka, srčnega popuščanja, astme ali alergij, npr. efedrin, noradrenalin ali adrenalin. Zdravnik vam bo moral kontrolirati krvni tlak.

Zdravnika morate obvestiti, če jemljete katero od naslednjih zdravil, saj lahko povečajo možnost neželenih učinkov, če jih jemljete skupaj z zdravilom Ramilife HCT:

- zdravila proti bolečinam in vnetju (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID)), kakršna so ibuprofen, indometacin in acetilsalicilna kislina)
- zdravila, ki lahko zmanjšajo količino kalija v krvi. Med takšnimi so zdravila proti zaprtju, diuretiki (tablete za odvajanje vode), amfotericin B (uporablja se za zdravljenje glivičnih okužb) in ACTH (uporablja se za preverjanje, ali nadledvične žleze dobro delujejo)
- zdravila proti raku (kemoterapija)
- zdravila za težave s srcem, vključno z motnjami srčnega ritma
- zdravila za preprečitev zavrnitve organov po presaditvi (npr. ciklosporin)
- diuretiki (tablete za odvajanje vode), npr. furosemid
- zdravila, ki lahko povečajo količino kalija v krvi, npr. spironolakton, triamteren, amilorid, kalijeve soli in heparin (uporablja se za redčenje krvi)
- steroidna zdravila proti vnetju, npr. prednizolon
- dodatki kalcija
- alopurinol (uporablja se za zniževanje sečne kisline v krvi)
- prokainamid (proti motnjam srčnega ritma)
- olestiramin (za znižanje maščob v krvi)
- karbamazepin (za epilepsijo)
- trimetoprim in kotrimoksazol (za zdravljenje bakterijskih okužb)
- tensirolimus (za zdravljenje raka)
- everolimus (za preprečevanje zavrnitve presadka)

Zdravnika morate obvestiti, če jemljete katero od naslednjih zdravil. Jemanje zdravila Ramilife HCT lahko vpliva na delovanje naslednjih zdravil:

- zdravila proti sladkorni bolezni, npr. peroralna zdravila za zniževanje glukoze in inzulin. Zdravilo Ramilife HCT lahko zniža količino krvnega sladkorja. Med jemanjem zdravila Ramilife HCT morate natančno preverjati količino krvnega sladkorja.
- litij (za duševne motnje). Zdravilo Ramilife HCT lahko poveča količino litija v krvi. Zdravnik vam bo moral natančno preverjati količino litija.
- zdravila za sproščanje mišic
- kinin (za malarijo)
- zdravila, ki vsebujejo jod; takšna zdravila se uporabljajo pri nekaterih rentgenskih slikanjih v bolnišnici
- penicilin (za okužbe)
- peroralna zdravila za redčenje krvi (peroralni antikoagulanti), npr. varfarin.
- vildagliptin (za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2)

Zdravnika morate obvestiti, če jemljete katero od naslednjih zdravil. Morda vam bo moral zdravnik spremeniti odmerke in/ali svetovati druge previdnostne ukrepe:

- če jemljete antagonist receptorjev angiotenzina II (AIIRA) ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovoma "Ne jemljite zdravila Ramilife HCT " in "Opozorila in previdnostni ukrepi").

Če kaj od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete zdravilo Ramilife HCT.

Preiskave

Predn vzamete to zdravilo, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom:

- če imate preiskavo delovanja obščitničnih žlez. Zdravilo Ramilife HCT lahko vpliva na rezultate te preiskave.
- če ste športnik, ki mora opraviti protidopinški preizkus. Zdravilo Ramilife HCT lahko povzroči pozitiven rezultat.

Zdravilo Ramilife HCT skupaj s hrano in pijačo

- Pitje alkoholnih pijač hkrati z jemanjem zdravila Ramilife HCT lahko povzroči omotico ali vrtoglavost. Če vas skrbi glede tega, koliko lahko popijete med jemanjem zdravila Ramilife HCT, se posvetujte z zdravnikom. Učinki zdravil za zniževanje krvnega tlaka in alkohola se lahko seštevajo.
- Zdravilo Ramilife HCT lahko vzamete s hrano ali brez nje.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči ali če načrtujete nosečnost.

Zdravila Ramilife HCT naj ne bi jemali v prvih 12 tednih nosečnosti, od 13. tedna naprej pa ga sploh ne smete jemati, ker lahko njegova uporaba med nosečnostjo škoduje otroku.

Če zanosite med zdravljenjem z zdravilom Ramilife HCT takoj obvestite svojega zdravnika. V primeru načrtovanja nosečnosti je treba praviloma preiti na drugo vrsto zdravljenja proti zvišanemu krvnemu tlaku.

Zdravila Ramilife HCT ne smete jemati, če dojite.

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Med jemanjem zdravila Ramilife HCT se vam lahko pojavi omotica. Verjetnost tega je večja, ko začnete jemati zdravilo Ramilife HCT ali začnete jemati večji odmerek. Če se vam to zgodi, ne vozite in ne uporabljajte orodij oziroma strojev.

3. Kako jemati zdravilo Ramilife HCT

Pri jemanju zdravila Ramilife HCT natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Jemanje tega zdravila

- Zdravilo zaužijte peroralno vsak dan ob istem času; običajno zjutraj.
- Tablete pogoltnite s tekočino.
- Tableto lahko razdelite na dva enaka odmerka.

Priporočeni odmerek je:

Zdravljenje visokega krvnega tlaka

Zdravnik vam bo prilagajal količino zdravila, dokler vaš krvni tlak ne bo urejen.

Starejši

Zdravnik bo zmanjšal začetni odmerek in bo bolj počasi prilagajal vaše zdravljenje.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Ramilife HCT, kot bi smeli

Takoj se posvetujte z zdravnikom ali pojdite v ambulantno za nujno pomoč najbližje bolnišnice. Ne vozite v bolnišnico sami! Pelje naj vas nekdo drug ali pokličite reševalce. S seboj vzemite ovojnino zdravila. Tako bo zdravnik lahko vedel, kaj ste vzeli.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Ramilife HCT

- Če ste pozabili vzeti odmerek, vzemite običajni odmerek, ko je čas za naslednjega.
- Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom .

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od naslednjih resnih neželenih učinkov, nehajte jemati zdravilo Ramilife HCT in nemudoma pojdite k zdravniku. Morda boste potrebovali nujno zdravniško pomoč.

- Oteklost obraza, ustnic ali žrela, ki otežijo požiranje ali dihanje, ali srbenje in izpuščaje. To je lahko znak hude alergijske reakcije na zdravilo Ramilife HCT.
- Med hudimi kožnimi reakcijami so izpuščaj, razjede v ustih, poslabšanje že obstoječe bolezni kože, pordelost, mehurji ali odstopanje kože (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ali multiformni eritem).

Zdravnika morate nemudoma obvestiti, če se vam pojavijo:

- Hitrejše bitje srca, neenakomerno ali močno bitje srca (palpitacije), bolečine v prsih, tiščanje v prsih ali resnejše težave, vključno s srčnim infarktom in možgansko kapjo.
- Kratka sapa, kašelj, povišana telesna temperatura, ki traja od 2 do 3 dni, in občutek manjše lakote. To so lahko znaki težav s pljuči, vključno z vnetjem.
- Večja nagnjenost k podplutbam, dolgotrajnejše krvavitve kot običajno, kakršnekoli krvavitve (npr. krvavitev iz dlesni), vijoličaste pike, madeži na koži ali večja nagnjenost k okužbam kot običajno, vnetje žrela in povišana telesna temperatura, utrujenost, omedlevica, omotica ali bledica. To so lahko znaki težav s kostnim mozgom.
- Huda bolečina v želodcu, ki lahko sega v hrbet. To je lahko znak pankreatitisa (vnetja trebušne slinavke).
- Povišana telesna temperatura, mrzlica, utrujenost, izguba apetita, bolečine v želodcu, slabost, porumenelost kože ali očesnih beločnic (zlatenica). To so lahko znaki težav z jetri, npr. hepatitisa (vnetja jeter) ali okvare jeter.

Med drugimi neželenimi učinki so:

Zdravniku morate povedati, če kateri od teh neželenih učinkov postane resen ali traja dlje kot le nekaj dni.

Pogosti (pojavijo se pri največ 1 od 10 bolnikov)

- glavobol, občutek šibkosti ali utrujenosti
- omotica. Verjetnost tega je večja, ko začnete jemati zdravilo Ramilife HCT ali začnete jemati večji odmerek.
- suh, dražeč kašelj ali bronhitis
- preiskave krvi, ki kažejo več sladkorja v krvi kot običajno. Če imate sladkorno bolezen, vam jo to lahko poslabša.
- preiskave krvi, ki kažejo več sečne kisline ali maščob v krvi kot običajno
- boleči, rdeči in otekli sklepi

Občasni (pojavijo se pri največ 1 od 100 bolnikov)

- izpuščaj na koži, z dvignjenim predelom ali brez njega
- zardevanje, omedlevica, hipotenzija (nenormalno nizek krvni tlak), zlasti če hitro vstanete iz ležečega ali sedečega položaja
- težave z ravnotežjem (vrtoглаvica)
- srbenje in neobičajne zaznave na koži, npr. otrplost, mravljinčenje, zbadanje, pekoč ali gomazeč občutek na koži (parestezije)
- poslabšanje okušanja ali spremenjeno zaznavanje okusov
- težave s spanjem

- potrtost, tesnoba, izrazitejša živčnost kot običajno ali nemir
- zamašenost nosu, vnetje obnosnih votlin (sinuzitis), kratka sapa
- vnetje dlesni (gingivitis), oteklost ust
- rdeče, srbeče, otekle ali solzeče se oči
- zvonjenje v ušesih
- zamegljen vid
- izpadanje las
- bolečine v prsih
- bolečine v mišicah
- zaprtje, bolečine v želodcu ali trebuhu
- težave z želodcem ali občutek slabosti
- odvajanje več vode (urina) čez dan kot običajno
- močnejše znojenje kot običajno ali občutek žeje
- izguba ali zmanjšanje apetita (neješčnost), manjši občutek lakote
- hitrejše ali neredno bitje srca
- oteklost rok in nog. To je lahko znak, da se v telesu zadržuje več vode kot običajno
- povišana telesna temperatura
- spolna nezmožnost pri moških
- spremembe izvidov preiskav krvi, ki kažejo zmanjšanje števila eritrocitov, levkocitov ali trombocitov ali zmanjšanje količine hemoglobina
- spremembe izvidov preiskav krvi, ki kažejo delovanje jeter, trebušne slinavke ali ledvic
- preiskave krvi, ki kažejo manj kalija v krvi kot običajno

Zelo redki (pojavi se pri največ 1 od 10.000 bolnikov)

- slabost, driska ali zgaga
- rdeč, otekel jezik ali suha usta
- preiskave krvi, ki kažejo več kalija v krvi kot običajno

Pogostost neznana (pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov):

- koncentriran urin (temne barve), slabost ali bruhanje, mišični krči, zmedenost in epileptični krči, ki lahko nastanejo zaradi neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona. Če imate katerega od naštetih simptomov, takoj stopite v stik z zdravnikom.
- težave z zbranostjo, nemir ali zmedenost
- prsti na rokah in nogah spremenijo barvo, kadar ste na hladu, potem pa mravljinčijo ali bolijo, ko se ogrejejo. To je lahko Raynaudov pojav.
- povečanje prsi pri moških
- krvni strdki
- motnje sluha
- manj solzenja kot običajno
- poslabšanje vida in bolečine v očeh (možni so znaki akutnega glavkoma zaprtega zakotja)
- rumena obarvanost stvari
- dehidracija
- oteklost, bolečine in pordelost lica (vnetje žleze slinavke)
- oteklost črevesa, ki jo imenujemo "intestinalni angioedem" in se kaže s simptomi, kot so bolečine v trebuhu, bruhanje in driska
- večja občutljivost za sončno svetlobo kot običajno
- hudo luščenje ali lupljenje kože, srbeč in bulast izpuščaj ali druge reakcije na koži, npr. rdeč izpuščaj na obrazu ali čelu
- izpuščaj na koži ali podplutbe
- pege na koži in hladni udi
- težave z nohti (npr. zrahljanje ali odstopanje nohtov z nohtne posteljice)
- mišično-skeletna togost ali nezmožnost za premikanje čeljusti (tetanija)
- šibkost ali krči v mišicah
- zmanjšano spolno poželenje pri moških ali ženskah
- kri v urinu. To je lahko znak težav z ledvicami (intersticijski nefritis).
- več sladkorja v urinu kot običajno
- večje število določenih belih krvnih celic (eozinofilija) na preiskavah krvi

- preiskave krvi, ki kažejo premalo krvnih celic v krvi (pancitopenija)
- preiskave krvi pokažejo spremenjeno količino soli, kot so natrij, kalcij, magnezij in klorid v krvi
- počasno ali prizadeto reagiranje
- spremembe vonja stvari
- težko dihanje ali poslabšanje astme

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte zdravniku ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastrupitve, Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, faks: + 386 (0)1 434 76 46, e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Ramilife HCT

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Ramilife HCT ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Pretisni omoti: Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjne odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Ramilife HCT

Zdravilni učinkovini sta ramipril in hidroklorotiazid.
Ena tableta vsebuje 5 mg ramiprila in 12,5 mg hidroklorotiazida.

Pomožne snovi so: natrijev hidrogenkarbonat, kalcijev sulfatdihidrat, predgelirani koruzni škrob, natrijev stearilfumarat, črni železov oksid, rdeči železov oksid, rumeni železov oksid.

Izgled zdravila Ramilife HCT in vsebina pakiranja

Tablete Ramilife HCT so podolgovate, ploščate, roza, velikosti 5 x 10 mm, z razdelilno zarezo na eni strani in na stranskih površinah ter z oznako R2.

Zdravilo Ramilife HCT je pakirano v pretisnih omotih (aluminij/aluminij) po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90 in 100 tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður
Islandija

Izdelovalca

Actavis hf.
Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður
Íslandija

in

Actavis Ltd.
B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08
Malta

To zdravilo je odobreno v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Nemčija	Ramipril-comp PUREN 5 mg/12,5 mg Tabletten
Francija	Ramipril/Hydrochlortiazide Arrow 5mg/12,5mg comprimé
Grčija	Ramipril+HCT/Actavis
Nizozemska	Ramipril/Hydrochloorthiazide Aurobindo 5/12,5 mg tabletten
Slovenija	Ramilife HCT 5 mg/12,5 mg tablete

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 10.06.2016.