

KLINDAMICIN 1 % RAZTOPINA

Dermalna raztopina

NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke.

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če potrebujete dodatne informacije ali nasvet, se posvetujte s farmacevtom.

V primeru da katerikoli od neželenih učinkov postane resen ali če opazite katerega od neželenih učinkov, ki niso omenjeni v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje

1. Kaj je Klindamicin 1 % raztopina in za kaj jo uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden uporabite Klindamicin 1 % raztopino
3. Kako uporabljati Klindamicin 1 % raztopino
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje Klindamicin 1 % raztopine
6. Dodatne informacije



1. KAJ JE KLINDAMICIN 1 % RAZTOPINA IN ZA KAJ JO UPORABLJAMO

Sestava

1 g raztopine vsebuje 10 mg klindamicina v obliki klindamicinijevega klorida (*Clindamycini hydrochloridum*).

Pomožne snovi

Prečiščena voda, etanol, propilenglikol (E1520).

Oprema

Škatla, plastenka s 30 g raztopine, navodilo za uporabo.

Izgled

Klindamicin 1 % raztopina je bistra, brezbarvna tekočina.

Delovanje

Klindamicin je antibiotik, ki uničuje ali zavira rast bakterij.

Učinkovit je proti bakteriji *Propionibacterium acnes*, ki je povzročiteljica aken.

Terapevtske indikacije

Klindamicin 1 % raztopina se uporablja za zdravljenje navadnih aken, zlasti v gnojni fazi, od blagih do srednje hudih oblik.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN UPORABITE KLINDAMICIN 1 % RAZTOPINO

Klindamicin raztopine ne uporabljajte

če ste preobčutljivi na katerokoli sestavino Klindamicin 1 % raztopine, imate

Chronovo bolezen, ulcerozni kolitis, alergije, poškodovano kožo ali sluznico.

O tem obvestite tudi svojega zdravnika.

Klindamicin raztopino uporabljajte previdno

- Naj ne pride v oči ali v stik s sluznicami; če zdravilo pride v stik z očmi, nosno ali ustno sluznico ali s poškodovano kožo, predel temeljito sperite s hladno vodo.
- Pri nanašanju na kožo v okolici ust bodite previdni, saj ima Klindamicin 1 % raztopina zelo neprijeten okus.

Uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Ob sočasni uporabi Klindamicin 1 % raztopine in drugih zdravil za zdravljenje aken lahko pride do medsebojnega učinkovanja, zaradi česar se zmanjša ali poveča učinek enega ali drugega. Lahko pride tudi do draženja kože. Dražerča in suha koža se lahko pojavi tudi pri sočasni uporabi ostalih kozmetičnih pripravkov.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden uporabite katerokoli zdravilo.

Varnost Klindamicin 1 % raztopine pri uporabi v nosečnosti še ni znana, zato se sme uporabljati samo izjemoma v nujnih primerih, kadar zdravnik presodi, da pričakovana korist za mater opravičuje tveganje za otroka.

Ni znano, ali se klindamicin izloča v materino mleko, zato uporabo med dojenjem odsvetujemo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Klindamicin 1 % dermalna raztopina ob pravilni uporabi vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah klindamicin 1 % raztopine
To zdravilo vsebuje propilenglikol (E1520), ki lahko povzroči draženje kože.

3. KAKO UPORABLJATI KLINDAMICIN 1 % RAZTOPINO

Klindamicin raztopina je namenjena za uporabo na koži. Na predhodno očiščeno in suho obolelo mesto nanosite tanko plast raztopine dvakrat dnevno. Masiranje ali povijanje ni potrebno.

Po uporabi plastenko dobro zaprite.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Klindamicin 1 % raztopina neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če ste preobčutljivi na katero od sestavin raztopine, lahko ob uporabi pride do reakcije. V tem primeru prekinite zdravljenje.

Neželeni učinki se pri lokalni uporabi klindamicina pojavijo redko. Najpogostejše se na mestu nanosa pojavi suha in dražerča koža (rdečica, srbečica, luščenje kože ...).

Po dermalni uporabi se absorbira zelo majhna količina klindamicina; ki v zelo redkih primerih lahko povzroči sistemske neželene učinke, kot so slabost, bruhanje, driska, trebušne bolečine in krči, motnje okusa ...

Če kateri neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE KLINDAMICIN 1 % RAZTOPINE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte ga pri temperaturi do 25 °C, tesno zaprto in ločeno od virov vžiga.

Zdravila ne smete uporabljati po preteku roka uporabnosti, ki je naveden na ovojni.

Datum se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete izliti v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom.

Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Zdravilo se izdaja v lekarnah le na recept.

Klindamicin 1 % raztopina je galenski izdelek.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:

Dolenjske lekarne Novo mesto

Galenski laboratorij

Kandijska cesta 1

8000 Novo mesto

Datum zadnje revizije navodila: 13. 1. 2015.