

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO

Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
meropenem

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Meropenem Kabi in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Meropenem Kabi
3. Kako uporabljati zdravilo Meropenem Kabi
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Meropenem Kabi
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Meropenem Kabi in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Meropenem Kabi spada v skupino zdravil, imenovanih karbapenemski antibiotiki. Deluje tako, da uničuje bakterije, ki lahko povzročijo hude okužbe.

Zdravilo Meropenem Kabi je pri odraslih in otrocih, starejših od 3 mesecev, indicirano za zdravljenje naslednjih okužb:

- okužbe pljuč (pljučnica),
- okužbe pljuč in bronhusov pri bolnikih s cistično fibrozo,
- zapletene okužbe sečil,
- zapletene okužbe v trebuhu,
- okužbe, ki se lahko pojavijo med porodom ali po njem,
- zapletene okužbe kože in mehkih tkiv,
- akutna bakterijska okužba možganov (meningitis).

Zdravilo Meropenem Kabi se lahko uporablja za zdravljenje nevtropeničnih bolnikov s povišano telesno temperaturo, če obstaja sum, da je vzrok povišane temperature bakterijska okužba.

Zdravilo Meropenem Kabi se lahko uporablja za zdravljenje bakterijske okužbe krvi, ki je lahko povezana z zgoraj omenjenimi tipi okužbe.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Meropenem Kabi

Ne uporabljajte zdravila Meropenem Kabi

- če ste alergični (preobčutljivi) na meropenem ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če ste alergični (preobčutljivi) na druge antibiotike, npr. peniciline, cefalosporine ali karbapeneme, ker ste lahko v tem primeru alergični tudi na meropenem.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Meropenem Kabi se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro:

- če imate kakšne zdravstvene težave, npr. z jetri ali ledvicami,
- če ste kdaj imeli hudo drisko po jemanju drugih antibiotikov.

Pojavi se vam lahko pozitiven izvid določene preiskave (Coombsov test); takšen izvid kaže prisotnost

protiteles, ki lahko uničujejo rdeče krvne celice. Zdravnik se bo o tem pogovoril z vami.

Pojavijo se vam lahko znaki in simptomi hudih kožnih reakcij (glejte poglavje 4). Če se to zgodi, se takoj posvetujte s svojim zdravnikom ali medicinsko sestro, da bi lahko zdravili te simptome.

Če niste prepričani, ali kaj od naštetega velja za vas, se pred uporabo zdravila Meropenem Kabi posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

Druga zdravila in zdravilo Meropenem Kabi

Obvestite zdravnika, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zdravilo Meropenem Kabi namreč lahko vpliva na delovanje nekaterih zdravil in nekatera zdravila lahko vplivajo na zdravilo Meropenem Kabi.

Še zlasti morate zdravniku ali medicinski sestri povedati, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- probenecid (uporablja se za zdravljenje protina),
 - valprojsko kislino/natrijev valproat/valpromid (uporabljajo se za zdravljenje epilepsije).
- Zdravila Meropenem Kabi se ne sme uporabljati, ker lahko zmanjša učinek natrijevega valproata.
- peroralno antikoagulantno sredstvo (uporablja se za zdravljenje ali preprečevanje krvnih strdkov).

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite to zdravilo. Uporabi meropenema med nosečnostjo se je bolje izogniti.

Zdravnik bo odločil, ali naj dobite zdravilo Meropenem Kabi.

Pomembno je, da zdravniku poveste, če dojite ali če nameravate dojit, preden dobite meropenem. Majhna količina tega zdravila lahko preide v materino mleko. Zato bo zdravnik odločil, ali naj med obdobjem dojenja dobite zdravilo Meropenem Kabi.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Študij o vplivu na sposobnost upravljanja vozil in strojev niso izvedli. Pri uporabi zdravila Meropenem Kabi so se pojavili glavobol, občutek mravljinčenja ali zbadanja na koži (parestezije), in nehoteno krčenje mišic, zaradi katerih se telo hitro in nenadzorovano trese (konvulzije), običajno pa jih spremlja izguba zavesti. Kateri koli izmed teh neželenih učinkov lahko poslabša vašo sposobnost upravljanja vozil ali strojev. Če se vam to zgodi, ne vozite in ne upravljajte strojev.

Zdravilo Meropenem Kabi vsebuje natrij.

Meropenem Kabi 500 mg: to zdravilo vsebuje 45,13 mg natrija (glavna sestavina kuhinjske/namizne soli) na vialo. To je enako 2,3 % priporočenega največjega dnevnega vnosa natrija s hrano za odrasle osebe.

Zdravniku ali medicinski sestri morate povedati, če imate kakšno motnjo, zaradi katere potrebujete kontrolirano uživanje natrija.

3. Kako uporabljati zdravilo Meropenem Kabi

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.

Uporaba pri odraslih

- Odmerek je odvisen od vrste okužbe, od tega, kje v telesu je okužba in kako resna je. Zdravnik bo odločil, kolikšen odmerek potrebujete.
- Odmerek za odrasle je običajno od 500 mg (miligramov) do 2 g (grama). Običajno boste odmerek dobivali na 8 ur. Če pa vam ledvice ne delujejo dobro, boste odmerek morda dobili

manj pogosto.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

- Odmerek za otroke v starosti od 3 mesecev do 12 let se določi glede na starost in otrokovo telesno maso. Običajno je odmerek od 10 do 40 mg zdravila Meropenem Kabi na kilogram (kg) otrokove telesne mase. Odmerek se običajno daje na 8 ur. Otroci, ki tehtajo več kot 50 kg, dobijo odmerek za odrasle.

Kako uporabljati zdravilo Meropenem Kabi

- Zdravilo Meropenem Kabi boste dobili z injekcijo ali infuzijo v eno od velikih ven.
- Običajno vam bo zdravilo Meropenem Kabi dal zdravnik ali medicinska sestra.
- Vendar pa se nekateri bolniki, starši in negovalci naučijo dajati zdravilo Meropenem Kabi doma. Navodila za to so navedena v tem navodilu za uporabo (v poglavju z naslovom "Navodila za dajanje zdravila Meropenem Kabi sebi ali komu drugemu doma"). Pri uporabi zdravila Meropenem Kabi natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.
- Vaše raztopine za injiciranje se ne sme mešati z drugimi zdravili oziroma se je ne sme dodajati raztopinam, ki vsebujejo druga zdravila.
- Injiciranje lahko traja okrog 5 minut ali od 15 do 30 minut. Zdravnik vam bo povedal, kako dajati zdravilo Meropenem Kabi.
- Praviloma morate injekcije dobiti vsak dan ob istem času.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Meropenem Kabi, kot bi smeli

Če pomotoma uporabite odmerek, večji od predpisanega, se takoj posvetujte z zdravnikom ali najbližjo bolnišnico.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Meropenem Kabi

Če izpustite injekcijo, jo morate dobiti čim prej. Če pa je že skoraj čas za naslednjo injekcijo, preskočite izpuščeno injekcijo.

Ne vzemite dvojnega odmerka (dveh injekcij hkrati), če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Meropenem Kabi

Ne nehajte uporabljati zdravila Meropenem Kabi, dokler vam tega ne naroči zdravnik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Hude alergijske reakcije

Če imate hudo alergijsko reakcijo, **nehajte uporabljati zdravilo Meropenem Kabi in nemudoma pojdite k zdravniku**. Morda potrebujete nujno zdravniško pomoč. Znaki lahko vključujejo nenaden pojav:

- hudega izpuščaja, srbenja ali koprivnice na koži,
- otekanja obraza, ustnic, jezika ali drugih delov telesa,
- kratke sape, piskajočega dihanja ali težkega dihanja,
- resnih kožnih reakcij, ki vključujejo:
 - resne preobčutljivostne reakcije, ki vključujejo povišano telesno temperaturo, kožne izpuščaje in spremembe v izvidih preiskav krvi za preverjanje delovanja jeter (zvišana koncentracija jetrnih encimov), povečanje števila določene vrste belih krvnih celic (eozinofilija) in povečanje bezgavk. To so lahko znaki preobčutljivostne motnje, ki prizadene več organov in jo imenujemo sindrom DRESS.
 - hud rdeč luskast izpuščaj, kožne ognojke, mehurje ali luščenje kože. Spremljajo jih lahko povišana telesna temperatura in bolečine v sklepih.

- hude kožne izpuščaje, ki se lahko kažejo v obliki rdečkastih, tarči podobnih pik ali krožnih lis na trupu, v sredini katerih so pogosto mehurji, luščenje kože, razjede v ustih, žrelu, nosu, spolovilu in očeh, ki jih lahko spremljajo vročina in gripi podobni simptomi (Stevens-Johnsonov sindrom) ali še hujša oblika (toksična epidermalna nekroliza).

Okvara rdečih krvnih celic (neznana pogostnost)

Med znaki so:

- pojav zadihanosti, kadar je ne pričakujete,
- rdeč ali rjav urin.

Če opazite kaj od naštetega, **nemudoma pojdite k zdravniku.**

Drugi možni neželeni učinki:

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- bolečine v trebuhu,
- občutek slabosti (občutek siljenja na bruhanje),
- bruhanje,
- driska,
- glavobol,
- izpuščaj na koži, srbeča koža,
- bolečine in vnetje,
- povečano število trombocitov v krvi (pokaže se na preiskavi krvi),
- spremenjeni izvidi preiskav krvi, vključno s preiskavami delovanja jeter.

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- spremembe krvi. Med njimi so zmanjšanje števila trombocitov (zaradi česar se vam lahko poveča nagnjenost k modricam), povečanje števila nekaterih belih krvnih celic, zmanjšanje števila drugih belih krvnih celic in večja količina snovi, imenovane bilirubin. Zdravnik vam bo morda od časa do časa opravil preiskave krvi.
- spremembe v izvidih preiskav krvi, vključno s preiskavami delovanja ledvic,
- mravljinčenje (občutek zbadanja),
- glivične okužbe ust ali nožnice ("gobice"),
- vnetje črevesa z drisko,
- vnetje ven, v katere je injicirano zdravilo Meropenem Kabi,
- druge spremembe krvi. Med simptomi so lahko pogoste okužbe, povišana telesna temperatura in vnetje žrela. Zdravnik vam bo morda od časa do časa opravil preiskave krvi.

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov)

- napadi krčev (konvulzije)
- akutna dezorientiranost in zmedenost (delirij)

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Meropenem Kabi

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na vsebniku poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.
Ne zamrzujte.

Injiciranje

Po pripravi: pripravljene raztopine za intravensko injiciranje je treba uporabiti takoj. Čas od začetka priprave do konca intravenskega injiciranja ne sme biti daljši od:

- 3 ur, če je zdravilo shranjeno pri temperaturi do 25 °C;
- 12 ur, če je zdravilo shranjeno v hladilniku (2-8 °C).

Infundiranje

Po pripravi: pripravljene raztopine za intravensko infundiranje je treba uporabiti takoj. Čas od začetka priprave do konca intravenskega infundiranja ne sme biti daljši od:

- 6 ur, če je zdravilo Meropenem Kabi raztopljeno v 0,9 % raztopini natrijevega klorida in shranjeno pri temperaturi do 25 °C;
- 24 ur, če je zdravilo Meropenem Kabi raztopljeno v 0,9 % raztopini natrijevega klorida in shranjeno v hladilniku (2-8 °C);
- 1 uro, če je zdravilo Meropenem Kabi raztopljeno v 5 % raztopini dekstroze in shranjeno pri temperaturi do 25 °C;
- 8 ur, če je zdravilo Meropenem Kabi raztopljeno v 5 % raztopini dekstroze in shranjeno v hladilniku (2-8 °C).

Z mikrobiološkega stališča je treba zdravilo uporabiti takoj, razen če postopek odprtja/rekonstitucije/razredčenja preprečuje tveganje mikrobiološke kontaminacije.

Če ni uporabljeno takoj, so čas in pogoji shranjevanja med uporabo odgovornost uporabnika.

Pripravljene raztopine ne zamrzujte.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Meropenem Kabi

- Učinkovina je meropenem trihidrat. Ena 20 ml viala/100 ml steklenica vsebuje 500 mg meropenema.
- Druga sestavina zdravila je natrijev karbonat.

Izgled zdravila Meropenem Kabi in vsebina pakiranja

Zdravilo Meropenem Kabi je bel ali svetlo rumen prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje v viali ali steklenici.

Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje je na voljo v 20 ml steklenih vialah in 100 ml steklenicah.

Pakiranja z 1 ali 10 vialami ali steklenicami.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Meropenem Kabi

H – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
D-61346 Bad Homburg v.d.H.
Nemčija

Proizvajalci, odgovorni za sproščanje serije

ACS Dobfar S.p.A.
Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino, 64100 Teramo
Italija

in

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
61346 Bad Homburg v.d.H., Nemčija
Naslov mesta sproščanja
Pfingstweide 53, 61169 Friedberg

in

LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)
Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros
Portugalska

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung
Belgija	Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie / poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
Bolgarija	Meropenem Kabi 500 mg
Ciper	Meropenem Kabi 500 mg, <i>κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση</i>
Češka	Meropenem Kabi
Danska	Meropenem Fresenius Kabi
Estonija	Meropenem Kabi 500 mg
Nemčija	Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung
Grčija	Meropenem/Kabi 500 mg, <i>κόνις για διάλυμα προς ένεση ή έγχυση</i>
Madžarska	Meropenem Kabi 500 mg
Irska	Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion
Latvija	Meropenem Kabi 500 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva	Meropenem Kabi 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui
Luksemburg	Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
Nizozemska	Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Norveška	Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver til injeksjonsvæske/ infusionsvæske, oppløsning
Poljska	Meropenem Kabi
Portugalska	Meropenem Kabi
Romunija	Meropenem Kabi 500 mg pulbere pentru soluție injectabilă sau perfuzabilă
Španija	Meropenem Kabi 500 mg polvo para solución inyectable o para perfusión
Švedska	Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning
Slovenija	Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Slovaška	Meropenem Kabi 500 mg
Velika Britanija	Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 29. 7. 2022.

Nasvet/zdravstvena vzgoja

Antibiotiki se uporabljajo za zdravljenje okužb, ki jih povzročajo bakterije. Nobenega učinka nimajo proti okužbam, ki jih povzročajo virusi.

Včasih se okužba, ki jo povzročajo bakterije, ne odzove na zdravljenje z antibiotikom. Eden najpogostejših razlogov za to je odpornost bakterij, ki povzročajo okužbo, na uporabljen antibiotik. To pomeni, da lahko bakterije kljub antibiotiku preživijo in se celo razmnožujejo.

Bakterije lahko postanejo odporne na antibiotik zaradi številnih razlogov. Skrbna uporaba antibiotikov lahko pomaga zmanjšati možnost, da bi bakterije postale odporne proti njim.

Ko vam zdravnik predpiše antibiotik, je ta namenjen le za zdravljenje vaše trenutne bolezni. Upoštevajte naslednje nasvete: to bo pomagalo preprečiti pojav odpornih bakterij, ki lahko onemogočijo delovanje antibiotika.

1. Zelo pomembno je, da antibiotik jemljete v pravem odmerku, ob pravem času in pravo število dni. Preberite navodila na lekarniški signaturi in če česa ne razumete, prosite zdravnika ali farmacevta za pojasnilo.
2. Antibiotika ne smete jemati, če ni bil predpisan posebej za vas. Antibiotik morate uporabiti le za zdravljenje okužbe, za katero je bil predpisan.
3. Ne jemljite antibiotikov, ki so bili predpisani drugim ljudem, tudi če so imeli okužbo, podobno vaši.
4. Antibiotikov, ki so bili predpisani vam, ne smete dajati drugim.
5. Če vam potem, ko ste dokončali zdravljenje z antibiotikom tako, kot vam je naročil zdravnik, ostane kaj antibiotika, morate preostanek vrniti v lekarno za ustrezno odstranitev.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Navodila za dajanje zdravila Meropenem Kabi sebi ali komu drugemu doma

Nekateri bolniki, starši in negovalci se naučijo dajati zdravilo Meropenem Kabi doma.

Opozorilo – To zdravilo smete sebi ali komu drugemu doma dati šele, ko vas je tega naučil zdravnik ali medicinska sestra.

Priprava zdravila

- Zdravilo je treba zmešati z drugo tekočino (topilom). Zdravnik vam bo povedal, koliko topila uporabiti.
 - Zdravilo morate uporabiti, takoj ko ga pripravite. Ne zamrzujte.
1. Umijte si roke in jih dobro osušite. Pripravite čisto delovno površino.
 2. Vzemite steklenico (vialo) zdravila Meropenem Kabi iz pakiranja. Preverite vialo in rok uporabnosti. Preverite, da je viala nedotaknjena in da ni poškodovana.
 3. Odstranite barvno zaporko in očistite gumijasti zamašek z alkoholnim zložencem. Pustite, da se gumijasti zamašek posuši.
 4. Namestite novo sterilno iglo na novo sterilno brizgo, ne da bi se dotaknili njunih koncev.
 5. Potegnite priporočeno količino sterilne "vode za injekcije" v brizgo. Količino potrebne tekočine prikazuje spodnja preglednica:

Odmerek zdravila Meropenem Kabi	Količina "vode za injekcije", potrebna za redčenje
500 mg (miligramov)	10 ml (mililitrov)
1 g (gram)	20 ml
1,5 g	30 ml
2 g	40 ml

Opomba: Če je vaš predpisani odmerek zdravila Meropenem Kabi več kot 1 g, boste morali uporabiti več kot 1 vialo zdravila Meropenem Kabi. Potem lahko potegnete tekočino iz vial v eno brizgo.

6. Zabodite iglo brizge skozi srednji del gumijastega zamaška in vbrizgajte priporočeno količino vode za injekcije v vialo ali vialo zdravila Meropenem Kabi.
7. Potegnite iglo iz vialo in vialo dobro pretresajte približno 5 sekund oziroma dokler se ves prašek ne raztopi. Gumijasti zamašek še enkrat očistite z novim alkoholnim zložencem in pustite, da se gumijasti zamašek posuši.
8. Preverite, ali je bat brizge potisnjen do konca v brizgo; iglo znova zabodite skozi gumijasti zamašek. Potem morate prijeti brizgo in vialo ter vialo obrniti na glavo.
9. Konica igle mora biti v tekočini; potegnite bat nazaj in izvlecite vso tekočino iz vialo v brizgo.
10. Potegnite iglo in brizgo iz vialo in zavržite prazno vialo na varno mesto.
11. Držite brizgo pokonci tako, da je igla obrnjena navzgor. Potrkajte po brizgi, tako da se mehurčki, ki so morda v tekočini, dvignejo na vrh brizge.
12. Odstranite morebitni zrak v brizgi tako, da rahlo potiskate bat, dokler ne iztisnete vsega zraka.
13. Če zdravilo Meropenem Kabi uporabljate doma, morate ustrezno zavreči vse uporabljene igle in infuzijske cevke. Če se zdravnik odloči za prenehanje vašega zdravljenja, morate neuporabljeno zdravilo Meropenem Kabi ustrezno zavreči.

Injiciranje

Zdravilo lahko daste po kratki kanili ali venflonu ali skozi nastavek ali centralni kanal.

Dajanje zdravila Meropenem Kabi po kratki kanili ali venflonu

1. Odstranite iglo z brizge in iglo previdno odvrzite v vsebnik za ostre odpadke.
2. Obrišite konec kratke kanile ali venflona z alkoholnim zložencem in pustite, da se posuši. Odprite zaporko na kanili in namestite brizgo.
3. Počasi potiskajte bat brizge, da boste antibiotik enakomerno dajali približno 5 minut.

4. Ko končate dajanje antibiotika in je brizga prazna, brizgo odstranite in opravite izpiranje, kot vam je naročil zdravnik ali medicinska sestra.
5. Zaprite zaporko kanile in brizgo previdno odvrzite v vsebnik za ostre odpadke.

Dajanje zdravila Meropenem Kabi skozi nastavke ali centralni kanal

1. Odstranite zaporko nastavka ali kanala, očistite konec kanala z alkoholnim zložencem in pustite, da se posuši.
2. Namestite brizgo in počasi potiskajte bat brizge, da boste antibiotik enakomerno dajali približno 5 minut.
3. Ko končate dajanje antibiotika, brizgo odstranite in opravite izpiranje, kot vam je naročil zdravnik ali medicinska sestra.
4. Na centralni kanal namestite novo, čisto zaporko in brizgo previdno odvrzite v vsebnik za ostre odpadke.