

Navodilo za uporabo

Pemetreksed Teva 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

pemetreksed

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Pemetreksed Teva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Pemetreksed Teva
3. Kako uporabljati zdravilo Pemetreksed Teva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Pemetreksed Teva
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Pemetreksed Teva in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Pemetreksed Teva se uporablja pri zdravljenju raka.

Zdravilo Pemetreksed Teva se daje v kombinaciji s cisplatinom, drugim zdravilom proti raku, za zdravljenje malignega plevralnega mezotelioma, vrste raka, ki prizadene vrhnjo plast pljuč, bolnikom, ki pred tem še niso prejeli kemoterapije.

Zdravilo Pemetreksed Teva se daje tudi v kombinaciji s cisplatinom, za začetno zdravljenje bolnikov z napredovalim stadijem pljučnega raka.

Zdravnik vam lahko predpiše zdravilo Pemetreksed Teva, če imate pljučni rak v napredovalnem stadiju in če se vaša bolezen odziva na zdravljenje oz. če po začetni kemoterapiji ostaja večinoma nespremenjena.

Zdravilo Pemetreksed Teva je namenjeno tudi zdravljenju bolnikov z napredovalim stadijem pljučnega raka, katerih bolezen se širi po tem, ko je bila že uporabljena druga začetna kemoterapija.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Pemetreksed Teva

NE uporabljajte zdravila Pemetreksed Teva:

- če ste alergični na pemetreksed ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če dojdete, MORATE med zdravljenjem z zdravilom Pemetreksed Teva dojenje prekiniti (poglejte poglavje Nosečnost, dojenje in plodnost).
- če ste bili nedavno cepljeni ali boste kmalu cepljeni proti rumeni mrzlici.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Pemetreksed Teva se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če imate ali ste imeli težave z **ledvicami**, se pogovorite z zdravnikom ali bolnišničnim farmacevtom, ker morda ne boste mogli prejeti zdravila Pemetreksed Teva.

Pred vsako infuzijo vam bomo odvzeli vzorce krvi za vrednotenje delovanja vaših ledvic in jeter ter oceno, ali imate dovolj krvnih celic za prejemanje zdravila Pemetreksed Teva. Zdravnik se bo morda odločil spremeniti odmerek ali odložiti zdravljenje, odvisno od vašega splošnega stanja, ter ob prenizkem številu krvnih celic. Če prejimate tudi cisplatin, bo zdravnik pred prejemanjem cisplatina in po njem preveril, ali ste ustrezno hidrirani ter da prejimate ustrezno zdravljenje za preprečevanje bruhanja.

Če ste imeli ali če boste imeli zdravljenje z **obsevanjem**, povejte to zdravniku, saj ob jemanju zdravila Pemetreksed Teva lahko pride do zgodnje ali pozne reakcije na obsevanje.

Če ste bili nedavno **cepljeni**, povejte to zdravniku, saj lahko to ob jemanju zdravila Pemetreksed Teva povzroča škodljive učinke.

Če imate **bolezen srca** ali če ste v preteklosti imeli bolezen srca, povejte to zdravniku.

Če se vam **okoli pljuč nabira tekočina**, se bo zdravnik morda odločil tekočino pred dajanjem zdravila Pemetreksed Teva odstraniti.

Otroci in mladostniki

Zdravilo Pemetreksed Teva ni primerno za uporabo pri pediatrični populaciji.

Druga zdravila in zdravilo Pemetreksed Teva

Povejte zdravniku, če jemljete kakršna koli zdravila proti bolečinam ali vnetju (oteklinam), denimo zdravila, imenovana "nesteroidna protivnetna zdravila" (NSAID), vključno z zdravili, ki ste jih dobili brez recepta (kot denimo ibuprofen). Obstaja veliko vrst NSAID z različnimi trajanji delovanja. Na podlagi načrtovanega datuma vaše infuzije zdravila Pemetreksed Teva in/ali glede na delovanje vaših ledvic vam mora zdravnik svetovati, katera zdravila lahko jemljete in kdaj jih lahko jemljete. Če ste negotovi, vprašajte zdravnika ali farmacevta, ali je katero od vaših zdravil NSAID.

Povejte zdravniku ali bolnišničnemu farmacevtu, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katero koli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Nosečnost, dojenje in plodnost**Nosečnost**

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči, **povejte zdravniku**. Uporabi zdravila Pemetreksed Teva med nosečnostjo se je potrebno izogibati. Z zdravnikom se pogovorite o možnem tveganju pri prejemanju zdravila Pemetreksed Teva v času nosečnosti. Med zdravljenjem z zdravilom Pemetreksed Teva MORAJO ženske uporabljati učinkovito metodo kontracepcije.

Dojenje

Če dojite, **povejte zdravniku**.

Dojenje MORATE med zdravljenjem z zdravilom Pemetreksed Teva prekiniti.

Plodnost

Moškim odsvetujemo, da bi v času zdravljenja z zdravilom Pemetreksed Teva ter do 6 mesecev po zdravljenju s tem zdravilom spočeli otroka, zato naj v času zdravljenja z zdravilom Pemetreksed Teva ter do 6 mesecev po zdravljenju s tem zdravilom uporabljajo učinkovito kontracepcijo. Če bi radi med zdravljenjem ali v 6 mesecih po zdravljenju spočeli otroka, se pogovorite z zdravnikom ali farmacevtom. Morda se boste želeli pred začetkom zdravljenja posvetovati o shranjevanju sperme.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Pemetreksed Teva lahko povzroči, da se boste počutili utrujeno. Pri vožnji ali upravljanju strojev bodite previdni.

3. Kako uporabljati zdravilo Pemetreksed Teva

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravstvenega osebja. Vaše zdravstveno stanje se bo med zdravljenjem redno spremljalo. Rutinsko preverjanje vključuje krvne preiskave vključno s preverjanjem delovanja jeter in ledvic. Odmerek bo morda potrebno spremeniti ali odložiti zdravljenje, odvisno od rezultatov preiskav.

Odmerek zdravila Pemetreksed Teva je 500 miligramov za vsak kvadratni meter površine vašega telesa. Za izračun površine vašega telesa izmerimo vašo telesno višino in maso. Zdravnik bo uporabil izračunano površino vašega telesa za določitev pravega odmerka za vas. Ta odmerek bo morda potrebno prilagoditi ali pa odložiti zdravljenje, odvisno od vašega števila krvnih celic ter vašega splošnega stanja. Bolnišnični farmacevt, medicinska sestra ali zdravnik bo koncentrat zdravila Pemetreksed Teva, preden ga boste prejeli, razredčil z 5 mg/ml raztopino glukoze za injiciranje.

Zdravilo Pemetreksed Teva boste vedno prejeli v obliki infuzije v veno. Infuzija bo trajala približno 10 minut.

Kadar uporabljamo zdravilo Pemetreksed Teva v kombinaciji s cisplatinom:

Zdravnik ali bolnišnični farmacevt bo določil odmerek, ki ga potrebujete, na podlagi vaše telesne višine in mase. Cisplatin tudi dajemo v obliki infuzije v veno, približno 30 minut po zaključku infuzije zdravila Pemetreksed Teva. Infuzija cisplatina traja približno 2 uri.

Običajno boste infuzijo prejeli enkrat vsake 3 tedne.

Druga zdravila:

Kortikosteroidi: zdravnik vam bo predpisal tablete steroidov (ustrezno 4 miligramom deksametazona dvakrat dnevno), ki jih boste morali jemati dan pred zdravljenjem, na dan zdravljenja in na dan po zdravljenju z zdravilom Pemetreksed Teva. To zdravilo boste prejeli, da bi zmanjšali pogostnost in resnost kožnih reakcij, ki jih lahko izkusite med zdravljenjem proti raku.

Vitaminski dodatki: zdravnik vam bo predpisal peroralno folno kislino (vitamin) ali multivitaminski pripravek, ki jo vsebuje (350 do 1000 mikrogramov), ki ga boste morali med prejemanjem zdravila Pemetreksed Teva jemati enkrat dnevno. V sedmih dneh pred prvim odmerkom zdravila Pemetreksed Teva morate vzeti vsaj 5 odmerkov. Po zadnjem odmerku zdravila Pemetreksed Teva morate še 21 dni jemati folno kislino. V tednu pred dajanjem zdravila Pemetreksed Teva boste prejeli tudi injekcijo vitamina B₁₂ (1000 mikrogramov), nato pa še približno na vsakih 9 tednov (ustrezno 3 ciklusom zdravljenja z zdravilom Pemetreksed Teva). Vitamin B₁₂ in folno kislino boste prejeli za zmanjšanje možnih toksičnih učinkov zdravljenja proti raku.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom ali.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od spodaj naštetih učinkov, morate **nemudoma** o tem obvestiti zdravnika:

- Povišana telesna temperatura ali okužba (pogosto): če se pojavi telesna temperatura 38 °C ali

- več, znojenje ali drugi znaki okužbe (ker imate lahko manj belih krvničk kot normalno, kar je zelo pogosto). Okužbe (sepsa) so lahko hude in povzročijo lahko smrt.
- Če se pojavi bolečina v prsnem košu (pogosto) ali hitro bitje srca (občasno).
- Če imate bolečine, rdečino, oteklino ali razjede v ustni votlini (zelo pogosto).
- Alergijska reakcija: če se pojavi izpuščaj (zelo pogosto) / pekoč ali zbadajoč občutek (pogosto), ali povišana telesna temperatura (pogosto). Redko so kožne reakcije lahko hude in povzročijo celo smrt. Obvestite zdravnika, če se pojavijo hud izpuščaj, srbenje ali mehurčki (Stevens Johnsonov sindrom ali toksična epidermalna nekroliza).
- Če ste utrujeni, omotični, se hitro zadihate, ste bledi (ker imate morda manj hemoglobina kot je normalno, kar je zelo pogosto).
- Če vam krvavijo dlesni, krvavite iz nosu ali ustne votline, ali se pojavi kakršnakoli krvavitev, ki se noče ustaviti, rdečkasto ali rožnato obarvan urin, nepričakovane podplutbe (ker imate lahko manj trombocitov kot je normalno, kar je zelo pogosto).
- Če doživite nenadno težko dihanje, močno bolečino v prsih ali kašelj s krvavim izmečkom (občasno) (lahko kaže na krvni strdek v krvnih žilah v pljučih).

Neželeni učinki z zdravilom Pemetreksed Teva lahko vključujejo:

Zelo pogosti: *pojavi se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov*

- nizko število belih krvnih celic
- nizka raven hemoglobina (anemija)
- nizko število trombocitov
- diareja
- bruhanje
- bolečina, rdečina, otekanje ali rane v vaših ustih
- slabost
- izguba apetita
- utrujenost (izčrpanost)
- kožni izpuščaji
- izguba las
- zaprtje
- izguba občutka
- ledvice: nenormalne vrednosti krvnih testov.

Pogosti: *pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov*

- alergijske reakcije: kožni izpuščaji/pekoč ali zbadajoč občutek
- okužba vključno s sepsa
- povišana telesna temperatura
- dehidracija
- odpoved ledvic
- draženje kože in srbenje
- bolečina v prsnem košu
- mišična oslabelost
- konjunktivitis (vnetje očesa)
- razdražen želodec
- bolečina v trebuhu
- sprememba okusa
- jetra: nenormalne vrednosti krvnih testov
- solzne oči.

Občasni: *pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov*

- akutna odpoved ledvic
- hiter srčni utrip
- Nekateri bolniki so med terapijo z zdravilom Pemetreksed Teva in obsevanjem doživeli vnetje sluznice požiralnika (grla).

- kolitis (vnetje sluznice debelega črevesa, ki ga lahko spremlja krvavitev iz črevesa ali danke)
- intersticijska pljučnica (vnetje pljučnih mešičkov)
- edem (preveč tekočine v telesnih tkivih, kar povzroča oteklino)
- Nekateri bolniki so med prejemanjem zdravila Pemetreksed Teva, običajno v kombinaciji z drugim zdravilom proti raku, doživeli srčno kap, možgansko kap ali "manjšo kap".
- skupno nizko število belih krvnih celic, rdečih krvnih celic in trombocitov (pancitopenija)
- radiacijska pljučnica (brazgotinjenje pljučnih mešičkov, povezano z obsevanjem) se lahko pojavi pri bolnikih, ki so zdravljeni tudi z obsevanjem pred, med ali po zdravljenju z zdravilom. Pemetreksed Teva.
- Poročali so tudi o hudih bolečinah v okončinah, nizki telesni temperaturi in bledosti.
- krvni strdki v krvnih žilah v pljučih (pljučna embolija).

Redki: *pojavi se lahko pri največ 1 od 1000 bolnikov*

- radiacijski izpuščaj (kožni izpuščaj kot pri hudi sončni opeklini), ki se lahko pojavi na koži, ki je bila v preteklosti izpostavljena obsevanju, in sicer od nekaj dni do več let po obsevanju.
- bulozna stanja (bolezni s kožnimi mehurji), vključno s Stevens-Johnsonovim sindromom in toksično epidermalno nekrolizo.
- imunsko pogojena hemolitična anemija (propad rdečih krvnih celic, ki ga povzročijo protitelesa)
- hepatitis (vnetje jeter)
- **anafilaktični šok (huda alergijska reakcija).**

Neznana pogostnost: *pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti*

- otekanje spodnjih okončin z bolečino in pordelostjo
- povečano izločanje urina
- žeja in povečano pitje vode
- hipernatriemija - zvišana raven natrija v krvi

Pojavi se lahko kateri koli od teh simptomov in/ali stanj. Ko se pojavi kateri koli od teh neželenih učinkov, MORATE čimprej obvestiti zdravnika.

Če ste zaradi katerega koli neželenega učinka (neželenih učinkov) zaskrbljeni, se pogovorite z zdravnikom.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Pemetreksed Teva

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in nalepki vial poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Neodprta viala: Shranjujte v hladilniku (2° C – 8° C). Vialo shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Raztopina za infuzijo: zdravilo morate uporabiti nemudoma. Po pripravi po navodilih so kemijsko in fizikalno obstojnost pemetrekseda pokazali za 24 ur v hladilniku pri temperaturi 2° C – 8° C.

To zdravilo je namenjeno samo enkratni uporabi, morebitno neporabljeno raztopino je treba odstraniti v skladu z lokalnim predpisom.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije**Kaj vsebuje zdravilo Pemetreksed Teva**

- Učinkovina je pemetreksed.

En ml koncentrata vsebuje 25 mg pemetrekseda.

Zdravilo Pemetreksed Teva 25 mg/ml: 4 ml viala vsebuje 100 miligramov pemetrekseda.

Zdravilo Pemetreksed Teva 25 mg/ml: 20 ml viala vsebuje 500 miligramov pemetrekseda.

Zdravilo Pemetreksed Teva 25 mg/ml: 40 ml viala vsebuje 1000 miligramov pemetrekseda.

- Druge sestavine zdravila so manitol (E421), brezvodna citronska kislina, trometamol in voda za injekcije.

Izgled zdravila Pemetreksed Teva in vsebina pakiranja

Zdravilo Pemetreksed Teva je koncentrat za raztopino za infundiranje (sterilni koncentrat) v viali. Je brezbarvna do rumeno-zelena raztopina.

Vsako pakiranje zdravila Pemetreksed Teva vsebuje:

Eno 100 mg/4 ml brezbarvno stekleno vialo z brombutil zamaškom s fluoropolimerno prevleko in aluminijasto zaporko. Viale so zaščitene (opremljene z zaščitnim prozornim pokrovom).

Eno 500 mg/20 ml brezbarvno stekleno vialo z brombutil zamaškom s fluoropolimerno prevleko in aluminijasto zaporko. Viale so zaščitene (opremljene z zaščitnim prozornim pokrovom).

Eno 1000 mg/40 ml brezbarvno stekleno vialo z brombutil zamaškom s fluoropolimerno prevleko in aluminijasto zaporko. Viale so zaščitene (opremljene z zaščitnim prozornim pokrovom).

Na trgu morda ni vseh pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila

H - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Teva B.V.
Swensweg 5
2031GA Haarlem
Nizozemska

Izdelovalci

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nizozemska

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út 82
H-2100 Gödöllő
Madžarska

Pliva Croatia Ltd.,
Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb
Hrvaška

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija:	Pemetrexed ratiopharm 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Belgija:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie Pemetrexed Teva 25 mg/ml solution a diluer pour perfusion Pemetrexed Teva 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Ciper:	Pemetrexed/Teva B.V. 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
Češka:	PEMETREXED TEVA
Danska:	Pemetrexed Teva
Estonija:	Pemetrexed Teva
Francija:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml solution à diluer pour perfusion
Grčija:	Pemetrexed/Teva B.V. 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
Hrvaška:	Pemetreksed Pliva 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju
Irska:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion
Islandija:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml innrennslisþykkni, lausn
Italija:	Pemetrexed Teva Italia
Litva:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
Latvija:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Luksemburg:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml solution a diluer pour perfusion
Madžarska:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz
Malta:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion
Nizozemska:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie
Nemčija:	Pemetrexed-ratiopharm 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Poljska:	Pemetrexed Teva
Potrugalska:	Pemetrexed Zidrium
Romunija:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă
Slovenija:	Pemetreksed Teva 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje
Slovaška:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml infúzny koncentrát
Španija:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml concentrado para solución para perfusión
Švedska:	Pemetrexed Teva
Veliko Britanija:	Pemetrexed Teva 25 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 29.3.2018.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Navodila za uporabo, ravnanje z zdravilom in odlaganje.

1. Pri redčenju pemetrekseda za intravensko infundiranje uporabljajte aseptično metodo.
2. Preračunajte odmerek in število potrebnih vial zdravila Pemetreksed Teva 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje.
3. Zdravilo Pemetreksed Teva je potrebno razredčiti s 5 % raztopino glukoze brez konzervansa. Ustrezen volumen koncentrata pemetrekseda je potrebno razredčiti do 100 ml s 5 % raztopino glukoze in uporabiti kot intravensko infuzijo, ki traja 10 minut.
4. Raztopine pemetrekseda za infundiranje, pripravljene kot je navedeno zgoraj, so skladne s seti za dajanje, prevlečeni s poliolefinom in infuzijskimi vrečkami. Pemetreksed je nekompatibilen z vehikli, ki vsebujejo kalcij, vključujoč raztopino Ringerjevega laktata ter Ringerjevo raztopino.

Zdravilo Pemetreksed Teva kot pomožno snov vsebuje trometamol. Trometamol je inkompatibilen s cisplatinom in povzroči razgradnjo cisplatina. To zdravilo se ne sme mešati z drugimi zdravili. Intravenske linije je potrebno po uporabi zdravila Pemetreksed Teva sprati.

5. Pred dajanjem je potrebno videz parenteralnih zdravil vizualno pregledati, da ne vsebujejo trdnih delcev ali da nimajo spremenjene barve. Če opazite trdne delce, te vial ne uporabite.
6. Raztopina pemetrekseda so namenjene samo enkratni uporabi. Vso neporabljeno zdravilo ali odpadke je treba zavreči v skladu z lokalnimi zahtevami za citostatike.

Previdnostni ukrepi pri pripravi in dajanju:

Kot pri drugih potencialno toksičnih učinkovinah za zdravljenje raka je potrebna previdnost pri ravnanju z raztopinami pemetrekseda za infundiranje ter pripravi teh raztopin. Priporočamo uporabo rokavic. Če pride raztopina pemetrekseda v stik s kožo, kožo nemudoma in temeljito sperite z milom in vodo. Če pride raztopina pemetrekseda v stik s sluznico, temeljito sperite z vodo. Pemetreksed ni mehurjavec. Za ekstrapazacijo pemetrekseda ni specifičnega antidota. Poročali so o nekaj primerih ekstrapazacije pemetrekseda, ki jih raziskovalec ni ocenil kot resne. Ob ekstrapazaciji ukrepajte skladno z lokalno ustaljeno prakso kot pri drugih učinkovinah, ki niso mehurjevci.