

NAVODILO ZA UPORABO

VOLTAREN® RETARD 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem

diclofenacum natricum

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo VOLTAREN® RETARD in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo VOLTAREN® RETARD
3. Kako jemati zdravilo VOLTAREN® RETARD
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila VOLTAREN® RETARD
6. Dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Voltaren® retard in za kaj ga uporabljamo

Lajšanje bolečin in vnetja pri različnih boleznih in bolečinskih stanjih:

- vnetne revmatične bolezni: revmatoidni artritis, spondiloartritis
- degenerativne revmatične bolezni: osteoartroza sklepov in hrbtenice
- zunajsklepni revmatizem: periartritis, tendinitis, tendosinovitis, burzitis
- akutni napadi protina
- bolečine v hrbtenici, mišične bolečine
- po poškodbah: zlomi, izpahi, dislokacije
- po operacijah: ortopedskih, stomatoloških, manjših kirurških posegih

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Voltaren® retard

Ne jemljite zdravila Voltaren® retard

- če ste alergični (preobčutljivi) na diklofenak ali katerikoli sestavino zdravila Voltaren® retard;
- če ste imeli ob zdravljenju z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili kadarkoli krvavitve iz prebavil ali predrtje stene prebavil;
- če imate ali pa ste imeli v preteklosti dve ali več razjed na prebavilih ali krvavitev iz prebavil;
- v zadnjem trimesečju nosečnosti;
- če imate hudo okvaro jeter ali ledvic;
- če imate hudo srčno popuščanje;

- če ste imeli ob prejemanju podobnih zdravil (acetilsalicilna kislina in druga nesteroidna protivnetna zdravila) težave, kot so poslabšanje astme, koprivnica ali vnetje nosne sluznice (rinitis).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Voltaren® retard

- Pri vseh nesteroidnih protivnetnih zdravilih so poročali o krvavitvah iz prebavil, razjedah in predrtjih stene prebavil, ki so lahko smrtne. Pojavijo se lahko kadarkoli med zdravljenjem, s simptomi ali brez njih ter s predhodnimi prebavnimi težavami ali brez njih. Pogostost neželenih učinkov pri zdravljenju z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, zlasti krvavitev iz prebavil in perforacij, ki so lahko smrtne, je običajno večja pri starostnikih. Če se pri vas pojavijo krvavitve iz prebavil ali razjede, je potrebno zdravljenje prekiniti.
- Pri zdravljenju z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, vključno z diklofenakom, so poročali o zelo redkih primerih resnih kožnih reakcij (nekateri so bile smrtne), vključno z ekfoliativnim dermatitisom (ekcemu podobno vnetje kože), Stevens-Johnsonovim sindromom (bolezen kože, ki se kaže s prehladu ali gripi podobnimi simptomi ter hudo izraženimi bolezenskimi spremembami na koži in sluznicah) in toksično epidermalno nekrolizo (ločitev podkožnice od podlage zaradi odmrtja tkiva). Kaže, da je tveganje največje ob začetku zdravljenja, reakcije pa se večinoma pojavijo prvi mesec zdravljenja. Če se pri vas pojavijo izpuščaji, razjede sluznice ali katerikoli znaki preobčutljivosti je potrebno zdravljenje z diklofenakom prekiniti.
- Tako kot pri drugih nesteroidnih protivnetnih zdravilih so tudi pri diklofenaku možne alergične reakcije, vključno s hudimi preobčutljivostnimi (anafilaktičnimi/anafilaktoidnimi) reakcijami, ki se lahko v redkih primerih pojavijo tudi ob prvem stiku z zdravilom.
- Tako kot druga nesteroidna protivnetna zdravila, lahko tudi diklofenak s svojim farmakološkim delovanjem prikrije znake in simptome okužbe.
- Diklofenak lahko zmanjša plodnost žensk, zato ni priporčljiv pri ženskah, ki želijo zanositi. Če ne morete zanositi ali če se zdravite zaradi neplodnosti, se posvetujte z zdravnikom o morebitni prekinitvi zdravljenja z diklofenakom.
- Možnost neželenih učinkov se lahko zmanjša z uporabo najmanjšega učinkovitega odmerka za najkrajše možno trajanje zdravljenja za obvladovanje (lajšanje) simptomov.
- Zaradi pomanjkanja podatkov o morebitni koristi in potencialu za seštevanje neželenih učinkov, se je potrebno izogibati sočasni uporabi diklofenaka in drugih sistemskih nesteroidnih protivnetnih zdravil, vključno s selektivnimi zaviralci ciklooksigenaze-2.
- Pri starostnikih je potrebna previdnost. Še zlasti je priporočljiva uporaba najmanjših učinkovitih odmerkov pri oslabelih starostnikih in starostnikih z majhno telesno maso.
- Reakcije na nesteroidna protivnetna zdravila, kot so poslabšanje astme (tako imenovana intoleranca na analgetike/analgetična astma), Quinckejev edem (oteklina ob alergični reakciji) ali koprivnica, so pri bolnikih z astmo, sezonskim alergijskim rinitisom, oteklo nosno sluznico (nosnimi polipi), kronično obstruktivno pljučno boleznijo ali

kroničnimi okužbami dihal (še posebej, če so povezane z alergijskimi simptomi, podobnimi rinitisu) pogostejše kot običajno. Pri omenjenih bolnikih je zato potrebna posebna previdnost (pripravljenost na takojšnje ukrepanje). Enako velja tudi za bolnike, ki so alergični na druge snovi, npr. bolniki s kožnimi reakcijami, srbečico in koprivnico.

- Tako kot pri drugih nesteroidnih protivnetnih zdravilih, je tudi pri diklofenaku potrebna posebna previdnost in skrbno spremljanje pri bolnikih s prebavnimi težavami, ali bolnikih, ki so imeli v preteklosti razjede želodca in črevesja, krvavitve ali predrtje stene prebavil. Tveganje za krvavitve iz prebavil je večje pri velikih odmerkih nesteroidnih protivnetnih zdravil, pri bolnikih s prejšnjimi razjedami (še zlasti ob pridruženih krvavitvah ali predrtju stene prebavil) in pri starostnikih.
- Pri omenjenih bolnikih in bolnikih, ki potrebujejo zdravljenje z majhnimi odmerki acetilsalicilne kisline ali drugimi zdravili, ki lahko zvečajo tveganje za zaplete na prebavilih, je potrebno razmisliti o sočasnem zdravljenju z zdravili, ki ščitijo sluznico prebavil (zaviralci protonске črpalke ali misoprostol). Posvetujte se z zdravnikom.
- O pojavu katerikoli nenavadnih prebavnih težav (zlasti krvavitev iz prebavil) morate obvestiti zdravnika.
- Previdnost je potrebna pri bolnikih z ulceroznim kolitisom ali Crohnovo boleznijo (vnetni črevesni bolezni), saj lahko zdravljenje z diklofenakom poslabša obstoječo bolezen.
- Zdravila kot je Voltaren[®] retard so lahko povezana z majhnim povečanjem tveganja srčne kapi (miokardnega infarkta) ali možganske kapi. Večja verjetnost morebitnega tveganja je pri visokih odmerkih in dolgotrajnem zdravljenju. Ne prekoračite priporočenega odmerka ali trajanja zdravljenja. Če imate težave s srcem ali ste preboleli možgansko kap ali menite, da za vas obstaja morebitno tveganje za nastanek takih dogodkov (na primer, če imate visok krvni tlak, sladkorno bolezen ali visok holesterol ali ste kadilec), se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Diklofenak lahko poslabša okvaro jeter, zato je potrebno bolnike z okvaro jeter skrbno spremljati. Tako kot pri drugih nesteroidnih protivnetnih zdravilih, se lahko tudi pri diklofenaku zvečajo vrednosti enega ali več jetrnih testov. Pri daljšem zdravljenju z diklofenakom je potrebno redno spremljanje delovanja jeter. Če so vrednosti jetrnih testov dalj časa nenormalne ali se še poslabšajo, če se pojavijo znaki in simptomi bolezni jeter ali če se pojavijo druge težave, je potrebno zdravljenje z diklofenakom prekiniti. Vnetje jetrnega tkiva (hepatitis) se lahko pojavi tudi brez predhodnih simptomov.
- Previdnost je potrebna pri bolnikih s hepatično porfirijo (dedna hepatična porfirija, ki se kaže s ponavljajočimi se napadi bolečin v trebuhu, krvavitvami v želodcu ali črevesju, nevrološkimi motnjami in zvečano količino *delta*-aminolevulinske kisline v urinu), saj lahko diklofenak sproži napad.
- Pri zdravljenju z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, vključno z diklofenakom, so poročali o zadrževanju tekočine in oteklinah. Posebna previdnost je potrebna pri bolnikih z okvaro ledvic, boleznimi srca, visokim krvnim tlakom, starostnikih, bolnikih, ki prejemajo diuretičke

(zdravila za izločanje vode) ali zdravila, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje ledvic, in bolnikov s pomembnimi motnjami volumna zunajceličnih tekočin kateregakoli vzroka (npr. pred ali po večjem kirurškem posegu). Kot previdnostni je nujno spremljanje delovanja ledvic.

- Ob dlje časa trajajočem zdravljenju je, tako kot pri drugih nesteroidnih protivnetnih zdravilih, potrebno spremljanje krvne slike.
- Tako kot druga nesteroidna protivnetna zdravila, lahko tudi zdravilo Voltaren® začasno zavre zlepljenje trombocitov (krvnih ploščic). Bolnike z motnjami strjevanja krvi je potrebno skrbno spremljati.
- Odmerki za otroke so manjši od odmerkov za odrasle. Odmerek bo določil zdravnik glede na otrokovo starost in telesno težo. Za zdravljenje otrok mlajših od 14 let zdravilo Voltaren® retard ni primerno.

Jemanje drugih zdravil

Če jemljete katerokoli od naštetih zdravil, se posvetujte z zdravnikom:

- *litij (zdravilo za zdravljenje bipolarnе motnje):* Diklofenak lahko ob sočasni uporabi zveča koncentracije litija v krvi, zato je potrebno spremljanje koncentracije litija v krvi.
- *digoksin (zdravilo za zdravljenje bolezni srca):* Diklofenak lahko ob sočasni uporabi zveča koncentracije digoksina v krvi, zato je potrebno spremljanje koncentracije digoksina v krvi.
- *diuretiki in antihipertenzivi (zdravila za izločanje vode iz telesa ter zdravljenje visokega krvnega tlaka):* Diklofenak lahko (tako kot druga nesteroidna protivnetna zdravila) zmanjša učinek diuretikov ali drugih antihipertenzivov (npr. adrenergičnih zaviralcev beta, zaviralcev angiotenzin-konvertaze). Ob sočasnem zdravljenju je zato potrebna previdnost.
- *Sočasno zdravljenje z zdravili, ki zadržujejo kalij v telesu,* je lahko povezano z zvečanimi koncentracijami kalija v krvi, zato je v takem primeru potrebno pogosto spremljanje koncentracij kalija v krvi.
- *Druga nesteroidna protivnetna zdravila in kortikosteroidi:* Sočasno zdravljenje z drugimi sistemskimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili ali kortikosteroidi lahko zveča pogostost neželenih učinkov na prebavilih.
- *Antikoagulant in antitrombotiki (zdravila za preprečevanje strjevanja krvi):* Sočasno zdravljenje lahko zveča tveganje za krvavitve iz prebavil, zato je potrebna previdnost.
- *Selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina (zdravila za zdravljenje depresije - SSRI):* Sočasna uporaba sistemskih nesteroidnih protivnetnih zdravil, vključno z diklofenakom, in SSRI lahko zveča tveganje za krvavitve iz prebavil.
- *Antidiabetiki (zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni):* Ob sočasnem zdravljenju je kot previdnostni ukrep potrebno spremljanje ravni sladkorja v krvi.
- *Metotreksat (zdravilo za zdravljenje rakavih obolenj in revmatskih bolezni):* Ob dajanju nesteroidnih protivnetnih zdravil, vključno z diklofenakom, manj kot 24 ur pred zdravljenjem z metotreksatom ali 24

ur po njem je potrebna previdnost, saj se lahko zvečajo koncentracije metotreksata v krvi.

- *Ciklosporin (zdravilo za zaviranje imunskega sistema):* Diklofenak lahko okrepi toksičnost ciklosporina za ledvice.
- *Kinoloni (vrsta antibiotikov):* Obstajajo možnost pojava epileptičnih (božjastnih) napadov ob sočasni uporabi kinolonov in nesteroidnih protivnetnih zdravil.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila Voltaren® retard skupaj s hrano in pijačo

Voltaren® retard 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem zaužijte cele s kozarcem vode, najbolje s hrano. Tablet ne smete lomiti ali žvečiti.

Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Uporabe diklofenaka pri nosečnicah niso proučevali. Diklofenak se zato ne sme uporabljati v prvih dveh trimesečjih nosečnosti, razen če koristi zdravljenja matere odtehtajo morebitno tveganje za plod. Uporaba v zadnjem trimesečju je zaradi možnosti zmanjšane krčljivosti maternice in/ali prezgodnjega zaprtja arterioznega duktusa prepovedana.

Dojenje

Diklofenak se v majhnih količinah izloča z materinim mlekom. Zdravila se zato med dojenjem ne sme uporabljati.

Plodnost

Diklofenak lahko, tako kot druga nesteroidna protivnetna zdravila, zmanjša plodnost žensk in ni priporočljiv pri ženskah, ki želijo zanositi. Pri ženskah, ki ne morejo zanositi, in ženskah, ki se zdravijo zaradi neplodnosti, je potrebno razmisliti o morebitni prekinitvi zdravljenja z diklofenakom.

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Voltaren® retard lahko vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Če se pri vas pojavijo omotica, vrtoglavica, motnje vida, zaspanost ali drugi učinki na osrednje živčevje, ne smete voziti ali upravljati strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Voltaren® retard

Zdravilo vsebuje saharozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Voltaren® retard

Pri jemanju zdravila Voltaren® retard natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerjanje in način uporabe

Voltaren[®] retard 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem zaužijte cele s kozarcem vode, najbolje s hrano. Tablet ne smete lomiti ali žvečiti.

Odrasli

Priporočeni začetni odmerek je 100 do 150 mg dnevno, priporočeni največji dnevni odmerek pa 150 mg. Lahko zaužijete eno filmsko obloženo tableto s podaljšanim sproščanjem dnevno, lahko tudi v kombinaciji z drugimi farmacevtskimi oblikami, npr. tabletami in svečkami.

Pri blagih obolenjih in pri dolgotrajnem zdravljenju običajno zadošča odmerek 100 mg dnevno. Če so simptomi najizrazitejši ponoči ali zjutraj, zdravilo Voltaren[®] retard 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem vzemite zvečer.

Otroci in mladostniki Voltaren[®] retard 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem ni primerno za otroke in mladostnike, mlajše od 14 let.

Starostniki

Pri uporabi nesteroidnih protivnetnih zdravil je potrebna previdnost, saj so starostniki bolj nagnjeni k pojavu neželenih učinkov. Uporaba najmanjših učinkovitih odmerkov je še zlasti priporočljiva pri oslabilih starostnikih in starostnikih z majhno telesno maso.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Voltaren[®] retard, kot bi smeli

Značilnih znakov prevelikega odmerjanja ni. Pojavijo se lahko bruhanje, krvavitve iz prebavil, driska, omotica, šumenje v ušesih ali epileptični napadi. Pri hudi zastrupitvi je možna akutna odpoved ledvic in okvara jeter.

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila, zaužijte aktivno oglje ali poskusite izzvati bruhanje in nemudoma pokličite nujno medicinsko pomoč. Če je bolnik nezavesten, mu ne dajajte zdravil ali pijač. Bolnika obrnite v položaj za nezavestne in nemudoma pokličite nujno medicinsko pomoč.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Voltaren[®] retard

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega.

Če ste pozabili vzeti zdravilo, vzemite naslednji odmerek kot ponavadi.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Voltaren[®] retard neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pogostnost neželenih učinkov je opredeljena takole:

Zelo pogosti	pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov
Pogosti	pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov
Občasni	pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov
Redki	pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov

Zelo redki	pojavi se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
Neznana pogostnost	pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Najpogostejše opaženi neželeni učinki so na prebavilih. Pojavijo se lahko peptične razjede, predrtje stene prebavil ali krvavitve iz prebavil, včasih smrtno, še zlasti pri starostnikih. Poročali so tudi o slabosti, bruhanju, driski, vetrovih, zaprtju, prebavnih težavah po obroku (dispepsiji), bolečini v trebuhu, temnem blatu, bruhanju krvi, vnetju ustne sluznice (ulceroznem stomatitisu), strikturah (zožitvah) ter poslabšanju kolitisa in Crohnove bolezni (vnetne črevesne bolezni). Redkeje so zabeležili vnetje želodčne sluznice (gastritis).

Pogosti: glavobol, omotica, vrtoglavica, slabost, bruhanje, driska, prebavne težave po obroku (dispepsija), bolečine v trebuhu, vetrovi, pomanjkanje ali izguba apetita (anoreksija), izpuščaji, spremenjeni jetrni testi (zvečane ravni transaminaz).

Redki: zaspanost, utrujenost, astma (vključno s težkim dihanjem), vnetje želodčne sluznice (gastritis), krvavitve iz prebavil, bruhanje krvi iz želodca ali požiralnika (hematemeza), krvava driska, temno blato, razjede želodca ali črevesja (s krvavitvijo ali brez nje ali s predrtjem stene prebavil), vnetje zadnjika (proktitis), koprivnica, oteklina, preobčutljivost, anafilaktične in anafilaktoidne reakcije (vključno z nizkim krvnim tlakom in šokom), vnetje jeter (hepatitis) z zlatenico ali brez nje, okvara jeter.

Zelo redki, neznana pogostnost: neprijetni občutki ob pospešenem bitju srca (palpitacije), bolečine v prsih, odpoved srca, srčni infarkt, spremembe krvne slike (trombocitopenija, levkopenija, anemija (vključno s hemolitično in aplastično anemijo), agranulocitoza), mravljinčenje, motnje spomina; krči, ki se kažejo s hudim tresenjem dela telesa ali celega telesa (konvulzije); tesnoba, tresenje mišic, udov in drugih delov telesa (tremor); aseptični meningitis, motnje okusa, možganskožilni dogodki, motnje vida, zamegljen vid, dvojni vid, šumenje v ušesih, poslabšanje sluha, pljučnica, vnetje črevesa (kolitis -vključno s hemoragičnim kolitisom in poslabšanjem ulceroznega kolitisa ali Crohnove bolezni), zaprtje, vnetje ustne sluznice, vnetje jezika, motnje požiralnika, diafragmi podobne zožitve v prebavilih, vnetje trebušne slinavke, poslabšanje hemoroidov, akutna odpoved ledvic, kri v urinu, beljakovine v urinu, bolezni ledvic (nefrotski sindrom, intersticijski nefritis, renalna papilarna nekroza), mehurjasti izpuščaji, ekcem, rdečina, eksudativni multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza (Lyellova bolezen), eksfoliativni dermatitis, izpadanje las, preobčutljivost na svetlobo, krvavitve v kožo in podkožje (purpura, alergična purpura), srbečica, visok krvni tlak, vnetje žil, angionevrotični edem (lokalna oteklina, ki izgine v 24 urah, vključno z oteklino obraza), vnetje jeter (fulminantni hepatitis), dezorientacija, depresija, nespečnost, nočne more, razdražljivost, psihotične motnje.

Zdravila kot je Voltaren® retard so lahko povezana z majhnim povečanjem tveganja srčne kapi (miokardnega infarkta) ali možganske kapi.

Če se pojavi alergijska reakcija na zdravilo, se kaže kot otekanje obraza, ustnic, grla in jezika. To lahko povzroči težave pri dihanju ali požiranju. V takem primeru takoj prenehajte jemati zdravilo in nemudoma obiščite zdravnika.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje zdravila Voltaren® retard

ZDRAVILO SHRANJUJE NEDOSEGLJIVO OTROKOM!

Zdravila Voltaren® retard ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Voltaren® retard

Zdravilna učinkovina je natrijev diklofenakat.

Ena filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 100 mg natrijevega diklofenakata.

Pomožne snovi so:

Jedro tablete:

brezvodni koloidni silicijev dioksid (E551)

cetilalkohol

magnezijev stearat (E572)

povidon

saharoza

Filmska obloga tablete

hipromeloza (E464)

polisorbat 80 (E433)

smukec (E553b)

titanov dioksid (E171)

železovi oksidi in hidroksidi (E172)

makrogol 6000

saharoza

Izgled zdravila Voltaren® retard in vsebina pakiranja

Voltaren® retard 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem so rožnate, zaobljene, bikonveksne filmsko obložene tablete s poševnimi robovi.

Škatla z 20 filmsko obloženimi tabletami s podaljšanim sproščanjem (2 x 10 tablet v pretisnem omotu).

Način in režim izdaje zdravila Voltaren® retard

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Pliva Ljubljana d.o.o.,
Pot k sejmišču 35,
1231 Ljubljana Črnuče

Izdelovalec

Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana, Slovenija
Pliva Krakow S.A., 80 Mogilska Str., 31 546 Krakow, Poljska

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Pliva Ljubljana d.o.o.
Pot k sejmišču 35
SI-1231 Ljubljana Črnuče
Tel.:00 386 1 58 90 390

Navodilo je bilo odobreno 11.12.2009