

NAVODILO ZA UPORABO**Losartan Generics 50 mg filmsko obložene tablete**
Losartan Generics 100 mg filmsko obložene tablete
kalijev losartanat**Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Losartan Generics in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Losartan Generics
3. Kako jemati zdravilo Losartan Generics
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Losartan Generics
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO LOSARTAN GENERICS IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Losartan Generics sodi v skupino zdravil, imenovanih antagonisti receptorjev angiotenzina II. Angiotenzin II je snov, ki nastaja v telesu. Veže se na receptorje v krvnih žilah in tako povzroči, da se zožijo. Na ta način se krvni tlak zviša. Zdravilo Losartan Generics preprečuje vezavo angiotenzina II na te receptorje, zaradi česar se krvne žile sprostijo in se krvni tlak zniža. Zdravilo Losartan Generics upočasni zmanjševanje delovanja ledvic pri bolnikih z visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo tipa 2.

Zdravilo Losartan Generics se uporablja:

- za zdravljenje odraslih ter otrok in mladostnikov, starih od 6 do 18 let, z visokim krvnim tlakom (hipertenzijo),
- za zaščito ledvic pri bolnikih s hipertenzijo in sladkorno boleznijo tipa 2, pri katerih so laboratorijski izvidi pokazali okvaro ledvic in proteinurijo $\geq 0,5$ g na dan (motnja, pri kateri se v seč izloča nenormalno velika količina beljakovin),
- za zdravljenje bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem, če zdravnik meni, da zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE, zdravila, ki se uporabljajo za zniževanje zvišanega krvnega tlaka) ni primerno. Če je srčno popuščanje stabilno ob zdravljenju z zaviralcem ACE, vam zdravnik zdravila ne sme zamenjati s kalijevim losartanatom,
- pri bolnikih z visokim krvnim tlakom in zadebeljenim levim prekatom kalijev losartanat zmanjša tveganje za možgansko kap ("indikacija iz študije LIFE").

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO LOSARTAN GENERICS**Ne jemljite zdravila Losartan Generics**

- če ste alergični (preobčutljivi) na kalijev losartanat ali katerikoli sestavino zdravila Losartan Generics,
- če imate hudo okvaro delovanja jeter,
- če ste noseči že več kot tri mesece (zdravilo Losartan Generics se je bolje izogibati tudi med zgodnjo nosečnostjo - glejte poglavje o nosečnosti).

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Losartan Generics

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali bi lahko zanosili). Jemanje zdravila Losartan Generics ne priporočamo v zgodnji nosečnosti. Če pa ste noseči dlje kot tri mesece, zdravila Losartan Generics ne smete jemati, saj lahko zdravilo v tem obdobju resno škoduje vašemu otroku (glejte poglavje o nosečnosti).

Pomembno je, da pred jemanjem zdravila Losartan Generics obvestite svojega zdravnika:

- če ste imeli kdaj v preteklosti angioedem (otekanje obraza, ustnic, žrela in/ali jezika) (glejte tudi poglavje 4 'Možni neželeni učinki').
- če močno bruhaate ali imate hudo drisko in zato izgubljate veliko tekočine in/ali soli iz telesa.
- če jemljete diuretike (zdravila, ki povečajo izločanje skozi ledvice) ali ste na dieti s hrano z zmanjšano količino soli, zaradi česar iz telesa izgubljate večje količine tekočine in soli (glejte poglavje 3 'Odmerjanje pri posebnih skupinah bolnikov').
- če veste, da imate zoženje ali zaprtje krvnih žil, ki vodijo do ledvic, ali če so vam pred kratkim presadili ledvico.
- če imate okvaro delovanja jeter (glejte poglavje 2 'Ne jemljite zdravila Losartan Generics' in poglavje 3 'Odmerjanje pri posebnih skupinah bolnikov').
- če imate srčno popuščanje z okvaro ledvic ali brez nje ali sočasne hude, življenjsko nevarne srčne aritmije. Posebna previdnost je potrebna, če sočasno jemljete zaviralce adrenergičnih receptorjev beta.
- če imate težave s srčnimi zaklopkami ali srčno mišico.
- če imate koronarno srčno bolezen (ki jo povzroča zmanjšan pretok krvi v srčnem ožilju) ali možgansko-žilno bolezen (ki jo povzroča zmanjšan pretok krvi v možganih).
- če imate primarni hiperaldosteronizem (sindrom, povezan s povečanim izločanjem hormona aldosterona iz nadledvične žleze in nastane zaradi motnje delovanja te žleze).

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, vključno s tistimi, ki ste jih dobili brez recepta ali z zdravili rastlinskega izvora in naravnimi izdelki.

Še posebej bodite pozorni, če med zdravljenjem z zdravilom Losartan Generics jemljete naslednja zdravila:

- druga zdravila za zniževanje krvnega tlaka, ker lahko še dodatno znižajo vaš krvni tlak. Krvni tlak vam lahko zniža tudi katero od naslednjih zdravil/skupin zdravil: triciklični antidepresivi, antipsihotiki, baklofen, amifostin.
- zdravila, ki zadržujejo kalij v telesu ali lahko povečajo raven kalija (npr. dodatki kalija, nadomestki soli, ki vsebujejo kalij, zdravila, ki varčujejo s kalijem, kot so določeni diuretiki [amilorid, triamteren, spironolakton] ali heparin).
- nesteroidna protivnetna zdravila, na primer indometacin, vključno z zaviralci ciklooksigenaze-2 (zdravila, ki zmanjšujejo vnetje in se lahko uporabljajo za lajšanje bolečin), ker lahko zmanjšajo učinek zdravila Losartan Generics na zniževanje krvnega tlaka.

Če imate okvaro ledvic, lahko sočasna uporaba teh zdravil vodi do poslabšanja delovanja ledvic.

Zdravila, ki vsebujejo litij, se v kombinaciji s kalijevim losartanatom brez natančnega nadzora zdravnika ne smejo uporabljati. V poštev lahko pridejo posebni previdnostni ukrepi (npr. dodatne krvne preiskave).

Jemanje zdravila Losartan Generics skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Losartan Generics lahko jemljete z hrano ali brez nje.

Nosečnost in dojenje

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če bi lahko zanosili). Praviloma vam bo zdravnik svetoval, da prekinete z jemanjem zdravila Losartan Generics, še preden zanosite ali takoj, ko ugotovite, da ste noseči. Namesto zdravila Losartan Generics vam bo svetoval drugo zdravilo. Zdravila Losartan Generics ni priporočljiva v zgodnji nosečnosti. Če pa ste noseči več kot tri mesece, zdravila Losartan Generics ne smete jemati, saj lahko zdravilo v tem obdobju resno škoduje vašemu otroku.

Dojenje

Zdravniku povejte, če dojite ali nameravate dojit. Zdravila Losartan Generics ne priporočamo doječim materam. Če nameravate dojit, vam zdravnik lahko predpiše zdravljenje z drugimi zdravili, zlasti če je vaš otrok novorojenček ali nedonošenček.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Kalijev losartanat so preizkušali pri otrocih. Za več informacij prosite zdravnika.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Študij vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev niso izvedli. Malo je verjetno, da bi zdravilo Losartan Generics vplivalo na vašo sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, vendar lahko kot mnoga druga zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka tudi zdravilo Losartan Generics povzroči omotico ali zaspanost pri nekaterih ljudeh. Če se pri vas pojavita omotica ali zaspanost, se posvetujte s svojim zdravnikom, preden začnete opravljati tovrstne dejavnosti.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Losartan Generics

To zdravilo vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate netoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO LOSARTAN GENERICS

Pri jemanju zdravila Losartan Generics natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Zdravnik vam bo predpisal ustrezen odmerek zdravila Losartan Generics glede na vaše stanje in glede na to, ali jemljete še katera druga zdravila. Pomembno je, da nadaljujete z jemanjem zdravila Losartan Generics tako dolgo, kot vam je predpisal zdravnik. Tako vzdržujete enakomeren nadzor krvnega tlaka.

Odrasli bolniki z visokim krvnim tlakom

Zdravljenje se običajno začne s 50 mg kalijevega losartanata (ena tableta zdravila Losartan Generics 50 mg) enkrat na dan. Največji učinek na zniževanje krvnega tlaka naj bi bil dosežen 3 do 6 tednov po začetku zdravljenja. Pri nekaterih bolnikih se odmerek kasneje lahko poveča na 100 mg kalijevega losartanata (dve tableti zdravila Losartan Generics 50 mg) enkrat na dan. Če imate občutek, da je učinek kalijevega losartanata premočan ali prešibek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih (starih od 6 do 18 let)

Priporočeni začetni odmerek pri bolnikih, ki tehtajo med 20 in 50 kg, je 0,7 mg kalijevega losartanata na kg telesne mase enkrat na dan (do 25 mg zdravila Losartan Generics). Zdravnik lahko odmerek poveča, v kolikor tlak ni pod nadzorom.

Odrasli bolniki z visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo tipa 2

Zdravljenje se običajno začne s 50 mg kalijevega losartanata (ena tableta zdravila Losartan Generics 50 mg) enkrat na dan. Odmerek se kasneje lahko poveča na 100 mg kalijevega losartanata (dve tableti zdravila Losartan Generics 50 mg) enkrat na dan, glede na odziv krvnega tlaka.

Zdravilo Losartan Generics lahko jemljete skupaj z drugimi zdravili za zniževanje krvnega tlaka (npr. diuretiki, zaviralci kalcijevih kanalčkov, zaviralci adrenergičnih receptorjev alfa ali beta in zdravili, ki

delujejo na osrednje živčevje), pa tudi z inzulinom in drugimi pogosto uporabljenimi zdravili za zmanjševanje ravni glukoze v krvi (npr. derivati sulfonilsečnine, glitazoni in zaviralci glukozidaze).

Odrasli bolniki s srčnim popuščanjem

Zdravljenje se običajno začne z 12,5 mg kalijevega losartanata (ena tableta zdravila Losartan Generics 12,5 mg) enkrat na dan. Odmerek zdravila navadno povečujemo postopoma, enkrat na teden (to je 12,5 mg na dan v prvem tednu, 25 mg na dan v drugem tednu, 50 mg na dan v tretjem tednu in 150 mg na dan v četrtem tednu) do vzdrževalnega odmerka, ki ga določi vaš zdravnik.

Lahko boste dobili največji odmerek, in sicer 150 mg losartana (na primer tri tablete Losartan Generics 50 mg ali eno tableto Losartan Generics 100 mg in eno tableto Losartan Generics 50 mg) enkrat na dan.

Pri zdravljenju srčnega popuščanja se kalijev losartanat običajno kombinira z diuretikom (zdravilo, ki poveča količino vode, ki se izloči skozi ledvica) in/ali digitalisom (zdravilo, ki pripomore, da je srce močnejše in učinkovitejše) in/ali zaviralcem adrenergičnih receptorjev beta.

Odmerjanje zdravila pri posebnih skupinah bolnikov

Zdravnik lahko predlaga manjši odmerek predvsem na začetku zdravljenja določenih bolnikov, kot so tisti, ki se zdravijo z velikimi odmerki diuretikov, bolniki z okvaro jeter ali bolniki, starejši od 75 let. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter pa uporaba kalijevega losartanata ni priporočljiva (glejte poglavje "Ne jemljite zdravila Losartan Generics").

Jemanje zdravila

Tablete morate pogoltniti cele s kozarcem vode. Dnevni odmerek poskusite vzeti vsak dan ob približno istem času. Pomembno je, da zdravilo Losartan Generics jemljete tako dolgo, dokler vam zdravnik ne svetuje drugače.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Losartan Generics, kot bi smeli

Če slučajno zaužijete preveč tablet, oziroma otrok pogoltne nekaj tablet, se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom. Simptomi prevelikega odmerjanja so nizek krvni tlak, pospešen srčni utrip, lahko pa tudi upočasnen srčni utrip.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Losartan Generics

Če ste pomotoma izpustili en dnevni odmerek zdravila, preprosto vzemite naslednji odmerek kot običajno. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila Losartan Generics, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Losartan Generics neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Tablete Losartan Generics takoj prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom ali pa takoj pojdite na urgenco, če se pri vas pojavi kaj od sledečega:

Huda alergijska reakcija (izpuščaj, srbenje, otekanje obraza, ustnic, ust ali žrela, ki lahko oteži požiranje ali dihanje).

To je resen vendar redek neželeni učinek, ki prizadene več kot 1 od 10.000 bolnikov vendar manj kot 1 od 1.000 bolnikov. Lahko da potrebujete nujno zdravniško pomoč ali zdravljenje v bolnišnici.

Potencialno življenjsko nevarno stanje, ki vodi do težav v delovanju ledvic (rabdomioliza) in je posledica nenormalnega razpada mišic. Kaže se z naslednjimi simptomi: mišično slabostjo,

občutljivostjo ali bolečino, še posebno ob pridruženih slabosti in visoki vročini. Neželeni učinek se pojavlja z neznano pogostnostjo (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti).

Neželeni učinki so razvrščeni takole:

zelo pogosti:	pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov
pogosti:	pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov
občasni:	pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov
redki:	pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov
zelo redki:	pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
neznana pogostnost:	pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Poročali so o naslednjih neželenih učinkih zdravila Losartan Generics:

Pogosti:

- omotica
- vrtoglavica (vertigo)
- nizek krvni tlak (posebno po veliki izgubi vode iz telesa in zato tudi iz krvnih žil, npr. pri bolnikih s hudim srčnim popuščanjem ali pri bolnikih, zdravljenih z velikimi odmerki diuretikov)
- od odmerka odvisni ortostatski učinki, kot je padec krvnega tlaka ob vstajanju iz ležečega ali sedečega položaja, ki se kaže kot omotičnost
- izčrpanost
- utrujenost
- premalo sladkorja v krvi (hipoglikemija)
- preveč kalija v krvi (hiperkaliemija)
- spremenjeno delovanje ledvic, vključno z odpovedjo ledvic
- zmanjšanje koncentracije krvnega barvila (hemoglobina), ki prenaša kisik po krvi in se kaže z naslednjimi simptomi: utrujenost, glavoboli, zasoplost ob naporu, omotica, bledica (anemija)
- zvišane vrednosti sečnine v krvi ter kreatinina in kalija v serumu pri bolnikih s srčnim popuščanjem

Občasni:

- zaspanost (somnolenca)
- glavobol
- motnje spanja
- občutek pospešenega bitja srca (palpitacije)
- bolečina ali neprijeten občutek v prsnem košu, ki pogosto izžareva v roko ali vrat, včasih v ramo in hrbet in je lahko posledica premajhne količine krvi in kisika, ki prideta do srca (angina pectoris)
- zasoplost (dispneja)
- bolečine v trebuhu
- hudo zaprtje (obstipacija)
- driska
- siljenje na bruhanje (navzea)
- bruhanje
- koprivnica (urtikarija)
- srbečica (pruritus)
- izpuščaj
- zadrževanje vode v telesu in posledično lokalizirano zatekanje (edem)
- kašelj

Redki:

- zožitev ali zamašitev krvnih žil (vaskulitis, vključno s Henoch-Schonlein purpuro)
- odrevenelost ali mravljinčenje (parestezija)
- omedlevica (sinkopa)
- zelo hitro in neredno bitje srca (atrijska fibrilacija)
- poškodba dela možganov, ki je posledica motenega pretoka krvi v možganih (možganska kap)

- vnetje jeter z naslednjimi simptomi: slabost, bruhanje, izguba apetita, splošno slabo počutje, vročina, srbečica, rumeno obarvanje kože in očesnih beločnic, svetlo obarvano blato, temno obarvan urin (hepatitis)
- povečane vrednosti jetrnega encima (alanin aminotransferaze (ALT) v krvi), ki se po prekinitvi zdravljenja običajno normalizirajo

Neznana pogostnost:

- zmanjšano število trombocitov, ki lahko vodi do povečane nagnjenosti h krvavitvam in nastanku modric (trombocitopenija)
- migrena
- nenormalno delovanje jeter
- bolečine v mišicah in sklepih
- gripi podobni simptomi
- bolečine v hrbtu
- okužba urinarnega trakta
- povečana občutljivost na sonce (fotosenzitivnost)
- impotenca
- nezmožnost doseganja ali vzdrževanja erekcije penisa (erektilne disfunkcija)
- vnetje trebušne slinavke z naslednjimi simptomi: huda bolečina v zgornjem delu trebuha, pogosto s pridruženima slabostjo in bruhanjem (pankreatitis)
- nizke vrednosti natrija v krvi (hiponetriemija)
- depresija
- splošno slabo počutje
- zvenenje, šumenje, brenčanje v ušesu (tinitus)
- motnje okušanja ali izguba okusa

Neželeni učinki pri otrocih so podobni tistim, ki so jih opazili pri odraslih.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA LOSARTAN GENERICS

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Losartan Generics ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake "Uporabno do". Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila Losartan Generics niso potrebni posebni pogoji.
Pretisnega omota ne odprite, dokler niste pripravljeni vzeti zdravila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Losartan Generics

Zdravilna učinkovina je kalijev losartanat.

Ena tableta zdravila Losartan Generics 50 mg vsebuje 50 mg kalijevega losartanata.
Ena tableta zdravila Losartan Generics 100 mg vsebuje 100 mg kalijevega losartanata.

Pomožne snovi so: laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza (PH102), predgeliran škrob, magnezijev stearat, hidroksipropilceluloza (E463), hipromeloza (E 464) in titanov dioksid (E171).

Izgled zdravila Losartan Generics in vsebina pakiranja

Zdravilo Losartan Generics 50 mg je na voljo v obliki belih, ovalnih, bikonveksnih, filmsko obloženih tablet z zaobljenim robom in z vtisnjeno oznako "LN" in "50" na obeh straneh razdelilne zareze na eni strani in "M" na drugi strani.

Razdelilna zareza je namenjena razpolovitvi tablete z namenom lažjega požiranja in ni namenjena delitvi na dva enaka odmerka.

Zdravilo Losartan Generics 100 mg je na voljo v obliki belih, ovalnih, bikonveksnih, filmsko obloženih tablet v obliki solze, z zaobljenim robom in z vtisnjeno oznako "LN100" na eni strani in "M" na drugi strani.

Zdravilo Losartan Generics je na voljo v naslednjih pakiranjih:

- Pretisni omoti iz belega neprozornega PVC filma na eni strani in toplotno zavarjeno aluminijevo folijo na drugi strani.
- Beli neprozorni HDPE vsebniki s širokim vratom ter na vrhu toplotno zavarjeno zaščitno folijo in z belo neprozorno polipropilensko (PP) zaporko.

Velikosti pakiranj:

- pretisni omoti: 7, 10, 14, 21, 28, 30, 38, 56, 60, 84, 90, 98 in 100 filmsko obloženih tablet
- plastični vsebniki: 500 in 100 filmsko obloženih tablet

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velika Britanija

Izdelovalca

- McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irska
- Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velika Britanija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	Losartan Jenson xx mg Filmtabletten
Belgija	Losartan Jenson xx mg, filmomhulde tabletten
Ciper	Losartan Mylan
Češka	Losartan Mylan xx mg potahované tablety
Danska	Solartan
Finska	Solartan
Francija	LOSARTAN MYLAN PHARMA xx mg, comprimé pelliculé
Nemčija	Losartan Jenson xx mg Filmtabletten
Madžarska	Losartan Mylan xx mg Filmtabletta
Irska	Losartan Mylan
Italija	Losartan Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg compresse rivestite con film
Luksemburg	Losartan Jenson
Norveška	Losartan Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg tablet, filmdrasjert
Nizozemska	Losartankalium Mylan xx mg, filmomhulde tabletten
Poljska	Tenlosar
Portugalska	Tenlosarian
Romunija	Losartan Jenson xx mg comprimate filmate
Slovenija	Losartan Generics 50 mg filmsko obložene tablete Losartan Generics 100 mg filmsko obložene tablete
Španija	Losartan MYLAN Pharmaceuticals 12,5 mg inicio comprimidos recubiertos con película EFG Losartan MYLAN Pharmaceuticals 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG Losartan MYLAN Pharmaceuticals 50 mg, 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Švedska	Solartan
Velika Britanija	Losartan Potassium xx mg Film-coated Tablets

Navodilo je bilo odobreno: 26.07.2013