

NAVODILO ZA UPORABO

Cipralex 5 mg orodisperzibilne tablete
Cipralex 10 mg orodisperzibilne tablete
Cipralex 20 mg orodisperzibilne tablete
escitalopram

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Cipralex in zakaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Cipralex
3. Kako jemati zdravilo Cipralex
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Cipralex
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO CIPRALEX IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Cipralex vsebuje escitalopram in ga uporabljamo za zdravljenje depresije (epizode velike depresije) in anksioznih motenj (na primer panične motnje z agorafobijo ali brez nje, socialne anksiozne motnje, generalizirane anksiozne motnje in obsesivno-kompulzivne motnje).

Escitalopram sodi v skupino antidepresivov, imenovanih selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina (SSRI). Ta zdravila delujejo na serotoninski sistem v možganih tako, da zvišajo raven serotonina. Motnje v delovanju serotoninskega sistema veljajo za pomemben dejavnik pri razvoju depresije in njen sorodnih bolezni.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO CIPRALEX

Ne jemljite zdravila Cipralex

- če ste alergični (preobčutljivi) na escitalopram ali katerikoli sestavino zdravila Cipralex (glejte poglavje 6. Dodatne informacije);
- če jemljete druga zdravila, ki sodijo v skupino imenovano zaviralci MAO, vključno s selegilinom (uporablja se pri zdravljenju Parkinsonove bolezni), moklobemidom (uporablja se za zdravljenje depresije) ali linezolidom (antibiotik).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Cipralex

Prosimo, povejte svojemu zdravniku, če imate še katere druge zdravstvene težave ali bolezni, saj bo moral zdravnik to morda upoštevati pri zdravljenju. Povejte zdravniku še zlasti:

- če imate epilepsijo. Zdravljenje z zdravilom Cipralex je potrebno prekiniti, če se pojavijo napadi s krči ali če se poveča njihova pogostnost (glejte tudi poglavje 4. Možni neželeni učinki).
- če imate jetrno ali ledvično okvaro. Zdravnik bo moral morda prilagoditi odmerek.
- če imate sladkorno bolezen. Zdravljenje z zdravilom Cipralex lahko spremeni glikemični nadzor. Morda bo potrebno prilagoditi odmerke insulina oziroma peroralnih antiglikemikov.

- če imate znižano raven natrija v krvi.
- če ste nagnjeni h krvavitvam oziroma modricam.
- če prejimate elektrokonvulzivno terapijo.
- če imate koronarno bolezen srca.

Prosimo bodite pozorni

Nekateri bolniki z manično-depresivno boleznijo lahko preidejo v manično fazo. Za to stanje so značilne nenavadne in hitro menjavajoče se ideje, neumestna veselost in zvečana telesna aktivnost. Če to doživljate, obiščite svojega zdravnika.

V prvih tednih zdravljenja se lahko pojavijo tudi simptomi, kot so nemir ali nezmožnost mirnega sedenja oziroma stanja. Če doživljate te simptome, takoj povejte svojemu zdravniku.

Misli na samomor in poslabšanje depresije ali anksiozne motnje

Pri bolnikih z depresijo in/ali anksiozno motnjo se občasno lahko pojavijo misli na samopoškodovanje ali samomor. Po prvi uvedbi zdravljenja z antidepresivi lahko te misli postanejo še hujše, saj tovrstna zdravila začnejo delovati šele čez nekaj časa, običajno čez dva tedna, nekatera pa tudi kasneje.

Pojav takšnih misli je verjetnejši:

- če ste že kdaj razmišljali o samomoru ali samopoškodovanju.
- če ste **mlajša odrasla oseba**. Podatki iz kliničnih preskušanj kažejo, da pri mlajših odraslih (mlajših od 25 let) z motnjami razpoloženja med zdravljenjem z antidepresivi obstaja večje tveganje za pojav samomorilnega vedenja.

Če kadarkoli začnete razmišljati o samopoškodovanju ali samomoru, **se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom ali poiščite pomoč v najbližji bolnišnici.**

Morda bi bilo koristno, če za težave z depresijo ali anksioznostjo **poveste sorodniku ali dobremu prijatelju** in ga prosite, da prebere to navodilo. Prosite ga lahko tudi, da naj vas opozori, če meni, da se je depresija ali anksioznost poslabšala ali ga skrbijo spremembe v vašem vedenju.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let

Zdravila Ciprallex se običajno ne sme uporabiti za otroke in mladostnike, mlajše od 18 let. Vedeti morate tudi, da pri bolnikih, mlajših od 18 let, ki jemljejo zdravila iz te skupine, obstaja povečano tveganje za pojav neželenih učinkov, npr. poskus samomora, samomorilne misli in sovražnost (večinoma nasilno vedenje, nasprotno vedenje in jeza). Kljub temu, lahko vaš zdravnik predpiše zdravilo Ciprallex za bolnike, mlajše od 18 let, če se odloči, da je to najboljše za bolnika. Če je vaš zdravnik predpisal zdravilo Ciprallex za bolnika, mlajšega od 18 let, in se želite pogovoriti o tem, se vrnite k zdravniku. Če se pri bolnikih, ki so mlajši od 18 let in jemljejo zdravilo Ciprallex pojavi ali poslabša katerikoli od zgoraj navedenih simptomov, morate obvestiti svojega zdravnika. Poleg tega za zdravilo Ciprallex še niso dokazani varnostni učinki na dolgi rok v zvezi z rastjo, odraščanjem, kognitivnim in vedenjskim razvojem v tej starostni skupini.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Povejte svojemu zdravniku, če jemljete katerokoli izmed naslednjih zdravil:

- "Neselektivne zaviralce monoaminoksidaze (zaviralce MAO)", ki kot zdravilno učinkovino vsebujejo fenelzin, iproniazid, isokarboksazid, nialamid ali tranilcipromin. Če jemljete katero izmed teh zdravil, je potrebno počakati 14 dni, preden začnete jemati zdravilo Ciprallex. Po prenehanju jemanja zdravila Ciprallex je potrebno počakati 7 dni, preden začnete jemati katero od navedenih zdravil.
- "Reverzibilne selektivne zaviralce MAO-A", ki vsebujejo moklobemid (uporabljamo ga za zdravljenje depresije).

- "Ireverzibilne zaviralce MAO-B, ki vsebujejo selegilin (uporabljamo ga za zdravljenje Parkinsonove bolezni). Ta zdravila povečajo tveganje za neželene učinke.
- Antibiotik linezolid.
- Litij (uporabljamo ga za zdravljenje manično-depresivne motnje) in triptofan.
- Imipramin in desipramin (zdravili za zdravljenje depresije).
- Sumatripan in podobna zdravila (uporabljamo jih za zdravljenje migrene) ter tramadol (uporabljamo ga proti hudim bolečinam) povečajo tveganje za neželene učinke.
- Cimetidin in omeprazol (zdravili za zdravljenje želodčnih razjed), fluvoksamin (antidepresiv) in tiklopidin (uporabljamo ga zmanjševanje tveganja za kap). Ta zdravila lahko povzročijo zvišanje ravni zdravila Cipralex v krvi.
- Šentjanževko (*Hypericum perforatum*) - zeliščni pripravek, ki ga uporabljamo proti depresiji.
- Acetilsalicilna kislina in nesteroidna protivnetna zdravila (zdravila, namenjena lajšanju bolečine ali redčenju krvi, tako imenovani antikoagulantni).
- Varfarin, dipiridamol in fenpropionmon (zdravila za redčenje krvi, tako imenovani antikoagulantni). Ob začetku in zaključku zdravljenja z zdravilom Cipralex bo vaš zdravnik verjetno preveril čas strjevanja krvi, da bi ugotovil, ali je vaš odmerek antikoagulantnega še vedno ustrezen.
- Meflokin (za zdravljenje malarije), bupropion (za zdravljenje depresije) in tramadol (za lajšanje hudih bolečin) zaradi možnega tveganja za znižanje praga za pojav napadov/krčev.
- Nevroleptike (zdravila za zdravljenje shizofrenije, psihoz) zaradi možnega tveganja za znižanje praga za pojav napadov/krčev in antidepresive.
- Flekainid, propafenon in metoprolol (uporabljamo jih pri srčno-žilnih boleznih), klomipramin in nortriptilin (antidepresivi) ter risperidon, tioridazin in haloperidol (antipsihotiki). Morda bo potrebno prilagoditi odmerek zdravila Cipralex.

Jemanje zdravila Cipralex skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Cipralex lahko jemljete s hrano ali brez nje (glejte poglavje 3. Kako jemati zdravilo Cipralex).

Tako kot pri številnih drugih zdravilih uživanje alkohola ob sočasnem jemanju zdravila Cipralex ni priporočljivo, čeprav ni pričakovati, da bi zdravilo Cipralex součinkovalo z alkoholom.

Nosečnost in dojenje

Obvestite svojega zdravnika, če ste noseči ali nameravate zanositi. Ne jemljite zdravila Cipralex, če ste noseči, razen če ste se o možni koristnosti in tveganjih prej pogovorili s svojim zdravnikom.

Če jemljete zdravilo Cipralex v zadnjem trimesečju nosečnosti, morate vedeti, da se lahko pri novorojenčku pojavijo naslednji učinki: težave z dihanjem, modrikasta koža, krči, spremembe telesne temperature, težave s hranjenjem, bruhanje, nizka raven krvnega sladkorja, toge ali mlahave mišice, živahni refleksi, tremor, nemirnost, razdražljivost, otopelost, neprestan jok, zaspanost in težave s spanjem. Če se pri novorojenčku pojavi kateri od teh simptomov, takoj obiščite zdravnika.

Če uporabljate zdravilo Cipralex med nosečnostjo, zdravljenja nikoli ne smete prekiniti nenadoma.

Ne jemljite zdravila Cipralex, če dojite, razen če ste se o možni koristnosti in tveganjih prej pogovorili s svojim zdravnikom.

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Vožnja avtomobila ali upravljanje strojev ni priporočljivo, dokler ne ugotovite, kako zdravilo Cipralex deluje na vas.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO CIPRALEX

Zdravilo Cipralex orodisperzibilne tablete se jemlje vsak dan v enkratnem dnevnem odmerku. Zdravilo Cipralex lahko zaužijete s hrano ali brez nje. Tableto položite na jezik. Tableta se hitro razpusti in se jo lahko zaužije brez vode.

Pri jemanju zdravila Cipralex natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odrasli

Depresija

Običajni priporočeni odmerek zdravila Cipralex je 10 mg, v enkratnem dnevnem odmerku. Zdravnik lahko zviša odmerek do največ 20 mg dnevno.

Panična motnja

Začetni odmerek v prvem tednu zdravljenja z zdravilom Cipralex je 5 mg, v enkratnem dnevnem odmerku, ki mu sledi zvišanje na 10 mg dnevno. Zdravnik lahko zviša odmerek do največ 20 mg dnevno.

Socialna anksiozna motnja

Običajni priporočeni odmerek zdravila Cipralex je 10 mg, v enkratnem dnevnem odmerku. Zdravnik lahko odmerek bodisi zniža na 5 mg dnevno bodisi zviša do največ 20 mg dnevno, odvisno od tega, kako se odzivaste na zdravilo.

Generalizirana anksiozna motnja

Običajni priporočeni odmerek zdravila Cipralex je 10 mg, v enkratnem dnevnem odmerku. Zdravnik lahko zviša odmerek do največ 20 mg dnevno.

Obsesivno-kompulzivna motnja

Običajni priporočeni odmerek zdravila Cipralex je 10 mg, v enkratnem dnevnem odmerku. Zdravnik lahko zviša odmerek do največ 20 mg dnevno.

Starejši bolniki (starejši od 65 let)

Običajni priporočeni začetni odmerek zdravila Cipralex je 5 mg, v enkratnem dnevnem odmerku.

Otroci in mladostniki (do 18. leta starosti)

Zdravila Cipralex običajno ne dajemo otrokom in mladostnikom. Za podrobnejše informacije glejte poglavje 2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Cipralex.

Trajanje zdravljenja

Morda bo trajalo nekaj tednov preden boste občutili izboljšanje. Zato je potrebno nadaljevati z jemanjem zdravila Cipralex, četudi bo trajalo nekaj časa, preden boste občutili izboljšanje svojega stanja.

Ne spreminjajte odmerka zdravila, ne da bi se predhodno o tem posvetovali s svojim zdravnikom.

Nadaljujte z jemanjem zdravila tako dolgo, kot vam priporoča vaš zdravnik. Če prehitro prenehate z zdravljenjem, se lahko simptomi ponovno pojavijo, zato je priporočljivo, da z zdravljenjem nadaljujete vsaj še 6 mesecev po tem, ko se spet dobro počutite.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Cipralex, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek od predpisanega odmerka zdravila Cipralex, takoj obvestite svojega zdravnika ali se obrnite na oddelek za nujno pomoč najbližje bolnišnice. To storite tudi, če ni znakov

nelagodja. Nekateri znaki prekomernega odmerka so lahko omotica, tresenje, vznemirjenost, krči, koma, bruhanje, slabost, bruhanje, spremembe srčnega utripa, znižan krvni pritisk in spremembe v ravnovesju tekočin/soli. Ko greste k zdravniku ali v bolnišnico, vzemite škatlico oziroma vsebnik zdravila Cipralex s seboj.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Cipralex

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Če ste pozabili vzeti predpisani odmerek in se spomnite preden greste spat, vzemite odmerek takoj. Naslednji dan nadaljujte kot običajno. Če se spomnite šele ponoči ali naslednji dan, izpuscite pozabljeni odmerek in nadaljujte kot običajno.

Če ste prenehali jemati zdravilo Cipralex

Ne prenehajte jemati zdravila Cipralex, dokler vam tega ne naroči zdravnik. Ko zaključite potek zdravljenja, se na splošno priporoča postopno zniževanje odmerka zdravila Cipralex, ki naj traja nekaj tednov.

Ko prenehate jemati zdravilo Cipralex, še zlasti, če je prekinitev nenadna, lahko občutite odtegnitvene simptome. Ob prenehanju zdravljenja z zdravilom Cipralex so ti pogosti. Tveganje je večje, če je bilo zdravljenje z zdravilom Cipralex dolgotrajno ali v visokih odmerkih ali kadar je zniževanje odmerka prehitro. Pri večini ljudi so simptomi blagi in preidejo sami od sebe v dveh tednih, medtem, ko so lahko pri nekaterih bolnikih močnejše izraženi ali trajajo dlje časa (2-3 mesece ali več). Če se vam po prenehanju jemanja zdravila Cipralex pojavijo hudi odtegnitveni simptomi, obiščite zdravnika. Morda vam bo naročil, da začnete tablete ponovno jemati in jih opuščate počasneje.

Med odtegnitvene simptome sodijo: omotičnost (nestabilnost ali neravnotežje), občutek mravljinčenja, občutek žarenja in (redkeje) občutek elektriziranja, vključno z glavo, motnje spanja (živahne sanje, nočne more, nezmožnost spanja), občutek tesnobe, glavoboli, slabost (siljenje na bruhanje), potenje (vključno z nočnim potenjem), nemir oziroma vznemirjenost, tremor (tresavica), občutek zmedenosti oziroma dezorientiranosti, poudarjena čustvenost oziroma razdražljivost, driska (tekoče blato), motnje vida, razbijanje ali drgetanje srca (palpitacije).

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo Cipralex neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki običajno izginejo po nekaj tednih zdravljenja. Prosimo, ne pozabite, da so nekateri učinki morda le simptomi vaše bolezni in bodo z izboljšanjem počutja minili.

Obiščite zdravnika, če se med zdravljenjem pojavi kateri od naslednjih neželenih učinkov:

Občasni (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikov od 1.000 bolnikov):

- nenavadne krvavitve, vključno s krvavitvami v prebavilih.

Redki (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikov od 10.000 bolnikov):

- Če občutite otekanje kože, jezika, ustnic ali obraza, ali če imate težave s požiranjem oziroma dihanjem (alergijska reakcija), takoj obiščite zdravnika ali pojdite v bolnišnico.
- Visoka vročina, vznemirjenost, zmedenost, tresenje in nenadzorovano krčenje mišic so lahko znaki redkega stanja, imenovanega serotoninski sindrom. Če občutite omenjeno, pojdite k zdravniku.

Če občutite naslednje neželene učinke, morate takoj obiskati zdravnika ali iti v bolnišnico:

- težave pri uriniranju,
- napadi/krči, glejte tudi poglavje "Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Cipralex",
- porumenitev kože in beločnice sta znaka jetrne okvare/hepatitisa.

Poleg zgoraj omenjenih so navajali še naslednje neželene učinke:

Zelo pogosti (pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- slabost (siljenje na bruhanje).

Pogosti (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikov od 100 bolnikov):

- zamašen nos ali nahod (sinusitis),
- zmanjšan ali povečan apetit,
- tesnoba, nemir, nenavadne sanje, težave pri uspanju, zaspanost, omotica, zehanje, tremor, mravljinčenje,
- driska, zaprtje, bruhanje, suha usta,
- močnejše potenje,
- bolečina v mišicah in sklepih (artralgija in mialgija),
- motnje na področju spolnosti (zapoznela ejakulacija, težave z erekcijo, zmanjšana spolna sla, ženske imajo lahko težave pri doseganju orgazma),
- utrujenost, vročina,
- povečanje telesne mase.

Občasni (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikov od 1.000 bolnikov):

- koprivnica (urtikarija), izpuščaj, srbečica (pruritus),
- šklepetanje z zobmi, vznemirjenost, živčnost, panični napadi, zmedenost,
- motnje spanja, motnje okusa, omedlevica (sinkopa),
- razširjene zenice (midriaza), motnje vida, zvonjenje v ušesih (tinitus),
- izpadanje las,
- vaginalna krvavitev,
- zmanjšanje telesne mase,
- hiter srčni utrip,
- otekanje rok in nog,
- krvavitev iz nosu.

Redki (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikov od 10.000 bolnikov):

- napadalnost, depersonalizacija, halucinacije,
- počasen srčni utrip.

Nekateri bolniki so navajali (neznana pogostnost):

- misli na samopoškodovanje ali na samomor, glejte tudi poglavje "Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Cipralex",
- znižane ravni natrija v krvi (simptomi so slabost in nelagodje z mišično šibkostjo in zmedenostjo),
- omotica ob vstajanju zaradi nizkega krvnega pritiska (ortostatična hipotenzija),
- neustrezne vrednosti jetrnih testov (povečana količina jetrnih encimov v krvi),
- motnje gibanja (nehotni gibi mišic),
- boleče erekcije (priapizem),
- motnje strjevanja krvi, vključno s krvavitvami v koži in sluznicah (ekhimoze) ter nizka raven krvnih ploščic (trombocitopenija),
- nenadno otekanje kože ali sluznic (angioedem),
- povečana količina izločenega urina (neustrezno izločanje ADH),
- iztekanje mleka pri ženskah, ki ne dojijo,
- manija.

Ob omenjenih, se med zdravljenjem z zdravili, ki delujejo podobno kot escitalopram (zdravilna učinkovina zdravila Cipralex), pojavljata še neželena učinka:

- motorični nemir (akatzija),
- anoreksija.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CIPRALEX

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Zdravila Cipralex ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na vsebniku ali škatli za EXP.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zdravila ne smete odvreči v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Cipralex

Zdravilna učinkovina je escitalopram. Ena tableta zdravila Cipralex vsebuje 5 mg, 10 mg, ali 20 mg escitaloprama.

Pomožne snovi so:

manitol, mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev karmelozat, kalijev acesulfamat, neohesperidin-dihidrohalon, aroma poprove mete, aroma grenivke in magnezijev stearat.

Izgled zdravila Cipralex in vsebina pakiranja

Zdravilo Cipralex je v obliki 5-mg, 10-mg ali 20-mg orodisperzibilnih tablet. Tablete so opisane spodaj:

5 mg: okrogle, neobložene, bele tablete z jamico na obeh straneh.

10 mg: ovalne, neobložene, bele tablete z jamico na obeh straneh.

20 mg: okrogle, neobložene, bele tablete

Zdravilo Cipralex je na voljo v naslednjih velikostih pakiranja:

Polietilenski vsebnik s polipropilensko zaporko in sušilnim sredstvom.

5, 10 in 20 mg: 100 tablet

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Lundbeck Pharma d.o.o.

Titova cesta 8

SI-2000 Maribor

Slovenija

Izdelovalec:

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Copenhagen-Valby
Danska

Način in režim izdajanja zdravila Cipralex:

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	Cipralex 5mg, 10 mg, 20 mg Schmelztablette
Belgija	Sipralexa 5-10-20 mg Coprimé orodispersible / Orodispergeerbare tablet
Bolgarija	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Таблетки диспергиращи се в устата
Ciper	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα
Češka	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Tableta dispergovatel'ná v ústech
Danska	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Smeltetablet
Estonija	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Suus dispergeeruv tablett
Finska	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Tabletti, suussa hajoava
Francija	Seroplex 5mg, 10mg, 20mg Comprimé orodispersible
Nemčija	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Schmelztabletten
Grčija	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Δισκία διασπειρόμενο στο στόμα
Madžarska	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Szájban diszpergálódó tableta
Islandija	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Munndreifitafla
Irska	Lexapro 5mg, 10mg, 20mg Orodispersible tablet
Italija	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Compressa orodispersibile
Latvija	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Mutē disperģējamās tabletes
Litva	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Burnoje disperguojamoji tabletė
Luksemburg	Sipralexa 5mg, 10mg, 20mg Comprimé orodispersible / Orodispergeerbare tablet
Malta	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Pillola li tinħall fil-ħalq
Norveška	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Smeltetablett
Poljska	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Portugalska	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Comprimido orodispersível
Romunija	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Comprimate orodispersabile
Slovaška	Cipralex 5mg, 10mg, 20 mg Orodispergovateľ'ná tableta
Slovenija	Cipralex 5 mg, 10 mg, 20 mg orodisperzibilne tablete
Španija	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Comprimido bucodispersable
Švedska	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Munsönderfallande tablett
Velika Britanija	Cipralex 5mg, 10mg, 20mg Orodispersible tablet

Navodilo je bilo odobreno: 18.01.2010