

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1. IME ZDRAVILA

SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov emulzija za infundiranje

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Zdravilo SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov sestavlja sistem triprekatnih vreč. Vsaka vreča vsebuje naslednje delne količine, odvisno od petih velikosti pakiranja.

	506 ml	1012 ml	1518 ml	2025 ml	2531 ml	na 1000 ml
Raztopina aminokislin 10 %	331 ml	662 ml	993 ml	1325 ml	1656 ml	654 ml
Glukoza 42 %	102 ml	204 ml	306 ml	408 ml	510 ml	202 ml
Emulzija lipidov 20 %	73 ml	146 ml	219 ml	292 ml	365 ml	144 ml

To ustreza naslednjim celotnim sestavam:

Učinkovine	506 ml	1012 ml	1518 ml	2025 ml	2531 ml	na 1000 ml
alanin	4,6 g	9,3 g	14 g	19 g	23 g	9,2 g
arginin	4,0 g	7,9 g	12 g	16 g	20 g	7,9 g
glicin	3,6 g	7,3 g	11 g	15 g	18 g	7,2 g
histidin	1,0 g	2,0 g	3,0 g	4,0 g	5,0 g	2,0 g
izolevcin	1,7 g	3,3 g	5,0 g	6,6 g	8,3 g	3,3 g
levcin	2,4 g	4,9 g	7,3 g	9,8 g	12 g	4,8 g
lizin (kot acetat)	2,2 g	4,4 g	6,6 g	8,7 g	11 g	4,3 g
metionin	1,4 g	2,8 g	4,3 g	5,7 g	7,1 g	2,8 g
fenilalanin	1,7 g	3,4 g	5,1 g	6,8 g	8,4 g	3,3 g
prolin	3,7 g	7,4 g	11 g	15 g	19 g	7,3 g
serin	2,2 g	4,3 g	6,5 g	8,6 g	11 g	4,3 g
tavrin	0,33 g	0,66 g	1,0 g	1,3 g	1,7 g	0,65 g
treonin	1,5 g	2,9 g	4,4 g	5,8 g	7,3 g	2,9 g
triptofan	0,66 g	1,3 g	2,0 g	2,7 g	3,3 g	1,3 g
tirozin	0,13 g	0,26 g	0,40 g	0,53 g	0,66 g	0,26 g
valin	2,1 g	4,1 g	6,2 g	8,2 g	10 g	4,1 g
glukoza monohidrat <i>kar ustreza</i> glukozi	43 g	86 g	129 g	171 g	214 g	85 g
prečiščeno sojino olje	4,4 g	8,8 g	13 g	18 g	22 g	8,7 g
nasičeni srednjeveržni trigliceridi	4,4 g	8,8 g	13 g	18 g	22 g	8,7 g
prečiščeno olivno olje	3,7 g	7,3 g	11 g	15 g	18 g	7,2 g
ribje olje, bogato z omega-3-kislinami	2,2 g	4,4 g	6,6 g	8,8 g	11 g	4,3 g

Kar ustreza:

	506 ml	1012 ml	1518 ml	2025 ml	2531 ml	na 1000 ml
• aminokisline	33,1 g	66,3 g	99,4 g	133 g	166 g	65,5 g
• dušik	5,3 g	10,6 g	15,9 g	21,2 g	26,5 g	10,5 g
• ogljikovi hidrati						
- glukoza (brezvodna)	42,8 g	85,7 g	129 g	171 g	214 g	84,7 g
• lipidi	14,6 g	29,2 g	43,8 g	58,4 g	73,0 g	28,9 g
• acetat ¹⁾	48,6 mmol	97,2 mmol	146 mmol	194 mmol	243 mmol	96,0 mmol
• fosfat ²⁾	1,1 mmol	2,2 mmol	3,3 mmol	4,4 mmol	5,5 mmol	2,2 mmol
• vsebnost energije						
- celotna (približno)	450 kcal 1,9 MJ	900 kcal 3,8 MJ	1350 kcal 5,6 MJ	1800 kcal 7,5 MJ	2250 kcal 9,4 MJ	889 kcal 3,7 MJ
- nebeljakovinska (približno)	317 kcal 1,3 MJ	635 kcal 2,7 MJ	952 kcal 4,0 MJ	1270 kcal 5,3 MJ	1590 kcal 6,6 MJ	627 kcal 2,6 MJ

¹⁾ Prispevek iz raztopine aminokislin.

²⁾ Prispevek iz emulzije lipidov.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Emulzija za infundiranje.

Raztopini glukoze in aminokislin sta bistri in brezbarvni do rahlo rumeni in brez delcev. Emulzija lipidov je bela in homogena.

Osmolalnost: približno 1400 mosmol/kg vode

Osmolarnost: približno 1200 mosmol/l

pH (po mešanju): približno 5,6

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Parenteralna prehrana odraslih in otrok starih 2 leti ali več, kadar peroralno ali enteralno hranjenje ni mogoče, ni zadostno ali je kontraindicirano.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Po premešanju 3 prekatov je zdravilo videti kot bela emulzija.

Odmerjanje in hitrost infundiranja je treba določiti glede na bolnikovo sposobnost izločanja lipidov, presnavljanja dušika in glukoze in glede na prehranske potrebe; glejte poglavje 4.4.

Odmerek je potrebno individualno prilagoditi glede na bolnikovo klinično stanje, telesno maso, prehranske potrebe in potrebe po energiji. Prilagoditi ga je potrebno tudi po dodatnem peroralnem/enteralnem vnosu.

Potreba po dušiku za vzdrževanje telesne mase beljakovin je odvisna od bolnikovega stanja (npr. prehranskega stanja in stopnje kataboličnega stresa ali anabolizma).

Odrasli

Pri normalnem prehranskem stanju ali pri stanjih z blagim kataboličnim stresom so potrebe od 0,10 g do 0,15 g dušika/kg telesne mase/dan (od 0,6 g do 0,9 g aminokislin/kg telesne mase/dan). Pri bolnikih z zmernim do velikim presnovnim stresom, s podhranjenostjo ali brez nje, so potrebe od 0,15 g do 0,25 g dušika/kg telesne mase/dan (od 0,9 g do 1,6 g aminokislin/kg telesne mase/dan). V nekaterih izjemnih primerih (npr. pri opeklinah ali izrazitem anabolizmu) je lahko potreba po dušiku celo še večja.

Odmerjanje:

Razpon odmerkov od 13 ml do 31 ml zdravila SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov/kg telesne mase/dan ustreza od 0,14 g do 0,32 g dušika/kg telesne mase/dan (od 0,85 g do 2,0 g aminokislin/kg telesne mase/dan) in od 12 kcal do 28 kcal/kg telesne mase/dan celotne energije (od 8 kcal do 19 kcal/kg telesne mase/dan nebeljakovinske energije). To pokrije potrebe večine bolnikov. Debelim bolnikom je treba odmerek določiti glede na ocenjeno idealno telesno maso.

Hitrost infundiranja:

Največja običajna hitrost infundiranja glukoze je 0,25 g/kg telesne mase/uro, aminokislin 0,1 g/kg telesne mase/uro in lipidov 0,15 g/kg telesne mase/uro.

Hitrost infundiranja ne sme preseči 1,5 ml/kg telesne mase/uro (kar ustreza 0,13 g glukoze, 0,10 g aminokislin in 0,04 g lipidov/kg telesne mase/uro). Priporočeni čas infundiranja je od 14 do 24 ur.

Intradializna parenteralna prehrana (IDPN -Intradialytic parenteral nutrition)

Največja hitrost infundiranja za intradializno parenteralno prehrano (IDPN) pri stabilnih odraslih bolnikih na kroničnem ledvičnem nadomestnem zdravljenju je 3,0 ml/kg/h (kar ustreza 0,20 g aminokislin/kg/h, 0,25 g glukoze/kg/h in 0,09 g lipidov/kg/h). Volumen infuzije pri IDPN je potrebno voditi glede na vrzel med peroralnim vnosom hrane in priporočenim vnosom hranil, neizogibni izgubi hranil, ki jih povzroča nadomestno zdravljenje ledvic, ter individualni presnovni toleranci bolnika. Običajni čas infundiranja za uporabo pri IDPN je 3-5 ur, odvisno od bolnikovih potreb in načrtovanega trajanja nadomestnega ledvičnega zdravljenja. Največji priporočeni dnevni odmerek ostane nespremenjen.

Največji dnevni odmerek:

Največji dnevni odmerek je odvisen od bolnikovega kliničnega stanja in se lahko celo iz dneva v dan spreminja. Priporočeni največji dnevni odmerek je 31 ml/kg telesne mase/dan.

Priporočeni največji dnevni odmerek 31 ml/kg telesne mase/dan zagotavlja 2,0 g aminokislin/kg telesne mase/dan (kar ustreza 0,32 g dušika/kg telesne mase/dan), 2,6 g glukoze/kg telesne mase/dan, 0,9 g lipidov/kg telesne mase/dan in 28 kcal celotne vsebnosti energije/kg telesne mase/dan (kar ustreza 19 kcal nebeljakovinske energije/kg telesne mase/dan).

Pediatrična populacija

Otroci (2-11 let)

Odmerjanje:

Odmerke do 31 ml/kg telesne mase/dan je potrebno redno prilagajati potrebam pediatričnega bolnika, ki se spreminjajo bolj kot pri odraslih bolnikih.

Hitrost infundiranja:

Priporočena največja hitrost infundiranja je 1,8 ml/kg telesne mase/uro (kar ustreza 0,12 g aminokislin/kg/uro, 0,15 g/glukoze/kg/uro in 0,05 g lipidov/kg/uro). Infundiranje pri priporočeni največji hitrosti ne sme trajati dlje kot 17 ur, razen v izjemnih primerih in pod skrbnim nadzorom.

Priporočeno trajanje infundiranja je 12-24 ur.

Največji dnevni odmerek:

Največji dnevni odmerek je odvisen od bolnikovega kliničnega stanja in se lahko celo iz dneva v dan spreminja. Priporočeni največji dnevni odmerek je 31 ml/kg telesne mase/dan.

Priporočeni največji dnevni odmerek 31 ml/kg telesne mase/dan zagotavlja 2 g aminokislin/kg telesne mase/dan (kar ustreza 0,32 g dušika /kg telesne mase/dan), 2,6 g glukoze/kg telesne mase/dan, 0,9 g lipidov/kg telesne mase/dan in 28 kcal celotne energije/kg telesne mase/dan (kar ustreza 19 kcal nebeljakovinske energije/kg telesne mase/dan).

Mladostniki (12-16/18 let)

Pri mladostnikih se sme zdravilo SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov uporabljati tako kot pri odraslih.

Način uporabe

Intravenska uporaba, infundiranje v centralno veno.

Pet različnih velikosti pakiranj zdravila SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov je namenjenih bolnikom z velikimi, zmerno povečanimi ali bazalnimi prehranskimi potrebami. Za zagotovitev popolne parenteralne prehrane je treba zdravilo SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov glede na bolnikove potrebe dodati elemente v sledovih, elektrolite in vitamine.

Za navodila za pripravo tega zdravila pred uporabo glejte poglavje 6.6.

4.3 Kontraindikacije

- Preobčutljivost na ribje, jajčne, sojine beljakovine ali beljakovine arašidov, učinkovine ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.
- Huda hiperlipidemija.
- Huda insuficienca jeter.
- Hude motnje koagulacije krvi.
- Prirojene motnje presnove aminokislin.
- Huda insuficienca ledvic brez možnosti do hemofiltracije ali dialize.
- Akutni šok.
- Neobvladana hiperglikemija.
- Splošne kontraindikacije za zdravljenje z infuzijo: akutni pljučni edem, hiperhidracija in dekompenzirano srčno popuščanje.
- Hemofagocitotični sindrom.
- Nestabilna stanja (npr. huda postravmatska stanja, nekompenzirana sladkorna bolezen, akutni miokardni infarkt, možganska kap, embolija, metabolična acidoza, huda sepsa, hipotonična dehidracija in hiperosmolarna koma).
- Novorojenčki in dojenčki, mlajši od dveh let.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zmožnost izločanja lipidov se od posameznika do posameznika razlikuje in jo je zato treba kontrolirati v skladu z uveljavljeno klinično prakso. Ponavadi se to opravi z merjenjem ravni trigliceridov. Koncentracija trigliceridov v serumu med infundiranjem ne sme preseči 4 mmol/l. Preveliko odmerjanje lahko povzroči sindrom preobremenitve z maščobami, glejte poglavje 4.8.

Zdravilo SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov je treba dajati previdno v primeru okvarjene presnove lipidov, ki se lahko pojavi pri bolnikih z odpovedjo ledvic, sladkorno boleznijo, pankreatitisom, okvarjenim delovanjem jeter, hipotiroidizmom ali sepsom.

To zdravilo vsebuje sojino olje, ribje olje in jajčne fosfolipide, ki lahko v redkih primerih povzročijo alergijske reakcije. Opažali so navzkrižno alergijsko reakcijo med sojo in arašidi.

Za preprečitev tveganja, ki ga prinaša prehitro infundiranje, je priporočljivo uporabiti stalno, dobro kontrolirano infuzijo, po možnosti z volumetrično črpalko.

Med uporabo centralnih ven obstaja večja nevarnost okužbe. Za preprečitev kontaminacije med vstavitvijo katetra in ravnanjem z njim je zato treba upoštevati stroge varnostne ukrepe asepse.

Kontrolirati je treba glukozo in elektrolite v serumu, osmolarnost seruma ter ravnovesje tekočin, kislinsko-bazično ravnovesje in teste delovanja jeter.

Med dolgotrajnejšo uporabo lipidov je treba kontrolirati krvno sliko in koagulacijo.

Zdravilo SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov je pripravljeno skoraj brez elektrolitov za bolnike s posebnimi in/ali majhnimi potrebami po elektrolitih. Dodati je treba natrij, kalij, kalcij, magnezij in dodatne količine fosfata glede na bolnikovo klinično stanje in pogosto kontrolirati njihovo raven v serumu.

Pri bolnikih z insuficienco ledvic je treba natančno kontrolirati vnos fosfata in kalija, za preprečitev hiperfosfatemije in hiperkaliemije.

Glede količine posameznih dodanih elektrolitov je treba upoštevati bolnikovo klinično stanje in pogosto kontrolirati njihovo raven v serumu.

Parenteralno prehrano je treba previdno uporabljati pri laktacidozi, nezadostni celični oskrbi s kisikom in povečani osmolarnosti seruma.

Ob kakršnem koli znaku ali simptomu anafilaktične reakcije (npr. povišani telesni temperaturi, drgetanju, izpuščaju ali dispneji) je treba infundiranje takoj prekiniti.

Vsebnost lipidov v zdravilu SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov lahko vpliva na določene laboratorijske meritve (npr. vrednosti bilirubina, vrednosti laktat-dehidrogenaze, saturacije s kisikom, vrednosti hemoglobina), če je vzorec krvi vzet, preden se lipidi ustrezno očistijo iz krvi. Pri večini bolnikov se lipidi iz krvi očistijo po 5- do 6-urnem obdobju brez lipidov.

Intravensko infundiranje aminokislin spremlja večje izločanje elementov v sledovih, zlasti bakra in cinka, v urinu. To je treba upoštevati pri odmerjanju elementov v sledovih, zlasti med dolgotrajno intravensko prehrano.

Pri podhranjenih bolnikih lahko začetek parenteralne prehrane povzroči premike tekočin s posledičnim pljučnim edemom ali kongestivnim srčnim popuščanjem, pa tudi zmanjšanje koncentracije kalija, fosforja, magnezija in vodotopnih vitaminov v serumu. Te spremembe se lahko pojavijo v 24 do 48 urah. Zato je parenteralno hranjenje v tej skupini bolnikov priporočljivo začeti previdno in počasi, ob hkratni natančni kontroli in ustreznih prilagoditvah tekočine, elektrolitov, mineralov in vitaminov.

Zaradi možnosti psevdoaglutinacije se zdravila SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov ne sme uporabljati v istem infuzijskem kompletu s krvjo.

Pri bolnikih s hiperglikemijo utegne biti potrebna uporaba eksogenega insulina.

Zdravilo SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov je pripravek s kompleksno sestavo, zato se močno odsvetuje dodajanje drugih raztopin, če združljivost ni dokazana (glejte poglavje 6.2).

Pediatrična populacija

Zaradi sestave raztopine aminokislin zdravilo SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov ni primerno za uporabo pri novorojenčkih ali dojenčkih, mlajših od 2 let. Z uporabo zdravila SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov pri otrocih in mladostnikih (starih od 2 let do 16/18 let) ni kliničnih izkušenj.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Nekatera zdravila, npr. insulin, lahko ovirajo telesni lipazni sistem, vendar je ta interakcija klinično verjetno malo pomembna.

V kliničnih odmerkih uporabljeni heparin povzroči prehodno sproščanje lipoproteinske lipaze v obtok. To lahko uvodoma poveča plazemsko lipolizo, ki ji sledi prehodno zmanjšanje očistka trigliceridov.

Sojino olje naravno vsebuje vitamin K₁, vendar je njegova koncentracija v zdravilu SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov tako majhna, da ni pričakovati pomembnega vpliva na koagulacijo pri bolnikih, zdravljenih z derivati kumarina.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Podatkov o izpostavljenosti nosečnic ali doječih žensk zdravilu SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov ni. Študij o vplivih na sposobnost razmnoževanja pri živalih ni. Parenteralna prehrana lahko postane potrebna med nosečnostjo in dojenjem. Pri nosečnicah in doječih ženskah smete zdravilo SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov uporabiti le po natančnem premisleku.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Podatek ni potreben.

4.8 Neželeni učinki

	<i>Pogosti</i> ≥ 1/100 do < 1/10	<i>Občasni</i> ≥ 1/1.000 do < 1/100	<i>Redki</i> ≥ 1/10.000 do < 1/1.000
<i>Srčne bolezni</i>			tahikardija
<i>Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora</i>			dispneja
<i>Bolezni prebavil</i>		pomanjkanje apetita, navzea, bruhanje	
<i>Presnovne in prehranske motnje</i>		zvišana raven jetrnih encimov v plazmi	
<i>Žilne bolezni</i>			hipotenzija, hipertenzija
<i>Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije</i>	rahlo povišanje telesne temperature	mrzlica, omotica, glavobol	preobčutljivostne reakcije (npr. anafilaktične ali anafilaktoidne reakcije, izpuščaj na koži, urtikarija, zardevanje, glavobol), občutek vročine ali mraza, bledica, cianoza, bolečine v vratu, hrbtu, kosteh, prsih in ledvenem predelu

Če se pojavijo ti neželeni učinki, je treba infuzijo zdravila SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov ustaviti ali jo, če je treba, nadaljevati z manjšim odmerkom.

Sindrom preobremenitve z maščobami

Prizadeta zmožnost izločanja trigliceridov lahko privede do "sindroma preobremenitve z maščobami", ki ga lahko povzroči preveliko odmerjanje. Bolnike je treba opazovati glede možnih znakov presnovne preobremenitve. Vzrok je lahko genetski (individualno različna presnova) ali prizadetost presnove lipidov zaradi trenutnih ali prejšnjih bolezni. Sindrom se lahko pojavi tudi med hudo hipertrigliceridemijo, celo ob priporočeni hitrosti infundiranja, ali če se bolnikovo klinično stanje nenadoma spremeni, npr. pri okvari delovanja ledvic ali okužbi. Za sindrom preobremenitve z maščobami so značilne hiperlipidemija, povišana telesna temperatura, lipidna infiltracija, hepatomegalija (z ikterusom ali brez njega), splenomegalija, anemija, levkopenija, trombocitopenija, koagulacijske motnje, hemoliza in retikulocitoza, nenormalni izvidi testov jetrne funkcije in koma. Simptomi so po prekinitvi infundiranja emulzije lipidov ponavadi reverzibilni.

Čezmerno infundiranje aminokislin

Tako kot velja za druge raztopine aminokislin, lahko vsebnost aminokislin v zdravilu SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov povzroči neželene učinke, če je presežena priporočena hitrost infundiranja. Ti učinki so navzea, bruhanje, drgetanje in znojenje. Infundiranje aminokislin lahko povzroči tudi povišanje telesne temperature. V primeru okvarjenega delovanja ledvic se lahko zviša raven dušikovih metabolitov (npr. kreatinina, sečnine).

Čezmerno infundiranje glukoze

Če je presežena bolnikova zmožnost očistka glukoze, se razvije hiperglikemija.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si.

4.9 Preveliko odmerjanje

Glejte poglavje 4.8 "Sindrom preobremenitve z maščobami", "Čezmerno infundiranje aminokislin" in "Čezmerno infundiranje glukoze".

Če se pojavijo simptomi prevelikega odmerjanja lipidov ali aminokislin, morate infundacijo upočasniti ali prekiniti. Za preveliko odmerjanje ni specifičnega antidota. Nujni postopki naj obsegajo splošne podpirne ukrepe; posebno pozornost morate nameniti dihalom ter srcu in ožilju. Nujen je natančen biokemični nadzor; specifične nenormalnosti morate ustrezno zdraviti.

Če se pojavi hiperglikemija, jo morate zdraviti glede na klinično stanje, bodisi z ustrezno uporabo insulina bodisi s prilagoditvijo hitrosti infundiranja ali z obojim.

Poleg tega lahko preveliko odmerjanje povzroči preobremenitev s tekočino, elektrolitsko neravnovesje in hiperosmolalnost.

V nekaterih redkih hudih primerih lahko pride v poštev hemodializa, hemofiltracija ali hemodiafiltracija.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: raztopine za parenteralno prehrano
Oznaka ATC: B05BA10

Emulzija lipidov

Zdravilo Smoflipid sestavlja emulzijo lipidov v zdravilu SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov. Po velikosti delcev in bioloških lastnostih je podobna endogenim hilomikronom. Sestavine zdravila Smoflipid – sojino olje, nasičeni srednjeveržni trigliceridi, olivno olje in ribje olje – imajo z izjemo energijske vsebnosti svoje lastne farmakodinamične lastnosti.

Sojino olje vsebuje veliko esencialnih maščobnih kislin. Največ (približno 55-60 %) je linolne kisline, omega-6 maščobne kisline. Alfa-linolenska kislina, omega-3 maščobna kislina, predstavlja okrog 8 %. Ta komponenta zdravila SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov zagotavlja potrebno količino esencialnih maščobnih kislin.

Srednjeveržne maščobne kisline se hitro oksidirajo in dajejo telesu takoj razpoložljivo energijo.

Olivno olje zagotavlja energijo predvsem z mononenasičenimi maščobnimi kislinami, ki so mnogo manj nagnjene k peroksidaciji kot ustrezna količina polinenasičenih maščobnih kislin.

Za ribje olje je značilna velika vsebnost eikozapentaenojske (EPA) in dokozaheksaenojske (DHA) kisline. DHA je pomembna strukturna sestavina celičnih membran, EPA pa je predhodnica eikozanoidov, kakršni so prostaglandini, tromboksani in levkotrieni.

Opravljeni sta bili dve študiji parenteralnega prehranjevanja v domačem okolju pri bolnikih, ki so potrebovali dolgotrajno prehransko podporo. Primarni cilj obeh študij je bil dokazati varnost. V eni od študij, ki so jo izvedli pri pediatričnih bolnikih, je bil sekundarni cilj učinkovitost. Ta študija je bila stratificirana po starostnih skupinah (od 1 meseca do < 2 let ter od 2 let do 11 let). Obe študiji sta pokazali, da so varnostne značilnosti zdravila Smoflipid enake kot varnostne značilnosti primerjalnega zdravila (Intralipid 200 mg/ml emulzija za infundiranje). Učinkovitost v pediatrični študiji so merili s povečanjem telesne mase, telesno višino, indeksom telesne mase in profili prealbumina, retinol-vežočega proteina in maščobnih kislin. Po 4 tednih zdravljenja se skupini nista razlikovali po nobenem parametru razen po profilu maščobnih kislin. Pri bolnikih, ki so prejeli zdravilo Smoflipid, je profil maščobnih kislin pokazal porast omega-3 maščobnih kislin v plazemskih lipoproteinih in eritrocitnih fosfolipidih ter torej odraža sestavo infundirane emulzije lipidov.

Aminokisline

Aminokisline so sestavine beljakovin v običajni prehrani. Izrabljajo se za sintezo tkivnih beljakovin, presežek pa se usmeri v številne presnovne poti. Študije so pokazale, da infundiranje aminokislin učinkuje termogeno.

Glukoza

Glukoza ne bi smela imeti farmakodinamičnih učinkov, razen da pripomore k ohranjanju ali obnovitvi normalnega prehranskega stanja.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Emulzija lipidov

Očistek posameznih trigliceridov v zdravilu Smoflipid je različno hiter, toda zdravilo Smoflipid kot mešanica se odstrani hitreje kot dolgoveržni trigliceridi. Olivno olje ima najpočasnejši očistek od vseh sestavin (nekoliko počasnejšega od dolgoveržnih trigliceridov), srednjeveržni trigliceridi pa imajo najhitrejšega. Ribje olje ima v mešanici z dolgoveržnimi trigliceridi enak očistek kot ga imajo dolgoveržni trigliceridi sami.

Aminokisline

Glavne farmakokinetične lastnosti infundiranih aminokislin so v bistvu enake kot lastnosti aminokislin iz običajne prehrane. Vendar pa aminokisline iz zaužitih beljakovin najprej pridejo v portalno veno in šele nato v sistemski obtok, intravensko infundirane aminokisline pa pridejo neposredno v sistemski obtok.

Glukoza

Farmakokinetične lastnosti infundirane glukoze so v bistvu enake kot lastnosti glukoze iz običajne prehrane.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Predkliničnih študij varnosti z zdravilom SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov niso izvedli. Vendar predklinični podatki za zdravilo Smoflipid in tudi za raztopine aminokislin in glukoze različnih koncentracij na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih in genotoksičnosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Med uporabo raztopin aminokislin pri kuncih niso ugotovili teratogenih učinkov ali drugih embriotoksičnih okvar: prav tako niso pričakovane med uporabo emulzij lipidov, če so dane v priporočenih odmerkih kot nadomestno zdravljenje. Med uporabo prehranskih izdelkov (raztopin aminokislin in emulzij lipidov) pri nadomestnem zdravljenju v fizioloških količinah ni pričakovati embriotoksičnih in teratogenih učinkov, vplivov na sposobnost razmnoževanja ali na plodnost.

V testu na budrah (maksimizacijski test) so z emulzijo ribjega olja ugotovili zmerno dermalno senzibilizacijo. Sistemske test antigenosti ni pokazal, da bi imelo ribje olje anafilaktični potencial.

Niti intravenska infuzija zdravila SmofKabiven (načrtovana pot uporabe) niti intraarterijske, intramuskularne, paravenske in subkutane injekcije niso pokazale nobenih z aktivno učinkovino povezanih sprememb pri zajcih. Zdravilo SmofKabiven je zdravilo z enako kvalitativno sestavo kot zdravilo SmofKabiven ekstra nitrogen.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

glicerol
prečiščeni jajčni fosfolipidi
vseracemni- α -tokoferol
natrijev hidroksid (za uravnavanje pH)
natrijev oleat
koncentrirana očetna kislina (za uravnavanje pH)
klorovodikova kislina (za uravnavanje pH)
voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zdravilo SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov smete mešati le s prehranskimi izdelki, s katerimi je dokazano združljiv, glejte poglavje 6.6.

6.3 Rok uporabnosti

Rok uporabnosti zdravila, kot je pakirano za prodajo
2 leti

Rok uporabnosti po mešanju prekatov vreče

Kemična in fizikalna stabilnost med uporabo premešane triprekate vreče sta dokazani za 48 ur pri temperaturi 20-25 °C. Z mikrobiološkega stališča je treba zdravilo uporabiti takoj. Če ni uporabljeno takoj, sta čas shranjevanja med uporabo in pogoji pred uporabo odgovornost uporabnika; čas običajno ne sme presegati 24 ur pri temperaturi od 2 do 8 °C, razen če je mešanje potekalo v nadzorovanih in validiranih aseptičnih pogojih.

Rok uporabnosti po mešanju z dodatki

Fizikalno-kemična stabilnost med uporabo za triprekatno vrečo z dodatki po mešanju (glejte poglavje 6.6) je bila dokazana do 7 dni, to je, 6 dni pri temperaturi 2-8 °C, ki jim sledi 24 ur pri temperaturi 20-25 °C, vključno s trajanjem dajanja. Z mikrobiološkega stališča je treba zdravilo uporabiti takoj po primešanju dodatkov. Če ni uporabljeno takoj, sta čas shranjevanja med uporabo in pogoji pred uporabo odgovornost uporabnika; čas običajno ne sme presegati 24 ur pri temperaturi od 2 do 8 °C, razen če je dodajanje dodatkov potekalo v nadzorovanih in validiranih aseptičnih pogojih.

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne zamrzujte. Shranjujte v zunanjem ovoju.

Rok uporabnosti po mešanju prekatov vreče: glejte poglavje 6.3.

Rok uporabnosti po mešanju z dodatki: glejte poglavje 6.3.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Vsebnik je sestavljen iz večprekatne notranje vreče in zunanjega ovoja. Notranja vreča je razdeljena v tri prekate z odstranljivimi zaporami. Med notranjo vrečo in zunanjim ovojem je nameščen adsorbens kisika. Notranja vreča je izdelana iz večplastnega polimernega filma, Biofine.

Notranja vreča iz Biofine je sestavljena iz poli(propilen-ko-etilena), sintetične gume poli[stiren-blok-(butilen-ko-etilen)] (SEBS) in sintetične gume poli(stiren-blok-izopren) (SIS). Infuzijski nastavek in dodatni nastavek sta izdelana iz polipropilena in sintetične gume poli[stiren-blok-(butilen-ko-etilen)] (SEBS), opremljena s sintetičnimi zamaški iz poliizoprena (brez lateksa). Slepni nastavek, ki se uporablja le med izdelavo, je izdelan iz polipropilena in opremljen s sintetičnim zamaškom iz poliizoprena (brez lateksa).

Velikosti pakiranj:

1 x 506 ml, 6 x 506 ml

1 x 1012 ml, 4 x 1012 ml

1 x 1518 ml, 4 x 1518 ml

1 x 2025 ml, 4 x 2025 ml

1 x 2531 ml, 3 x 2531 ml

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Navodilo za uporabo

Ne uporabite, če je ovojna poškodovana. Uporabite le, če sta raztopini aminokislin in glukoze bistri in brezbarvni ali rahlo rumeni, emulzija lipidov pa bela in homogena. Vsebino treh ločenih prekatov morate pred uporabo premešati, in sicer pred morebitnim primešanjem dodatkov skozi nastavek za dodatke.

Po odstranitvi zapor morate vrečo večkrat obrniti, tako da nastane homogena mešanica, ki ne kaže nobenih znakov ločevanja faz.

Kompatibilnost

Na voljo so podatki o združljivosti z zdravili, poimenovanimi z lastniškimi imeni Dipeptiven, Addamel N / Addaven, Glycophos, Addiphos, Vitalipid N Adult / Infant in Soluvit N v določenih količinah in z generičnimi zdravili z elektroliti v določenih koncentracijah. Pri dodajanju elektrolitov je potrebno upoštevati količine elektrolitov, ki so že prisotne v vreči, da se zadovoljijo klinične potrebe bolnika. Pridobljeni podatki podpirajo dodatke aktivirani vreči skladno s pregledno tabelo spodaj:

Mešanice so stabilne 7 dni, to je, 6 dni shranjevanja pri temperaturi 2-8°C, ki jim sledi 24 ur pri temperaturi 20-25°C.

	Enota	Največja celotna vsebnost				
SmofKabiven ekstra nitrogen brez elektrolitov velikost vreče	ml	506	1012	1518	2025	2531
Dodatek		Volumen				
Dipeptiven	ml	0 - 150	0 - 300	0 - 300	0 - 300	0 - 300
Addaven/Addamel N	ml	0 - 10	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20
Soluvit N	Viala	0 - 1	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 2
Vitalipid N Adult/Infant	ml	0 - 10	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20
Meje elektrolitov¹		Koncentracija				
Natrij	mmol/l	≤ 150	≤ 150	≤ 150	≤ 150	≤ 150
Kalij	mmol/l	≤ 150	≤ 150	≤ 150	≤ 150	≤ 150
Kalcij	mmol/l	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Magnezij	mmol/l	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Fosfat anorganski (Addiphos)	mmol/l	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
ALI Fosfat organski (Glycophos)		≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Cink	mmol/l	≤ 0.2	≤ 0.2	≤ 0.2	≤ 0.2	≤ 0.2
Selen	μmol/l	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2

¹ vključuje količine iz vseh produktov

Opomba: Ta tabela je namenjena navajanju združljivosti in ni smernica za odmerjanje.

Pri zdravilih z lastniškimi imeni pred predpisovanjem preberite nacionalno odobrene informacije o predpisovanju.

Podatki o kompatibilnosti za dodatne dodatke in časih shranjevanja za različne mešanice so na voljo na zahtevo.

Dodatki morajo biti dodani aseptično.

Samo za enkratno uporabo. Morebitni preostanek mešanice po infundiranju morate zavreči.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Fresenius Kabi AB
SE-751 74 Uppsala
Švedska

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H/09/01432/047-056

**9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z
ZDRAVILOM**

Datum prve odobritve: 10. 6. 2009

Datum zadnjega podaljšanja: 16. 5. 2022

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

9. 6. 2023