

Navodilo za uporabo

Losartan TEVA 50 mg in 100 mg filmsko obložene tablete kalijev losartanat

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Losartan TEVA in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Losartan TEVA
3. Kako jemati zdravilo Losartan TEVA
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Losartan TEVA
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Losartan TEVA in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Losartan TEVA sodi v skupino zdravil, ki jih imenujemo antagonisti receptorjev za angiotenzin II. Angiotenzin II je snov, ki nastaja v telesu in se veže na receptorje v krvnih žilah ter povzroči njihovo skrčenje. To pa povzroči zvišanje krvnega tlaka. Losartan preprečuje vezavo angiotenzina II na te receptorje, zaradi česar se krvne žile razširijo in pride do znižanja krvnega tlaka. Losartan torej upočasni napredovanje ledvične okvare pri bolnikih z visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo tipa 2.

Zdravilo Losartan TEVA se uporablja za:

- zdravljenje bolnikov z visokim krvnim tlakom (hipertenzijo),
- za zaščito ledvic pri bolnikih s hipertenzijo in s sladkorno boleznijo tipa 2 pri katerih so laboratorijski izvidi pokazali okvaro ledvic in proteinurijo $\geq 0,5$ g na dan (stanje s preveliko količino beljakovin v urinu),
- pri bolnikih z visokim krvnim tlakom in zadebeljenim levim prekatom; izkazalo se je, da zdravilo Losartan TEVA zmanjša tveganje za možgansko kap ("indikacija iz študije LIFE").

2. Kaj morate vedeti preden boste vzeli zdravilo Losartan TEVA

Ne jemljite zdravila Losartan TEVA

- če ste alergični na losartan ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če imate hudo obolenje jeter,
- če ste noseči že več kot tri mesece (priporočamo tudi, da se izogibate uporabi zdravila Losartan TEVA v zgodnji nosečnosti – glejte poglavje 2 »Nosečnost in dojenje«),
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za znižanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Losartan TEVA se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če bi lahko zanosili). V zgodnjem obdobju nosečnosti uporaba zdravila Losartan TEVA ni priporočljiva. Zdravila Losartan TEVA ne smete jemati, če ste noseči več kot tri mesece, saj lahko uporaba zdravila v tem obdobju resno škoduje vašemu otroku (glejte poglavje 2 »Nosečnost in dojenje«).

Pomembno je, da pred uporabo zdravila Losartan TEVA filmsko obložene tablete obvestite svojega zdravnika:

- če ste imeli kdaj v preteklosti angioedem (otekanje obraza, ustnic, žrela in/ali jezika) (glejte tudi poglavje 4 »Možni neželeni učinki«),
- če močno bruha ali imate drisko in zato izgublja veliko tekočine in/ali soli,
- če prejimate diuretike (zdravila, ki povečujejo količino vode, ki jo odvajate skozi ledvice) ali če ste na dieti z omejitvijo soli v prehrani, zaradi česar iz telesa izgublja večje količine tekočine in soli (glejte poglavje 3 »Odmerjanje zdravila pri posebnih skupinah bolnikov«),
- če veste, da imate zoženo ali zamašeno žilje, ki vodi do ledvic ali če so vam pred kratkim presadili ledvico,
- če imate oslajeno delovanje jeter (glejte poglavje 2 »Ne jemljite zdravila Losartan TEVA in poglavje 3 »Odmerjanje zdravila pri posebnih skupinah bolnikov«),
- če imate srčno popuščanje z okvaro ledvic ali brez ali sočasne hude življenjsko nevarne srčne aritmije. Posebna previdnost je potrebna, če sočasno jemljete beta zaviralec.
- če imate težave s srčnimi zaklopkami ali srčno mišico,
- če imate srčno bolezen ali ste doživeli možgansko kap (povzročeno z zmanjšanim dotokom krvi v krvne žile v srcu) ali možganskožilno bolezen (povzročeno z zmanjšanim krvnim obtokom v možganih),
- če imate primarni hiperaldosteroidizem (sindrom, ki je povezan s povečanim izločanjem hormona aldosterona iz nadledvične žleze zaradi okvare znotraj žleze),
- če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
 - zaviralec ACE (na primer enalapril, lizinopril ali ramipril), zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo,
 - aliskiren.

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija) v krvi.

Glejte tudi informacije pod naslovom "Ne jemljite zdravila Losartan TEVA".

Otroci in mladostniki

Kalijev losartanat so preučevali pri otrocih. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Losartan TEVA

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Še posebej bodite previdni, če jemljete naslednja zdravila med zdravljenjem z zdravilom Losartan TEVA:

- druga zdravila za zniževanje krvnega tlaka, ki bi lahko še dodatno znižala vaš krvni tlak; Krvni tlak lahko znižajo tudi naslednje skupine zdravil: triciklični antidepresivi, antipsihotiki, baklofen, amifostin;
- Zdravnik vam bo morda moral spremeniti odmerek in/ali upoštevati druge previdnostne ukrepe: Če jemljete zaviralec ACE ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovoma "Ne jemljite zdravila Losartan TEVA" in "Opozorila in previdnostni ukrepi");
- zdravila, ki povzročajo zadrževanje kalija v telesu ali ki lahko povečajo koncentracijo kalija (npr. dodatke kalija, nadomestke soli, ki vsebujejo kalij ali zdravila, ki varčujejo s kalijem, na primer nekatere diuretike [amilorid, triamteren, spironolakton] ali heparin);
- nesteroidne antirevmatike, kot na primer indometacin, vključno z zaviralci ciklooksigenaze-2 (zdravila, ki zmanjšujejo vnetje in jih lahko uporabljamo za lajšanje bolečin), ker bi lahko oslabil učinek losartana na zniževanje krvnega tlaka; če imate ledvično okvaro, lahko sočasna uporaba teh zdravil vodi do poslabšanja ledvične funkcije.

- Zdravil z litijem brez skrbnega zdravniškega nadzora ne smete jemati skupaj z losartanom; lahko pa bodo potrebni tudi posebni previdnostni ukrepi (npr. dodatne krvne preiskave).

Zdravilo Losartan TEVA skupaj s hrano in pijačo

Tablete lahko jemljete z ali brez hrane.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če bi lahko zanosili). Običajno vam bo zdravnik svetoval, da prekinete z jemanjem zdravila Losartan TEVA, še preden zanosite ali takoj, ko ugotovite, da ste noseči. Namesto zdravila Losartan TEVA vam bo svetoval drugo zdravilo. V zgodnjem obdobju nosečnosti uporaba zdravila Losartan TEVA ni priporočljiva. Zdravila Losartan TEVA ne smete jemati, če ste noseči več kot tri mesece, saj lahko uporaba zdravila od tretjega meseca nosečnosti dalje resno škoduje vašemu otroku.

Dojenje

Obvestite svojega zdravnika, če dojite ali nameravate začeti dojit. Zdravilo Losartan TEVA se doječim materam ne priporoča, zato vam bo zdravnik morda predpisal drugačno zdravljenje, še zlasti če želite dojit novorojenčka ali nedonošenčka.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Študije vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev niso bile izvedene.

Malo je verjetno, da bi losartan vplival na vašo sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Vendar lahko, kot mnoga druga zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka, tudi losartan pri nekaterih ljudeh povzroči omotico ali zaspanost. Če se pri vas pojavita omotica ali zaspanost, se posvetujte s svojim zdravnikom, preden začnete opravljati tovrstne dejavnosti.

Zdravilo Losartan TEVA vsebuje laktozo

To zdravilo vsebuje laktozo monohidrat. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Losartan TEVA

Zdravnik vam bo predpisal ustrezen odmerek zdravila Losartan TEVA glede na vaše stanje in glede na to, ali jemljete še katera druga zdravila. Pomembno je, da zdravilo Losartan TEVA jemljete tako dolgo, kot vam je predpisal zdravnik. Tako vzdržujete enakomeren nadzor krvnega tlaka. Pri jemanju zdravila Losartan TEVA filmsko obložene tablete natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Bolniki z visokim krvnim tlakom

Zdravljenje se običajno začne s 50 mg losartana (ena 50 mg tableta) enkrat na dan. Največji učinek na zniževanje krvnega tlaka naj bi bil dosežen v 3 do 6 tednih po začetku zdravljenja. Pri nekaterih bolnikih se lahko odmerek kasneje poveča na 100 mg losartana (dve 50 mg tableti ali ena 100 mg tableta) enkrat na dan (zjutraj).

Če imate občutek, da je učinek losartana premočan ali prešibek, se o tem posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Bolniki z visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo tipa 2

Običajni začetni odmerek je 50 mg losartana (ena 50 mg tableta) enkrat na dan. Odmerek je kasneje lahko povečan na 100 mg losartana (dve 50 mg tableti ali ena 100 mg tableta) enkrat na dan, odvisno od odziva vašega krvnega tlaka.

Losartan se lahko jemlje skupaj z drugimi zdravili za zniževanje krvnega tlaka (npr. diuretiki, zaviralci kalcijevih kanalčkov, alfa ali beta zaviralci in zdravili, ki delujejo na centralno živčevje), kot tudi z insulinom in drugimi običajno uporabljenimi zdravili za zmanjševanje količine glukoze v krvi (npr. sulfonilsečnine, glitazoni, zaviralci glukozidaze).

Odmerjanje zdravila pri posebnih skupinah bolnikov

Zdravnik lahko svetuje uporabo manjšega odmerka zdravila, še posebej na začetku zdravljenja pri bolnikih, ki se zdravijo z velikimi odmerki diuretikov, z jetrno okvaro ali bolnikih, ki so starejši od 75 let. Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro pa uporaba losartana ni priporočljiva (glejte poglavje »Ne jemljite zdravila Losartan TEVA«).

Uporaba pri otrocih in mladostnikih (starih od 6 do 18 let)

Priporočeni začetni odmerek pri bolnikih s telesno maso od 20 do 50 kg je 25 mg zdravila Losartan TEVA enkrat dnevno. Pri bolnikih, ki tehtajo več kot 50 kg, je običajni odmerek 50 mg zdravila Losartan TEVA enkrat dnevno. Zdravnik lahko poveča odmerek, če krvni tlak ni ustrezno nadzorovan. Uporaba zdravila Losartan TEVA se ne priporoča pri otrocih, mlajših od 6 let.

Uporaba zdravila Losartan TEVA se odsvetuje tudi pri otrocih s hudo okvaro ledvic ali jeter.

Način uporabe

Tablete je potrebno popiti s kozarcem vode. Svoj dnevni odmerek poskušajte jemati vsak dan ob približno istem času. Pomembno je, da losartan jemljete tako dolgo, dokler vam zdravnik ne svetuje drugače.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Losartan TEVA, kot bi smeli

Če ste po nesreči zaužili preveč tablet ali če je otrok pogoltnil nekaj tablet, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Simptomi prevelikega odmerjanja so nizek krvni tlak in pospešen srčni utrip, lahko pa tudi upočasnen srčni utrip.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Losartan TEVA

Če ste pomotoma izpustili en dnevni odmerek zdravila, preprosto vzemite naslednji odmerek kot običajno. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo Losartan TEVA neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če se pri vas pojavi sledeči neželeni učinek, prenehajte jemati zdravilo Losartan TEVA in **nemudoma pokličite svojega zdravnika ali obiščite najbližjo bolnišnico:**

- huda alegična reakcija (izpuščaj, srbečica, oteklina obraza, ustnic, ust ali grla, ki lahko povzroči težave pri dihanju in požiranju).

To je hud, a redek neželeni učinek, ki se pojavi pri več kot enem od 10.000 bolnikov, a manj kot pri enem od 1.000 bolnikov. **Morda boste potrebovali nujno medicinsko pomoč ali sprejem v bolnišnico.**

Neželeni učinki zdravil so razvrščeni po pogostosti po naslednjem dogovoru:

Zelo pogosti:	pojavi se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov
Pogosti:	pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov
Občasni:	pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov
Redki:	pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov
Zelo redki:	pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov
Neznana pogostost:	pogostosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Pri uporabi zdravila Losartan TEVA 25, 50 in 100 mg filmsko obložene tablete so poročali o naslednjih neželenih učinkih:

Pogosti:

- omotica
- vrtoglavica
- nizek krvni tlak
- šibkost
- utrujenost
- premalo sladkorja v krvi (hipoglikemija)
- preveč kalija v krvi (hiperkaliemija)
- spremembe v delovanju ledvic, vključno z odpovedjo ledvic
- zmanjšano število rdečih krvnih celic (anemija)
- povišanje ravni sečnine v krvi ter kreatinina in kalija v serumu pri bolnikih s popuščanjem srca

Občasni:

- bolezenska zaspanost
- glavobol
- motnje spanja
- občutek povečanega srčnega utripa (palpitacije)
- hude bolečine v prsih (angina pectoris)
- nizek krvni tlak (še posebej po prekomerni izgubi vode iz telesa, npr. pri bolnikih, ki se zdravijo z velikimi odmerki diuretikov)
- od odmerka odvisen ortostatski učinek, kot na primer znižanje krvnega tlaka pri vstajanju iz ležečega ali sedečega položaja
- zasoplost
- kašelj
- trebušne bolečine
- zapeka
- driska
- slabost
- bruhanje, motnje okušanja
- koprivnica (urtikarija)
- srbenje (pruritus)
- izpuščaj, luščenje kože
- lokalno otekanje (edem)

Redki:

- vnetje krvnih žil (vaskulitis, vključno z Henoch-Schonleinovo purpuro)
- odrevenelost in občutek mravljinčenja (parestezija)
- omedlevica
- zelo hiter in neenakomeren srčni utrip, možganska kap
- vnetje jeter (hepatitis)
- zvišana vrednost encimov v krvi, ki običajno mine po prekinitvi zdravljenja

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- zmanjšano število rdečih krvničk (anemija)
- zmanjšano število trombocitov
- migrena
- težave pri okušanju
- zvonjenje, brnenje, bobnenje ali pokanje v ušesih (tinitus)
- depresija
- splošno slabo počutje

- motnje delovanja jeter
- bolečine v mišicah in sklepkih
- nepojasnjene bolečine v mišicah s temno obarvanim (barva pravega čaja) urinom (rabdomioliza)
- povečana občutljivost za sončno svetlobo (fotosenzitivnost)
- impotenca
- vnetje trebušne slinavke (pankreatitis)
- nizke ravni natrija v krvi (hiponatriemija)
- gripi podobni simptomi
- bolečine v hrbtu
- okužba sečil

Neželeni učinki, ki se pojavijo pri otrocih, so podobni tistim pri odraslih.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastrupitve, Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, faks: + 386 (0)1 434 76 46, e-pošta:

farmakovigilanca@kclj.si.

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Losartan TEVA filmsko obložene tablete

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Losartan TEVA

- Ena filmsko obložena tableta vsebuje 50 ali 100 mg zdravilne učinkovine, kalijevega losartanata.
- Ostale sestavine zdravila so:
Jadro tablete: laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza (E 460a), predgeliran škrob, magnezijev stearat (E 572).
Filmska obloga: polivinilalkohol (delno hidroliziran), titanov dioksid (E 171), makrogol, smukec.

Izgled zdravila Losartan TEVA in vsebina pakiranja

Losartan TEVA 50 mg filmsko obložene tablete so bele, ovalne, blago izbočene filmsko obložene tablete, z vtisnjeno »50« na eni strani ter razpolovno črto na drugi strani.

Losartan TEVA 100 mg filmsko obložene tablete so bele, ovalne, blago izbočene filmsko obložene tablete, z vtisnjeno »100« na eni strani ter razpolovno črto na drugi strani.

Tablete so pakirane v bele neprosojne pretisne omote iz PVC/PVdC/Al ali v bele neprosojne pretisne omote iz PVC/PE/PVdC/Al ali v neprosojne omote iz OPA/Alu/PVC/Al ali

v HDPE plastenke s polipropilenskim pokrovčkom z navojem, na katerem je vidno odpiranje, s priloženim sušilnim sredstvom.

- Velikosti pakiranj:

Losartan TEVA 50 mg filmsko obložene tablete: 1, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 105 in 120 filmsko obloženih tablet. Bolnišnično pakiranje po 50 (50 x 1) in 280 (10 x 28 tablet) filmsko obloženih tablet.

HDPE plastenke s polipropilenskim pokrovčkom z navojem, na katerem je vidno odpiranje, s priloženim sušilnim sredstvom: 30, 100 in 250 filmsko obloženih tablet.

Losartan TEVA 100 mg filmsko obložene tablete: 1, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 105 in 120 filmsko obloženih tablet. Bolnišnično pakiranje po 50 (50 x 1) in 280 (10 x 28 tablet) filmsko obloženih tablet.

HDPE plastenke s polipropilenskim pokrovčkom z navojem, na katerem je vidno odpiranje, s priloženim sušilnim sredstvom: 30, 100 in 250 filmsko obloženih tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nizozemska

Izdelovalci

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velika Britanija
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nizozemska
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Madžarska
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100, Gödöllo, Madžarska
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, c.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Češka

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni

Avstrija	Losartan ratiopharm 25 mg Filmdabletten Losartan ratiopharm 50 mg Filmdabletten Losartan ratiopharm 100 mg Filmdabletten
Danska	Losartankalium Teva 50 mg Filmovertrukne tabletter Losartankalium Teva 100 mg Filmovertrukne tabletter Losartan TEVA 100 mg Filmovertrukne tabletter
Finska	Losatrix 25 mg kalvopäällysteiset tabletit Losatrix 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losatrix 100 mg kalvopäällysteiset tabletit
Francija	LOSARTAN TEVA 50 mg, comprimé pelliculé LOSARTAN TEVA 100 mg, comprimé pelliculé
Madžarska	Arbatan 25 mg filmdabletta Arbatan 50 mg filmdabletta Arbatan 100 mg filmdabletta
Italija	Losartan TEVA 25 mg compresse rivestite con film Losartan TEVA 50 mg compresse rivestite con film Losartan TEVA 100 mg compresse rivestite con film

Islandija	Losatrix 25 mg filmuhúðaðar töflur
	Losatrix 50 mg filmuhúðaðar töflur
	Losatrix 100 mg filmuhúðaðar töflur
Nizozemska	Losartankalium 25 mg PCH, filmomhulde tabletten
	Losartankalium 50 mg PCH, filmomhulde tabletten
	Losartankalium 100 mg PCH, filmomhulde tabletten
Norveška	Losartan TEVA 25 mg tabletter, filmdrasjerte
	Losartan TEVA 50 mg tabletter, filmdrasjerte
	Losartan TEVA 100 mg tabletter, filmdrasjerte
Portugalska	Losartan ratiopharm 50 mg comprimidos
	Losartan ratiopharm 100 mg comprimidos
Švedska	Losartan TEVA 50 mg filmdragerade tabletter
	Losartan TEVA 100 mg filmdragerade tabletter
Slovenija	Losartan TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
	Losartan TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
Velika Britanija	Losartan Potassium 25 mg Film-coated Tablets
	Losartan Potassium 50 mg Film-coated Tablets
	Losartan Potassium 100 mg Film-coated Tablets

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 17.03.2016.