

Navodilo za uporabo

Veralgin oralno pršilo, raztopina

dekspantenol/suhi ekstrakt lista žajblja

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila svojega zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Veralgin in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Veralgin
3. Kako uporabljati zdravilo Veralgin
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Veralgin
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO VERALGIN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Ekstrakt žajblja ima dezinfekcijski učinek, zmanjšuje draženje, deluje lokalno protivnetno in lokalno zmanjšuje občutenje bolečine. Dekspantenol spodbuja celjenje ran in tako podpira učinek ekstrakta žajblja.

Zdravilo Veralgin je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za uporabo v ustni votlini na lokaliziranih razdraženih mestih sluznice, pri poškodbah ustne sluznice zaradi pritiska zobne proteze in pri manjših vnetjih dlesni.

Zdravilo Veralgin je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO VERALGIN

Ne uporabljajte zdravila Veralgin

- če ste alergični na ekstrakt žajblja, druge rastline iz družine *Lamiaceae* (ustnatice), dekspantenol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Ne razpršujte zdravila v oči ali nos.

Otroci

Zaradi pomanjkanja podatkov, uporaba pri otrocih, mlajših od 12 let, ni priporočljiva.

Druga zdravila in zdravilo Veralgin

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Jemanje pripravkov iz listov žajblja lahko vpliva na učinek drugih zdravil, ki delujejo preko receptorjev GABA (npr. barbiturati, benzodiazepini), četudi vpliv ni klinično opazen. Zato se sočasna uporaba zdravila Veralgin s tovrstnimi zdravili ne priporoča.

Ni znanih medsebojnih delovanj z drugimi zdravili.

Zdravilo Veralgin skupaj s hrano in pijačo

Na voljo ni nobenih podatkov o preiskovanju vpliva hrane in pijače na delovanje zdravila.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Zaradi omejenih podatkov se uporaba med nosečnostjo in dojenjem ne priporoča.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Veralgin nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Veralgin vsebuje propilenglikol

Zdravilo Veralgin vsebuje propilenglikol, ki lahko povzroči draženje kože.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO VERALGIN

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Priporočeni odmerki

Odrasli in mladostniki, starejši od 12 let:

Nanesite 1 do 2 razprška neposredno na boleče mesto 3- do 5-krat na dan.


Otroci, mlajši od 12 let:

Zaradi pomanjkanja podatkov, uporaba pri otrocih, mlajših od 12 let, ni priporočljiva.

Način uporabe

Zdravilo je namenjeno za uporabo v ustni votlini.

- Dvignite vrtljivo šobo na zaporki z mehanskim pršilnikom, tako da bo pod pravim kotom glede na steklenico (glejte sliko).
- Usmerite pršilno glavo proti zelenemu mestu uporabe v ustih. Z vrtljivo šobo na zaporki z mehanskim pršilnikom lahko zlahka dosežete tudi težko dostopna mesta (npr. obzobne žepke).
- Razpršite raztopino zdravila Veralgin na boleča mesta s ponavljajočim pritiskanjem.
- Po vsaki uporabi zaprite zaporko z mehanskim pršilnikom tako, da potisnete šobo navzdol (glejte sliko).



Če ste uporabili večji odmerek zdravila Veralgin, kot bi smeli

Nemudoma se posvetujte z zdravnikom ali pojdite na urgentni oddelek najbližje bolnišnice. S seboj vzemite škatlo in to navodilo za uporabo.

Če ste pozabili vzeti odmerek zdravila Veralgin

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Ni znanih neželenih učinkov zdravila Veralgin.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika
Center za zastrupitve
Zaloška cesta 2
SI-1000 Ljubljana
Faks: + 386 (0)1 434 76 46
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA VERALGIN

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Po odprtju steklenice je treba njeno vsebino porabiti v 4 tednih.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatli poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE**Kaj vsebuje zdravilo Veralgin**

1 g (1,05 ml) raztopine vsebuje:

- 10 mg suhega ekstrakta lista žajblja (*Salvia officinalis* L.) (5,5 - 6,7 : 1). Ekstrakcijsko topilo: voda.
- 50 mg dekspantenola.

1 razpršek (0,14 ml) vsebuje:

- 1,45 mg suhega ekstrakta lista žajblja (*Salvia officinalis* L.) (5,5 – 6,7 : 1). Ekstrakcijsko topilo: voda.
- 7,25 mg dekspantenola.

1 razpršek = 1,45 mg = 0,141 ml

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so: natrijev saharinat (E954), eterično olje poprove mete, hidroksipropilceluloza, propilenglikol in prečiščena voda.

Izgled zdravila Veralgin in vsebina pakiranja

Zdravilo Veralgin je rjava raztopina, na voljo v škatli z rjavo steklenico, ki vsebuje 15 ml (kar zadostuje za vsaj 100 razprškov), opremljeni z zaporko z mehanskim pršilnikom in šobo za razprševanje.

Način in režim izdaje zdravila Veralgin

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Dunaj
Avstrija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 18.5.2015.