

Paracetamol svečke 500 mg

svečke
paracetamol

3953

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh (pri zvišani telesni temperaturi) oziroma 5 dneh (ob bolečinah pri otrocih) ali 7 dneh (ob bolečinah pri odraslih), se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Paracetamol svečke 500 mg in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Paracetamol svečke 500 mg
3. Kako uporabljati zdravilo Paracetamol svečke 500 mg
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Paracetamol svečke 500 mg
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO PARACETAMOL SVEČKE 500 mg IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Paracetamol svečke 500 mg uporabljajte za zniževanje zvišane telesne temperature pri vročinskih stanjih in za lajšanje blagih do zmernih bolečin, kot so bolečine pri gripi in prehladnih obolenjih, glavobol, zobobol ter bolečine pri reakciji na cepljenje. Svečke so namenjene za uporabo pri otrocih, ki so starejši od 6 let (težji od 22 kg), in odraslih. Svečke vsebujejo paracetamol, ki znižuje zvišano telesno temperaturo in lajša blage do zmerne bolečine.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO PARACETAMOL SVEČKE 500 mg

Ne uporabljajte zdravila Paracetamol svečke 500 mg

- če ste alergični na paracetamol ali katero od sestavin zdravila,
- če imate hudo jetrno ali ledvično odpoved ali pomanjkanje glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (redka dedna bolezen rdečih krvničk).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh (pri zvišani telesni temperaturi) oziroma 5 dneh (ob bolečinah pri otrocih) ali 7 dneh (ob bolečinah pri odraslih), se morate posvetovati z zdravnikom.

Ob pojavu oteženega dihanja, vročine ali gnojnega izpljunka pri prehladnih obolenjih je nujen obisk zdravnika.

Posebna previdnost oziroma nadzor zdravnika je potreben ob uporabi zdravila pri osebah z blago do zmerno jetrno ali ledvično okvaro, telesno oslabelih, kronično podhranjenih ali dehidriranih osebah in osebah, ki so odvisne od alkohola.

Z zdravnikom se posvetujte, če imate hemolitično anemijo (ste slabokrvni), sladkorno bolezen, okužbo z virusom HIV, cistično fibrozo, Downov sindrom, tumor, sepso (okužbo krvi), astmo oziroma preobčutljivost na acetylsalicilno kislino (aspirin).

Zdravilo znižuje zvišano telesno temperaturo, kar lahko prikrije okužbo.

Ob dolgotrajnejši uporabi zdravila lahko nastopijo motnje v delovanju ledvic in jeter.

Paracetamol lahko vpliva na nekatere izvide laboratorijskih preiskav. Lahko povzroči tudi nepravilne rezultate nekaterih testov za merjenje sladkorja v krvi.

Ni za uživanje!

Otroci in mladostniki

Paracetamol svečk 500 mg so namenjene uporabi pri otrocih, starejših od 6 let (težjih od 22 kg).

Druga zdravila in zdravilo Paracetamol svečke 500 mg

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Paracetamol svečk 500 mg ne smete uporabljati sočasno z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol. Paracetamol lahko vsebujejo tudi zdravila v drugih farmacevtskih oblikah, na primer sirupi, tablete, peroralne suspenzije, zrnca za peroralno raztopino ...

Prav tako ne uporabljajte Paracetamol svečk 500 mg sočasno z drugimi kombiniranimi protibolečinskimi zdravili, ki poleg paracetamola vsebujejo nesteroidne protivnetne in protirevmatične učinkovine (acetylsalicilna kislina, naproksen, ibuprofen ...).

Ob sočasni uporabi Paracetamol 500 mg svečk in drugih zdravil lahko pride do medsebojnega učinkovanja z naslednjimi zdravili oziroma učinkovinami, predvsem tistimi, ki spodbujajo jetrne encime: zdravila proti strjevanju krvi (varfarin), zdravila za zdravljenje epilepsije (karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, primidon, lamotrigin), protivirusna zdravila (interferon alfa, zidovudin), rifampicin, izoniazid in druga zdravila za zdravljenje tuberkuloze, kloramfenikol, salicilamid, flukloksacilin, domperidon, metoklopramid, holestiramin, probenecid, propantelin, medicinsko oglje.

Zdravilo Paracetamol svečke 500 mg skupaj s hrano in pijačo

V času uporabe Paracetamol svečk 500 mg ne pijte alkoholnih pijač.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Paracetamol svečke 500 mg uporabljajte med nosečnostjo in dojenjem le po nasvetu zdravnika.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Paracetamol svečke 500 mg vplivale na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO PARACETAMOL SVEČKE 500 mg

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Običajni odmerek sta 1 do 2 svečki do štirikrat dnevno; največji dnevni odmerek je 8 svečk.

Časovni presledek med dvema odmerkoma naj bo najmanj 4 ure.

Zdravilo začne delovati v 15 do 60 minutah in deluje do 6 ur.

Predpisanega odmerjanja ne smete prekoračiti.

Svečko uporabite tako, da pretrgate dvojni trak po zarezi, izluščite svečko in jo vstavite s konico naprej čim globlje v danko.

Ne uporabljajte zdravila dlje kot 3 zaporedne dni brez posveta z zdravnikom.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Otrokom, starim od 6 do 9 let (22 do 30 kg), dajte 1 svečko do trikrat dnevno, otrokom, starim od 9 do 12 let (30 do 40 kg), pa 1 svečko do štirikrat dnevno.

Običajni odmerek za otroke, starejše od 12 let, sta 1 do 2 svečki do štirikrat dnevno; največji dnevni odmerek je 8 svečk.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Paracetamol svečke 500 mg, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ob uporabi prevelikih odmerkov Paracetamol svečk 500 mg je potrebna takojšnja zdravniška pomoč kljub dobremu počutju, saj se znaki prevelikega odmerjanja lahko pokažejo šele čez nekaj dni.

V prvih 24 urah se običajno pojavita slabost in bruhanje, bledica, lahko tudi zaspanost in potenje. Trebušna bolečina, ki je lahko prvi znak okvare jeter, se pojavi 24 do 48 ur po uporabi zdravila, lahko pa šele 4 do 6 dni po uporabi zdravila. Tretji dan se lahko pojavijo znaki, kot so izguba apetita, vedno večja zmedenost, zlatenica in krvavitev iz prebavil. Sledijo lahko odpoved jeter, koma in smrt.

V primeru prevelikega odmerjanja paracetamola so opazili tudi srčno-mišične nepravilnosti in vnetje trebušne slinavke.

Predvsem pri bolnikih z obolenji jeter ali ledvic lahko uporaba prevelikih odmerkov zdravila povzroči hudo okvaro jeter in v nekaterih primerih hudo okvaro ledvic.

Tveganje za okvaro jeter je večje tudi pri starejših osebah, otrocih, podhranjenih bolnikih, osebah, ki so odvisne od alkohola, ter sočasni uporabi zdravil, ki spodbujajo jetrne encime.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Paracetamol svečke 500 mg

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V primeru naslednjih neželenih učinkov je nujna takojšnja zdravniška pomoč. Redki, vendar zelo hudi neželeni učinki, ki so lahko znak resne alergijske reakcije, so otekanje rok, nog, gležnjev, obraza, ustnic, ust ali žrela, kar lahko povzroči težave pri požiranju ali dihanju; astmatični napad, izpuščaji, koprivnica, omedlevica, potenje in padec krvnega tlaka, ki se stopnjuje do šoka.

Takoj obvestite zdravnika tudi ob pojavu zlatenice (porumenitev kože in oči), slabosti in bruhanja, bolečin v trebuhu, sprememb v odvajanju urina (pogosto odvajanje večjih količin urina, nenadno zmanjšanje količine urina, kri v urinu ali temno obarvan urin), nenadne utrujenosti ali splošne šibkosti.

Paracetamol svečke 500 mg lahko povzročijo lokalno draženje črevesne sluznice.

Redko se pojavi slabost, kožne preobčutljivostne reakcije (srbenje, izpuščaji, rdečina, koprivnica), zlatenica, povečana aktivnost jetrnih encimov, slabokrvnost (znaki so bledica, glavobol, nenadna utrujenost ali splošna šibkost, težko dihanje pri naporih, temno obarvan urin).

Zelo redko lahko pride do okvare jeter ali ledvic (predvsem pri dolgotrajnem jemanju prevelikih odmerkov) ali sprememb krvne slike (na primer zmanjšanje števila krvnih ploščic ali belih krvničk).

Obstajajo tudi zelo redka poročila o resnih kožnih reakcijah.

Pri bolnikih, ki so alergični na acetilsalicilno kislino ali nesteroidna in protirevmatična protivnetna zdravila, se lahko pojavi bronhospazem (krč sapnic).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA PARACETAMOL SVEČKE 500 mg

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte na suhem mestu, pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojniku poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvrči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE**Kaj vsebuje zdravilo Paracetamol svečke 500 mg**

1 svečka vsebuje 500 mg paracetamola.

Pomožna snov: trda mast.

Izgled zdravila Paracetamol svečke 500 mg in vsebina pakiranja

Paracetamol svečke 500 mg so trdne svečke, koničaste oblike, bele barve, svetleče površine.

Pakiranje je škatla z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem traku), s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Paracetamol svečke 500 mg

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 23. 8. 2021.



gorenjske lekarne