

Navodilo za uporabo

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za injiciranje natrijev klorid

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml
3. Kako uporabljati zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Natrijev klorid Braun 9 mg/ml
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml in za kaj ga uporabljamo

To zdravilo je raztopina natrijevega klorida za injiciranje.

Vsebuje natrijev klorid v koncentraciji, ki je podobna koncentraciji soli v krvi.

Uporablja se kot vehikel za dajanje zdravil.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml

Ne uporabljajte zdravila Natrijev klorid Braun 9 mg/ml:

- če imate zelo visoke ravni natrija v krvi (huda hipernatriemija)
- če imate zelo visoke ravni klorida v krvi (huda hiperkloremija)

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Natrijev klorid Braun 9 mg/ml se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Bodite posebej pozorni pri uporabi zdravila Natrijev klorid Braun 9 mg/ml:

- če imate nenormalno visoko raven natrija v krvi (hipernatriemija)
- če imate nenormalno visoko raven klorida v krvi (hiperkloremija)

Druga zdravila in zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Če jemljete zdravila, ki pomagajo povečati ravni natrija v krvi (kortikosteroidi, nekateri tipi protivnetnih zdravil) in prejimate zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml, lahko pride do otekanja (edemov).

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden prejmete to zdravilo.

Nosečnost

Ker so koncentracije natrija in klorida podobne koncentracijam v človeškem telesu, ni pričakovati nobenih škodljivih učinkov, če se zdravilo uporablja, kot je navedeno.

Dojenje

Ker so koncentracije natrija in klorida podobne koncentracijam v človeškem telesu, ni pričakovati nobenih škodljivih učinkov, če se zdravilo uporablja, kot je navedeno. Zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml se lahko uporablja med dojenjem, če je to potrebno.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

3. Kako uporabljati zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

To zdravilo se uporablja za pripravo injekcij (pripravkov, ki se dajejo z injekcijsko brizgo). Daje se v veno (intravenska uporaba), v mišico (intramuskularna uporaba) ali pod kožo (subkutana uporaba).

Odmerjanje

Količina zdravila, ki jo boste prejeli, je odvisna od želene koncentracije raztopljenega ali razredčenega zdravila.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Natrijev klorid Braun 9 mg/ml, kot bi smeli

Preveliko odmerjanje lahko povzroči nenormalno visokw ravni tekočine, natrija in klorida v krvi ter visoke ravni kislih snovi v krvi (kri postane kisl).

V takšnih primerih vam bodo takoj ustavili injiciranje. Dodatno lahko prejmete tablete za povečanje izločanja urina. Neprekinjeno vam bodo spremljali koncentracije elektrolitov v krvi. Zdravnik se bo odločil o nadaljnjem zdravljenju in ukrepih za normaliziranje ravni elektrolitov in kislinsko-bazičnega ravnovesja.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če se zdravilo uporablja v skladu z navodili, neželeni učinki niso pričakovani.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0) 8 2000 500

Faks: +386 (0) 8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Natrijev klorid Braun 9 mg/ml

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki ampule ali na škatli poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne uporabljajte, če je raztopina motna ali če vsebnik ali zaporka puščata.

Po pripravi mešanice za uporabo

Z mikrobiološkega stališča je treba raztopino uporabiti takoj. Če ni uporabljena takoj, je za čas shranjevanja med uporabo in pogoje shranjevanja pred uporabo odgovoren sam uporabnik in naj običajno ne sme biti daljši kot 24 ur pri temperaturi od 2 °C do 8 °C.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml

- Učinkovina je natrijev klorid.
1 ml raztopine vsebuje 9 mg natrijevega klorida.
- Druga sestavina zdravila je voda za injekcije.

Izgled zdravila Natrijev klorid Braun 9 mg/ml in vsebina pakiranja

Zdravilo Natrijev klorid Braun 9 mg/ml je bistra, brezbarvna raztopina.

Pakiranje:

- škatla s polietilenskimi ampulami (Mini-Plasco, Mini-Plasco connect): 20 x 10 ml, 20 x 20 ml
- škatla s polipropilenskimi ampulami (Mini-Plasco basic): 50 x 10 ml, 50 x 20 ml, 100 x 10 ml, 100 x 20 ml

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Natrijev klorid Braun 9 mg/ml

ZZ – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

B. Braun Melsungen AG, Carl Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Nemčija

Proizvajalec

B. Braun Melsungen AG, Carl Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Nemčija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 6. 2022.