

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1.3.1                             | Valsartan/Indapamide |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI-Slovenia          |

## NAVODILO ZA UPORABO

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1.3.1                             | Valsartan/Indapamide |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI-Slovenia          |

### Navodilo za uporabo

#### **Valomindo 160 mg/1,5 mg tablete s prirejenim sproščanjem** valsartan/indapamid

**Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

#### **Kaj vsebuje navodilo:**

1. Kaj je zdravilo Valomindo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Valomindo
3. Kako jemati zdravilo Valomindo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Valomindo
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

### **1. Kaj je zdravilo Valomindo in za kaj ga uporabljamo**

Zdravilo Valomindo vsebuje dve učinkovini, ki se imenujeta valsartan in indapamid.

Valsartan pripada skupini zdravil, znani pod imenom antagonisti receptorjev za angiotenzin II, ki pomagajo uravnati visok krvni tlak. Angiotenzin II je snov v telesu, ki povzroča oženje krvnih žil, kar posledično vpliva na povišanje krvnega tlaka. Valsartan deluje tako, da blokira učinek angiotenzina II, zato se krvne žile sprostijo in krvni tlak zniža.

Indapamid je diuretik. Večina diuretikov povečuje tvorbo urina, indapamid pa se od drugih diuretikov razlikuje po tem, da le rahlo povečuje tvorbo urina.

To zdravilo je namenjeno zniževanju visokega krvnega tlaka (hipertenzije) pri odraslih. Zdravnik vam lahko predpiše zdravilo Valomindo, če že jemljete valsartan in indapamid v enakih odmerkih, kot ju vsebuje to zdravilo, vendar v ločenih tabletah.

### **2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Valomindo**

#### **Ne jemljite zdravila Valomindo**

- če ste alergični na valsartan, indapamid, kateri koli drug sulfonamid ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če imate jetrno bolezen ali bolezen, imenovano jetrna encefalopatija (degenerativna bolezen možganov);
- če ste noseči že več kot 3 mesece (tudi v zgodnji nosečnosti raje ne jemljite zdravila Valomindo – glejte poglavje o nosečnosti);
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za znižanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren;
- če imate hudo ledvično bolezen;

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1.3.1                             | Valsartan/Indapamide |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI-Slovenia          |

- če imate nizko raven kalija v krvi.

### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

Pred začetkom jemanja zdravila Valomindo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate jetrno bolezen;
- če imate hude težave z ledvicami ali če se zdravite z dializo;
- če imate zoženje ledvične arterije;
- če so vam pred kratkim presadili ledvico (dobili ste novo ledvico);
- če imate hudo srčno bolezen, razen srčnega popuščanja in srčnega infarkta;
- če ste že kdaj v času jemanja drugega zdravila (lahko tudi katerega od zaviralcev ACE) otekli v jezik ali obraz zaradi alergijske reakcije, ki jo imenujemo angioedem, povejte zdravniku. Če pride do teh simptomov pri jemanju zdravila Valomindo, ga takoj prenehajte jemati in ga ne jemljite nikoli več. Glejte tudi poglavje 4 »Možni neželeni učinki«;
- če jemljete zdravila, ki povečujejo količino kalija v krvi. To vključuje kalijeve nadomestke ali nadomestke soli, ki vsebujejo kalij, zdravila, ki varčujejo s kalijem, in heparin. Morda bo treba v rednih intervalih preverjati količino kalija v vaši krvi;
- če imate aldosteronizem. To je bolezen, pri kateri vaše nadledvične žleze tvorijo preveč hormona aldosterona. Če pride do tega pri vas, uporaba zdravila Valomindo ni priporočena;
- če izgubite veliko tekočine (dehidracija) zaradi driske, bruhanja ali velikih odmerkov tablet za odvajanje vode (diuretikov);
- če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
  - zaviralec ACE (na primer enalapril, lizinopril ali ramipril), zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo,
  - aliskiren;
- če imate sladkorno bolezen;
- če imate putiko (protin);
- če imate kakršnekoli težave z motnjami srčnega ritma;
- če ste napoteni na preiskavo delovanja obščitnične žleze.

Zdravniku morate povedati, če ste imeli preobčutljivostne reakcije na svetlobo.

Če ugotovite poslabšanje vida ali bolečine v očeh. To so lahko znaki kopičenja tekočine v žilni plasti očesa (kar povzroči odstop žilnice) ali povišanja očesnega tlaka, ki se lahko zgodi v nekaj urah do tednih po jemanju indapamida. Če se ne zdravi, lahko to vodi v trajno izgubo vida. Če ste pred kratkim imeli alergijo na penicilin ali sulfonamide, je pri vas tveganje za pojav tega večje.

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija) v krvi.

Posvetujte se z zdravnikom, če se pri vas po jemanju zdravila Valomindo pojavijo bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje ali driska. O nadaljnjem zdravljenju bo odločil zdravnik. Ne prenehajte jemati zdravila Valomindo sami od sebe.

Glejte tudi informacije pod naslovom »Ne jemljite zdravila Valomindo«.

Zdravniku morate povedati če mislite, da ste noseči (ali če obstaja možnost, da zanosite). Uporaba zdravila Valomindo ni priporočljiva v zgodnjem obdobju nosečnosti, po tretjem mesecu nosečnosti pa ga ne smete jemati, ker lahko povzroči resno škodo vašemu otroku (glejte poglavje o nosečnosti).

**Če kaj od naštetega velja za vas, morate to povedati zdravniku, preden vzamete zdravilo Valomindo.**

### **Pomembna informacija za športnike**

|                 |                                  |             |
|-----------------|----------------------------------|-------------|
| PI_Text103441_1 | 17.11.2025 - Updated: 17.11.2025 | Page 3 of 9 |
|-----------------|----------------------------------|-------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1.3.1                             | Valsartan/Indapamide |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI-Slovenia          |

Športniki se morajo zavedati, da to zdravilo vsebuje učinkovino, ki lahko povzroči pozitiven izvid testov za doping.

### Otroci in mladostniki

Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in učinkovitosti tega zdravila ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih.

### Druga zdravila in zdravilo Valomindo

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Sočasno jemanje nekaterih drugih zdravil lahko vpliva na učinek zdravljenja z zdravilom Valomindo. Morda bo treba spremeniti odmere, izvesti druge ukrepe ali celo prenehati jemati katero od zdravil. To velja tako za zdravila na recept kot za tista brez recepta.

Obvezno povejte zdravniku, če jemljete katero koli od naslednjih zdravil, ker bo morda potrebna posebna previdnost:

- druga zdravila za znižanje krvnega tlaka, zlasti tablete za odvajanje vode (diuretike), zaviralce ACE (kot sta enalapril, lizinopril itd.) ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovoma »Ne jemljite zdravila Valomindo« in »Opozorila in previdnostni ukrepi«);
- zdravila, ki povečajo količino kalija v vaši krvi. To vključuje kalijeve nadomestke, nadomestke soli, ki vsebujejo kalij, zdravila, ki varčujejo s kalijem, in heparin;
- nekatere vrste zdravil za lajšanje bolečin, ki se imenujejo nesteroidna protivnetna zdravila;
- nekatere antibiotike (iz skupine rifamicinov), zdravilo, s katerim preprečujemo zavrnitev presadka (ciklosporin) in zdravilo, ki deluje proti retrovirusom in ga uporabljamo pri zdravljenju okužbe z virusom HIV oziroma bolezni AIDS (ritonavir). Navedena zdravila lahko okrepijo delovanje zdravila Valomindo;
- litij (zdravilo za zdravljenje nekaterih vrst psihiatričnih bolezni);
- zdravila za zdravljenje motenj srčnega ritma (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis);
- zdravila za zdravljenje psihičnih motenj, kot so depresija, tesnoba, shizofrenija (npr. triciklične antidepressive, antipsihotike, nevroleptike);
- bepridil (za zdravljenje bolečine v prsih (angine pectoris));
- cisaprid, difemanil (za zdravljenje prebavnih motenj);
- sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin v obliki injekcij (antibiotike za zdravljenje okužb);
- vinkamin v obliki injekcij (za zdravljenje simptomatskih kognitivnih motenj pri starejših, vključno z izgubo spomina);
- halofantrin (antiparazitik za zdravljenje določenih vrst malarije);
- pentamidin (za zdravljenje določenih vrst pljučnice);
- mizolastin (za zdravljenje alergijskih reakcij, kot je seneni nahod);
- nesteroidna protivnetna zdravila za zmanjševanje bolečine (npr. ibuprofen) ali acetilsalicilno kislino v velikih odmerkih;
- zaviralce angiotenzinske konvertaze (za zdravljenje visokega krvnega tlaka in srčnega popuščanja);
- amfotericin B v obliki injekcij (zdravila za zdravljenje glivičnih okužb);
- peroralne kortikosteroide za zdravljenje različnih bolezni, vključno s hudo astmo in revmatoidnim artritisom;
- stimulantna odvajala;
- baklofen (za zdravljenje bolnikov s togostjo mišic, ki nastaja pri boleznih, kot je multipla skleroza);
- diuretike, ki zadržujejo kalij (amilorid, spironolakton, triamteren);
- alopurinol (za zdravljenje protina);

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1.3.1                             | Valsartan/Indapamide |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI-Slovenia          |

- metformin (za zdravljenje sladkorne bolezni);
- jodirana kontrastna sredstva (za rentgenske preglede);
- kalcijeve tablete ali druge kalcijeve dodatke;
- ciklosporin, takrolimus ali druga zdravila za zaviranje imunskega sistema po presaditvi organov, za zdravljenje avtoimunskih bolezni ali hudih revmatskih ter dermatoloških bolezni;
- tetrakozaktid (za zdravljenje Crohnove bolezni).

### **Zdravilo Valomindo skupaj s hrano in pijačo**

Zdravilo Valomindo lahko jemljete s hrano ali brez nje.

### **Nosečnost in dojenje**

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

- **Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če obstaja možnost, da zanosite).** Zdravnik vam bo praviloma svetoval, da prenehate jemati zdravilo Valomindo, preden zanosite ali takoj, ko izveste, da ste noseči, in vam priporočil jemanje drugega zdravila namesto zdravila Valomindo. Jemanje zdravila Valomindo v zgodnjem obdobju nosečnosti ni priporočljivo, po tretjem mesecu nosečnosti pa ga ne smete jemati, ker lahko povzroči resno škodo vašemu otroku.
- **Povejte zdravniku, če dojite ali nameravate začeti dojit.** Zdravilo Valomindo ni priporočljivo za doječe matere. Če želite dojit, zlasti, če je vaš otrok novorojenček ali nedonošenček, bo zdravnik za vas morda izbral drugo zdravljenje.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Preden začnete voziti, uporabljati orodje, upravljati stroje ali izvajati druge dejavnosti, ki zahtevajo zbranost, morate zagotovo vedeti, kako zdravilo Valomindo deluje na vas. Kot številna druga zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka lahko zdravilo Valomindo povzroči omotičnost ali utrujenost in vpliva na sposobnost koncentracije. V tem primeru se morate izogibati vožnji z motornimi vozili ali opravljanju drugih aktivnosti, ki zahtevajo odzivnost.

## **3. Kako jemati zdravilo Valomindo**

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočen odmerek zdravila Valomindo je ena tableta na dan, najbolje zjutraj. Zdravilo Valomindo vzemite vsak dan ob približno istem času.

Tablete lahko jemljete ne glede na obroke hrane. Tablete pogoltnite cele z nekaj tekočine. Ne smete jih drobiti ali žvečiti.

Ljudje z visokim krvnim tlakom pogosto ne čutijo nobenih težav, povezanih s tem. Veliko se jih lahko počuti povsem normalno. Zato je zelo pomembno, da hodite na preglede k zdravniku, tudi če se počutite dobro. Zdravljenje visokega krvnega tlaka običajno traja vse življenje.

### **Če ste vzeli večji odmerek zdravila Valomindo, kot bi smeli**

Če ste vzeli preveliko količino tablet, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če občutite hudo omotičnost in/ali omedlevico, ležite.

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1.3.1                             | Valsartan/Indapamide |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI-Slovenia          |

Zelo velik odmerek zdravila Valomindo lahko povzroči slabost, bruhanje, znižanje krvnega tlaka, krče, omotico, zaspanost, zmedenost in spremembe v količini urina, ki ga proizvedejo ledvice.

#### **Če ste pozabili vzeti zdravilo Valomindo**

Če ste pozabili vzeti zdravilo Valomindo, vzemite naslednji odmerek ob predvidenem času.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

#### **Če ste prenehali jemati zdravilo Valomindo**

Ker traja zdravljenje povišanega krvnega tlaka običajno vse življenje, **se morate pred prenehanjem jemanja tega zdravila posvetovati z zdravnikom**. Ne prenehajte jemati zdravila, razen če vam je tako naročil zdravnik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

## **4. Možni neželeni učinki**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

**Takoj prenehajte jemati zdravilo in nemudoma obiščite svojega zdravnika, če se pojavijo kateri koli od naslednjih neželenih učinkov:**

- angioedem in/ali koprivnica. Za angioedem je značilno otekanje kože udov ali obraza, otekanje ustnic ali jezika, otekanje sluznice grla ali dihalnih poti, kar ima za posledico kratko sapo ali oteženo požiranje. Če se pojavi, se takoj posvetujte z zdravnikom (zelo redki) (*pojavi se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov*);
- hude kožne reakcije, vključno s hudim kožnim izpuščajem, pordelostjo kože po vsem telesu, močnim srbenjem, pojavom mehurjev na koži, lupljenjem in otekanjem kože, vnetjem sluznic (Stevens-Johnsonov sindrom), ali druge alergijske reakcije (zelo redki) (*pojavi se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov*);
- smrtno nevaren nereden srčni utrip (zelo redki) (*pojavi se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov*);
- vnetje trebušne slinavke, ki lahko povzroči hude bolečine v trebuhu in hrbtu, ki jih spremlja zelo slabo počutje (zelo redki) (*pojavi se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov*);
- bolezen možganov, ki je posledica bolezni jeter (jetna encefalopatija) (neznana pogostnost);
- vnetje jeter (hepatitis) (neznana pogostnost).

**Če opazite katerega koli od teh simptomov, takoj prenehajte jemati zdravilo Valomindo in se posvetujte z zdravnikom (glejte tudi poglavje 2 »Opozorila in previdnostni ukrepi«).**

**Drugi neželeni učinki vključujejo:**

**Pogosti** (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- nizka vrednost kalija v krvi;
- alergijske reakcije, pretežno dermatološke, pri bolnikih, ki so nagnjeni k alergijskim in astmatičnim reakcijam;
- rdeč, izbočen kožni izpuščaj.

**Občasni** (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- nizka vrednost natrija v krvi, ki lahko privede do dehidracije in nizkega krvnega tlaka;
- občutek vrtenja (vrtoglavica);
- kašelj;
- bruhanje;

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1.3.1                             | Valsartan/Indapamide |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI-Slovenia          |

- bolečine v trebuhu;
- droben, rdečkast izpuščaj na koži (purpura);
- impotenca (nezmožnost doseganja in vzdrževanja erekcije);
- utrujenost.

**Redki** (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1 000 bolnikov):

- nizka vrednost klorida v krvi;
- nizka vrednost magnezija v krvi;
- glavobol;
- mravljinčenje (parestezija);
- prebavne motnje (npr. slabost, zaprtje);
- suha usta.

**Zelo redki** (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov):

- spremembe v krvnih celicah, kot so trombocitopenija (zmanjšanje števila krvnih ploščic (trombocitov), kar povzroči hiter pojav modric in krvavitve iz nosu), levkopenija (zmanjšanje števila belih krvničk, kar lahko povzroči nepojasnjeno vročino, bolečino v grlu ali druge gripi podobne simptome – če se to pojavi, se posvetujte z zdravnikom) in anemija (zmanjšanje števila rdečih krvničk);
- povečanje koncentracije kalcija v krvi;
- nizek krvni tlak;
- nenormalno delovanje jeter;
- bolezen ledvic (simptomi so utrujenost, povečana potreba po uriniranju, srbeča koža, slabost, otekli udi);
- intestinalni angioedem: oteklost črevesja s simptomi, kot so bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje in driska.

**Neznana pogostnost** (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- zmanjšana koncentracija hemoglobina in zmanjšan odstotek rdečih krvnih celic v krvi (ki lahko v hudih primerih povzroči anemijo);
- povečana koncentracija kalija v krvi (ki lahko v hudih primerih sproži mišične krče, nenormalen srčni ritem);
- nenadna izguba zavesti (sinkopa);
- kratkovidnost (miopija);
- zamegljen vid;
- okvara vida;
- poslabšanje vida ali bolečine v očeh zaradi visokega tlaka (možni znaki kopičenja tekočine v žilni plasti očesa (kar povzroči odstop žilnice) ali akutni glavkom z zaprtim zakotjem);
- nenormalni zapis EKG srca;
- škrlatno-rdeči madeži, zvišana telesna temperatura, srbenje (znaki vnetja krvnih žil, imenovanega vaskulitis);
- povečane vrednosti jetrnih testov (kar lahko kaže na poškodbo jeter), vključno s povečano koncentracijo bilirubina v krvi (ki lahko v hudih primerih povzroči porumenelost kože in oči);
- če imate sistemski lupus eritematosus (bolezen imunskega sistema, ki povzroča vnetje in poškodbo sklepov, kit ali organov s simptomi, kot so kožni izpuščaji, utrujenost, izguba apetita, povečanje telesne mase in bolečine v sklepih), se bolezen lahko poslabša;
- poročali so tudi o primerih fotosenzitivnih reakcij (spremembe v videzu kože) po izpostavljanju sončnim ali umetnim UVA žarkom;
- kožni izpuščaj;
- srbenje kože;
- bolečine v mišicah;
- povečanje koncentracije kreatinina v serumu (kar lahko kaže na nenormalno delovanje ledvic);
- povečanje koncentracije glukoze v krvi pri bolnikih s sladkorno boleznijo;

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1.3.1                             | Valsartan/Indapamide |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI-Slovenia          |

- povečanje vrednosti sečne kisline – snovi, ki lahko povzroči nastanek ali poslabšanje putike (boleč(i) sklep(i), zlasti na nogah).

#### **Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke  
Sektor za farmakovigilanco  
Nacionalni center za farmakovigilanco  
Slovenčeva ulica 22  
SI-1000 Ljubljana  
Tel: +386 (0)8 2000 500  
Faks: +386 (0)8 2000 510  
e-pošta: [h-farmakovigilanca@jazmp.si](mailto:h-farmakovigilanca@jazmp.si)  
spletna stran: [www.jazmp.si](http://www.jazmp.si)

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

## **5. Shranjevanje zdravila Valomindo**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu za oznako »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.  
Za shranjevanje zdravila ni posebnih temperaturnih omejitev.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

## **6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije**

### **Kaj vsebuje zdravilo Valomindo**

- Učinkovini sta valsartan in indapamid.  
Ena tableta s prirejenim sproščanjem vsebuje 160 mg valsartana in 1,5 mg indapamida.
- Druge sestavine zdravila so:  
*Sloj valsartana:* mikrokristalna celuloza, krospovidon, brezvodni koloidni silicijev dioksid in magnezijev stearat.  
*Sloj indapamida:* mikrokristalna celuloza, manitol, hipromeloza, brezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat, karbomeri in rumeni železov oksid (E172).

### **Izgled zdravila Valomindo in vsebina pakiranja**

160 mg/1,5 mg tablete s prirejenim sproščanjem: okrogle, obojestransko izbočene, dvoslojne tablete. En sloj je rjavkasto rumene barve, lisast in ima oznako V12. Drugi sloj je bele do rumeno bele barve. Velikost tablete: premer približno 11 mm.

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1.3.1                             | Valsartan/Indapamide |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI-Slovenia          |

Zdravilo Valomindo je na voljo v škatlah po:

- 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 ali 100 tablet s prirejenim sproščanjem v pretisnih omotih.
- 14, 28, 56 ali 84 tablet s prirejenim sproščanjem v pretisnih omotih, koledarsko pakiranje.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

#### **Način in režim izdaje zdravila Valomindo**

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

#### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec**

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

**Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:**

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Češka, Estonija, Slovaška, Latvija,<br>Litva, Madžarska, Poljska                   | Vabinxo   |
| Bolgarija, Ciper, Grčija, Hrvaška,<br>Portugalska, Romunija, Slovenija,<br>Španija | Valomindo |

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 2. 2025.**