

NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Deferasiroks Teva 125 mg disperzibilne tablete
Deferasiroks Teva 250 mg disperzibilne tablete
Deferasiroks Teva 500 mg disperzibilne tablete

deferasiroks

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Deferasiroks Teva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Deferasiroks Teva
3. Kako jemati zdravilo Deferasiroks Teva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Deferasiroks Teva
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Deferasiroks Teva in za kaj ga uporabljamo

Kaj je zdravilo Deferasiroks Teva

Zdravilo Deferasiroks Teva vsebuje učinkovino, ki jo imenujemo deferasiroks. Je kelator železa, kar pomeni, da to zdravilo uporabljamo za odstranjevanje presežka železa iz telesa (stanje imenovano tudi preobremenitev z železom). Zdravilo Deferasiroks Teva veže in odstrani presežno železo, ki se potem izloči večinoma z blatom.

Za kaj uporabljamo zdravilo Deferasiroks Teva

Bolniki z različnimi vrstami slabokrvnosti (npr. s talasemijo, z boleznijo srpastih celic ali z mielodisplastičnim sindromom – MDS), lahko potrebujejo večkratne transfuzije krvi. Vendar pa večkratne transfuzije krvi lahko povzročijo kopičenje presežka železa. Kri namreč vsebuje železo, presežno železo, ki ga dobite s transfuzijami krvi, pa se iz vašega telesa ne more odstraniti po naravni poti. Tudi pri bolnikih s sindromi talasemije, ki niso posledica transfuzij, lahko sčasoma pride do preobremenitve z železom, predvsem zaradi povečane absorpcije železa iz prehrane, kar je odziv telesa na znižano število krvnih celic. Sčasoma lahko presežek železa poškoduje pomembne organe kot so jetra in srce. Za odstranjevanje presežnega železa in zmanjševanje nevarnosti za poškodbe organov, se uporabljajo zdravila imenovana *kelatorji železa*.

Zdravilo Deferasiroks Teva uporabljamo za zdravljenje kronične preobremenitve z železom zaradi pogostih transfuzij krvi pri bolnikih z beta talasemijo major, starih 6 let ali več.

Zdravilo Deferasiroks Teva uporabljamo tudi za zdravljenje kronične preobremenitve z železom v primerih, ko je zdravljenje z deferoksaminom kontraindicirano ali neprimerno pri bolnikih z beta talasemijo major s preobremenitvijo z železom zaradi manj pogostih transfuzij krvi, pri bolnikih z drugimi vrstami slabokrvnosti in pri otrocih, starih od 2 do 5 let.

Zdravilo Deferasiroks Teva poleg tega uporabljamo tudi, kadar je zdravljenje z deferoksaminom kontraindicirano ali neprimerno pri bolnikih, ki so stari 10 let ali več in imajo preobremenitev z železom in sindrome talasemije, vendar ti niso posledica transfuzij.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Deferasiroks Teva

NE jemljite zdravila Deferasiroks Teva:

- če ste alergični na deferasiroks ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6). Če to velja za vas, **obvestite o tem zdravnika še pred začetkom jemanja zdravila Deferasiroks Teva**. Če mislite, da bi bili lahko alergični, se posvetujte z zdravnikom.
- če imate zmerno ali hudo bolezen ledvic,
- če trenutno jemljete katero koli drugo zdravilo, ki kelira železo.

Zdravilo Deferasiroks Teva NI priporočljivo:

- če imate napredovalo obliko mielodisplastičnega sindroma (MDS, zmanjšano nastajanje krvnih celic v kostnem mozgu) ali napredovalo obliko raka.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Deferasiroks Teva se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate težave z ledvicami ali z jetri,
- če imate težave s srcem zaradi preobremenitve z železom,
- če opazite izrazito zmanjšanje izločanja urina (znak težav z ledvicami),
- če dobite hud izpuščaj, če začnete težko dihati, postanete omotični ali začnete otekati pretežno v obraz in grlo/žrelo (znaki hude alergične reakcije, glejte tudi poglavje 4 "Možni neželeni učinki"),
- če dobite izpuščaj, predele rdeče kože, mehurčast izpuščaj na ustnicah, očeh ali v ustih, luščenje kože, zvišano telesno temperaturo (znaki hude kožne reakcije, glejte tudi poglavje 4 "Možni neželeni učinki"),
- če pride do kombinacije znakov, kot so dremavost, bolečina v zgornjem desnem delu trebuha, porumenevanje ali rumena obarvanost kože ali oči in temna barva urina (znaki težav z jetri),
- če bruhate kri in/ali imate črno blato,
- če vas pogosto boli trebuh, posebno po uživanju hrane ali po jemanju zdravila Deferasiroks Teva,
- če vas pogosto muči zgaga,
- če vam preiskava krvi pokaže zmanjšano koncentracijo trombocitov ali levkocitov,
- če imate zamegljen vid,
- če imate drisko ali bruhate.

Če kar koli od navedenega velja za vas, takoj obvestite zdravnika.

Spremljanje vašega zdravljenja z zdravilom Deferasiroks Teva

Med zdravljenjem boste imeli redne preiskave krvi in urina. S tem se bo spremljala količina železa v vašem telesu (vrednost *feritina* v krvi), da bi ugotovili, kako dobro učinkuje zdravilo Deferasiroks Teva. Preiskave bodo pokazale tudi delovanje vaših ledvic (vrednost kreatinina v krvi, prisotnost proteinov v urinu) in jeter (vrednosti transaminaz v krvi). Zdravnik vas bo morda napotil na biopsijo ledvic, če bo posumil, da imate pomembno okvaro ledvic. Poleg tega boste morda opravili preiskavo z MR (magnetno resonančnim) slikanjem, s katero je mogoče določiti količino železa v vaših jetrih. Te preiskave bo vaš zdravnik upošteval pri izbiranju za vas najbolj ustreznega odmerka zdravila Deferasiroks Teva in se na podlagi izvidov teh preiskav tudi odločil, kdaj bi morali prenehati z jemanjem zdravila Deferasiroks Teva.

Med zdravljenjem boste vsako leto kot previdnostni ukrep opravili testiranje vida in sluha.

Druga zdravila in zdravilo Deferasiroks Teva

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. To vključuje še posebno:

- druge kelatorje železa, ki se jih NE sme jemati sočasno z zdravilom Deferasiroks Teva.
- antacide (zdravila za lajšanje težav pri zgagi), ki vsebujejo aluminij in se jih NE sme jemati istočasno kot zdravilo Deferasiroks Teva,
- ciklosporin (za preprečevanje zavrnitve presajenega organa in za zdravljenje drugih bolezni, kot sta revmatoidni artritis ali atopijski dermatitis),
- simvastatin (za zniževanje holesterola),
- določena zdravila proti bolečinam ali protivnetna zdravila (na primer acetilsalicilna kislina, ibuprofen, kortikosteroidi),
- peroralne difosfonate (za zdravljenje osteoporoze),
- antikoagulate (za preprečevanje in zdravljenje strjevanja krvi),
- hormonska kontracepcijska sredstva (zdravila za preprečevanje nosečnosti),
- bepridil, ergotamin (v primeru težav s srcem ali pri migreni),
- repaglinid (za zdravljenje sladkorne bolezni),
- rifampicin (za zdravljenje tuberkuloze),
- fenitoin, fenobarbital, karbamazepin (za zdravljenje epilepsije),
- ritonavir (za zdravljenje okužbe z virusom HIV),
- paklitaksel (za zdravljenje raka),
- teofilin (za zdravljenje bolezni dihal, kot je astma),
- klopazepin (za zdravljenje psihiatričnih motenj, kot je shizofrenija),
- tizanidin (mišični relaksant),
- olestiramin (za zniževanje ravni holesterola v krvi).

Za spremljanje koncentracije nekaterih od navedenih zdravil v krvi boste morda morali opraviti dodatne preiskave.

Starejši bolniki (stari 65 let in več)

Zdravilo Deferasiroks Teva lahko uporabljajo ljudje, stari 65 let ali več, v enakih odmerkih kot ostali odrasli. Pri starejših bolnikih se lahko pogosteje pojavijo neželeni učinki (zlasti driske) kot pri mlajših bolnikih. Zdravnik mora starejše bolnike bolj skrbno spremljati glede neželenih učinkov, zaradi katerih bi bilo morda treba prilagoditi odmere.

Otroci in mladostniki

Zdravilo Deferasiroks Teva se lahko uporablja pri otrocih in mladostnikih, ki prejemajo redne transfuzije krvi, starih 2 leti ali več in pri otrocih in mladostnikih, ki ne prejemajo rednih transfuzij krvi, starih 10 let ali več. Z rastjo otroka bo zdravnik prilagajal odmere.

Uporaba zdravila Deferasiroks Teva pri otrocih, mlajših od 2 let, NI priporočljiva.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo.

Uporaba zdravila Deferasiroks Teva med nosečnostjo in dojenjem NI priporočljiva, če ni nujno potrebno.

Če trenutno za zaščito pred nosečnostjo uporabljate peroralne kontraceptive ali kontracepcijski obliž, morate uporabljati še dodatno zaščito ali drugo vrsto kontracepcije (na primer kondom), saj zdravilo Deferasiroks Teva lahko zmanjša učinkovitost kontracepcijskih tablet in obližev.

Med zdravljenjem z zdravilom Deferasiroks Teva dojenje NI priporočljivo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Če ste po jemanju zdravila Deferasiroks Teva omotični, ne vozite in ne upravljajte nobenih naprav ali strojev, dokler se ne počutite spet normalno.

Zdravilo Deferasiroks Teva vsebuje laktozo monohidrat

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Deferasiroks Teva

Zdravljenje z zdravilom Deferasiroks Teva bo nadzoroval zdravnik z izkušnjami z zdravljenem preobremenitve z železom zaradi krvnih transfuzij.

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Koliko zdravila Deferasiroks Teva jemati

Odmerek zdravila Deferasiroks Teva je pri vseh bolnikih odvisen od telesne mase. Vaš zdravnik bo izračunal odmerek, ki ga potrebujete, in vam bo povedal, koliko tablet boste vzeli vsak dan.

- Za bolnike, ki prejema redne transfuzije krvi, je običajni dnevni odmerek zdravila Deferasiroks Teva v obliki disperzibilnih tablet na začetku zdravljenja 20 mg na kilogram telesne mase. Vaš zdravnik vam bo morda svetoval večji ali manjši začetni odmerek glede na vaše individualne potrebe zdravljenja.
- Za bolnike, ki ne prejema rednih transfuzij krvi, je običajni dnevni odmerek zdravila Deferasiroks Teva v obliki disperzibilnih tablet na začetku zdravljenja 10 mg na kilogram telesne mase.
- Glede na vaš odziv na zdravljenje vam lahko zdravnik kasneje prilagodi zdravljenje in morda poveča ali zmanjša odmerek.
- Za bolnike, ki prejema redne transfuzije krvi, je največji priporočeni dnevni odmerek zdravila Deferasiroks Teva v obliki disperzibilnih tablet 40 mg na kilogram telesne mase, za odrasle bolnike, ki ne prejema rednih transfuzij krvi 20 mg na kilogram telesne mase in za otroke in mladostnike, ki ne prejema rednih transfuzij krvi, 10 mg na kilogram telesne mase.

Deferasiroks je na voljo tudi v obliki filmsko obloženih tablet. Če prehajate z uporabe filmsko obloženih tablet na uporabo disperzibilnih tablet, bo potrebno prilagoditi odmerek zdravila.

Kdaj jemati zdravilo Deferasiroks Teva



- Vzemite zdravilo Deferasiroks Teva enkrat na dan, vsak dan, približno ob istem času.
- Disperzibilne tablete zdravila Deferasiroks Teva vzemite na prazen želodec.
- Nato počakajte vsaj 30 minut, preden zaužijete hrano.


Če boste jemali tablete zdravila Deferasiroks Teva vsak dan ob istem času, tudi ne boste pozabili, kdaj jih morate vzeti.

Kako jemati zdravilo Deferasiroks Teva:

- **Spustite** tableto(e) v kozarec vode ali jabolčnega ali pomarančnega soka (100 do 200 ml).
- **Mešajte**, dokler se tableta(e) popolnoma ne raztopi(jo). Tekočina v kozarcu bo videti motna.
- **Popijte** vso vsebino kozarca. Preostanku dodajte malo vode ali soka, zaokrožite s kozarcem in zaužijte.

NE raztaplajte tablet v gaziranih pijačah ali mleku.
NE žvečite, lomite ali drobite tablet.
NE pogoltnite celih tablet.





Kako dolgo jemati zdravilo Deferasiroks Teva

Z vsakodnevnim jemanjem zdravila Deferasiroks Teva nadaljujte tako dolgo, kot vam je naročil vaš zdravnik. Gre za dolgotrajno zdravljenje, ki lahko traja mesece ali leta. Vaš zdravnik bo redno spremljal vaše stanje in preverjal, ali zdravljenje učinkuje v skladu s pričakovanji (glejte tudi poglavje 2: “Spremljanje vašega zdravljenja z zdravilom Deferasiroks Teva”).

Če imate vprašanja o tem, kako dolgo jemati zdravilo Deferasiroks Teva, se pogovorite z zdravnikom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Deferasiroks Teva, kot bi smeli

Če ste vzeli preveč zdravila Deferasiroks Teva ali je vaše tablete pomotoma zaužil kdo drug, takoj pokličite zdravnika ali v bolnišnico. Pokažite jim škatlo zdravila. Morda bo potrebna zdravniško pomoč.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Deferasiroks Teva

Če ste pozabili vzeti odmerek, ga vzemite isti dan, takoj ko se spomnite. Naslednji odmerek vzemite kot po navadi. Naslednjega dne NE vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto (oziroma prejšnje tablete).

Če ste prenehali jemati zdravilo Deferasiroks Teva

NE prenehajte jemati zdravila Deferasiroks Teva, če vam tega ne naroči zdravnik. Če zdravilo prenehate jemati, se presežek železa ne bo več izločal iz vašega telesa (glejte tudi poglavje zgoraj “Kako dolgo jemati zdravilo Deferasiroks Teva”).

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Večinoma so ti neželeni učinki blagi do zmerni in izzvenijo v nekaj dneh do nekaj tednih zdravljenja.

Nekateri neželeni učinki so lahko resni in zahtevajo takojšnjo zdravniško pomoč.

*Ti neželeni učinki se pojavljajo **občasno** (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov) ali redko (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov).*

- Če dobite hud izpuščaj ali se pojavijo težave z dihanjem in omotičnost ali otekanje pretežno v obraz in grlo/žrelo (znaki hude alergijske reakcije),
- če dobite hud izpuščaj, se pojavi rdeča koža, mehurčast izpuščaj na ustnicah, očeh ali v ustih, luščenja kože in zvišanja telesne temperature (znaki hude alergijske reakcije),
- če opazite izrazito zmanjšanje izločanja urina (znak težav z ledvicami),
- če se pojavi kombinacija znakov, kot so dremavost, bolečina v zgornjem desnem delu trebuha, porumenevanje ali rumena obarvanost kože ali oči in temna barva urina (znaki težav z jetri),
- če bruhate kri in/ali imate črno blato,
- če vas pogosto boli trebuh, posebno po uživanju hrane ali po jemanju zdravila Deferasiroks Teva,
- če vas pogosto muči zgaga,
- če se pojavi delna izguba vida,
- če se pojavijo hude bolečine v zgornjem delu trebuha (vnetje trebušne slinavke),

prenehajte jemati to zdravilo in takoj obvestite zdravnika.

Nekateri neželeni učinki lahko postanejo resni.

Ti neželeni učinki se pojavljajo občasno.

- Če vaš vid postane nejasen ali zamegljen,
 - če se vam poslabša sluh,
- čim prej obvestite zdravnika.**

Drugi neželeni učinki

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov)

- nepravilnosti v izvidih preiskav delovanja ledvic.

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- prebavne težave, kot so slabost, bruhanje, driska, bolečine v trebuhu, napihnjen trebuh, zaprtje, prebavne motnje
- izpuščaj
- glavobol
- nenormalni izvidi testov jetrne funkcije
- srbenje
- nenormalen izvid preiskave urina (beljakovine v urinu)

Če imate s katerim koli od navedenih učinkov resne težave, obvestite zdravnika.

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- omotičnost
- povišana telesna temperatura
- boleče grlo ali žrelo
- otekanje rok ali nog
- spremembe barve kože
- tesnoba
- motnje spanja
- utrujenost

Če imate s katerim koli od navedenih učinkov resne težave, obvestite zdravnika.

Pogostnost neznana (pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

- zmanjšano število celic, ki so pomembne za strjevanje krvi (trombocitopenija), zmanjšano število rdečih krvnih celic (poslabšanje anemije), zmanjšano število belih krvnih celic (nevtropenija) ali zmanjšano število vseh vrst krvnih celic (pancitopenija)
- izpadanje las
- ledvični kamni
- zmanjšano izločanje urina
- raztrganje stene želodca ali črevesa, ki je lahko zelo boleče in povzroči občutek slabosti
- hude bolečine v zgornjem delu trebuha (vnetje trebušne slinavke)
- nenormalna vsebnost kisline v krvi

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Deferasiroks Teva

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnem omotu in na škatli poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje tega zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana ali opazite, da je bila že odprta.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Deferasiroks Teva

- Učinkovina je deferasiroks.
Zdravilo Deferasiroks Teva 125 mg: Ena disperzibilna tableta vsebuje 125 mg deferasiroksa.
Zdravilo Deferasiroks Teva 250 mg: Ena disperzibilna tableta vsebuje 250 mg deferasiroksa.
Zdravilo Deferasiroks Teva 500 mg: Ena disperzibilna tableta vsebuje 500 mg deferasiroksa.
- Druge sestavine zdravila so laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, krospovidon tipa A, povidon K30, natrijev lavrilsulfat, brezvoden koloidni silicijev dioksid in magnezijev stearat.

Izgled zdravila Deferasiroks Teva in vsebina pakiranja

Deferasiroks Teva 125 mg disperzibilne tablete so bele do sivo bele, okrogle, ploščate tablete z zaobljenimi robovi in vtisnjenima oznakama 77 na eni in 438 na drugi strani. Premer ene tablete je približno 12 mm.

Deferasiroks Teva 250 mg disperzibilne tablete so bele do sivo bele, okrogle, ploščate tablete z zaobljenimi robovi in vtisnjenima oznakama 77 na eni 439 na drugi strani). Premer tablete je približno 15 mm.

Deferasiroks Teva 500 mg disperzibilne tablete so bele do sivo bele, okrogle, ploščate tablete z zaobljenimi robovi in vtisnjenima oznakama 77 na eni 440 na drugi strani). Premer tablete je približno 20 mm.

Deferasiroks Teva 125 mg in 250 mg disperzibilne tablete so na voljo v pretisnih omotih, ki vsebujejo 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 84, 84 x 1, 98 in 98 x 1 disperzibilnih tablet.

Deferasiroks Teva 500 mg disperzibilne tablete so na voljo v pretisnih omotih, ki vsebujejo 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 84, 84 x 1, 98, 98 x 1 in 294 (3 x 98) disperzibilnih tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila

Rp/Spec – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nizozemska

Izdelovalec

Teva UK Limited
Brampton Road, Hampden Park
Eastbourne, East Sussex
BN22 9AG
Združeno kraljestvo

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
89143 Blaubeuren
Nemčija

Pliva Croatia Ltd.
Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb
Hrvaška

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Belgija:	Deferasirox 125 mg, 250 mg in 500 mg dispergeerbare tabletten
Bulgarija:	Дефериасирукс Тева 250 мг диспергиращи се таблетки
Česka:	DEFERASIROX TEVA
Danska:	Deferasirox Teva
Estonija:	Deferasirox Teva
Francija:	Déférasirox Teva 125 mg, 250 mg & 500 mg, comprimé dispersible
Hrvaška:	Deferasiroks Pliva 125 mg, 250 mg in 500 mg tablete za oralnu suspenziju
Italija:	Deferasirox Teva
Luksemburg:	Deferasirox Teva 125 mg, 250 mg in 500 mg comprimés dispersibles
Nemčija:	Deferasirox-ratiopharm 125 mg, 250 mg in 500 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Nizozemska:	Deferasirox Teva 125 mg, 250 mg in 500 mg, dispergeerbare tabletten
Norveška:	Deferasirox Teva
Portugalska:	Deferasirox ratiopharm 125 mg, 250 mg in 500 mg comprimidos dispersíveis
Romunija:	Deferasirox Teva 125 mg, 250 mg & 500 mg comprimate pentru dispersie orală
Slovenija:	Deferasiroks Teva 125 mg, 250 mg in 500 mg disperzibilne tablete
Švedska:	Deferasirox Teva
Slovaška:	Deferasirox TEVA Slovakia 125 mg Deferasirox TEVA Slovakia 250 mg Deferasirox TEVA Slovakia 500 mg
Španija:	Deferasirox Teva 125 mg in 500 mg comprimidos dispersables EFG
Združeno kraljestvo:	Deferasirox Teva 125 mg, 250 mg in 500 mg Dispersible Tablets

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 12.09.2017.