

NAVODILO ZA UPORABO

Dorzolamid/timolol Teva brez konzervansa 20 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina dorzolamid/timolol

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Dorzolamid/timolol Teva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Dorzolamid/timolol Teva
3. Kako uporabljati zdravilo Dorzolamid/timolol Teva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Dorzolamid/timolol Teva
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO DORZOLAMID/TIMOLOL TEVA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Dorzolamid/timolol Teva kapljice za oko vsebujejo dve zdravili: dorzolamid in timolol. Dorzolamid spada v skupino zdravil, ki jih imenujemo zaviralci karboanhidraze. Timolol spada v skupino učinkovin, imenovanih zaviralci adrenergičnih receptorjev beta. Ti dve učinkovini na različna načina znižujeta tlak v očesu.

To zdravilo se predpisuje za znižanje povišanega tlaka v očesu pri zdravljenju glavkoma, kadar kapljice za oko, ki vsebujejo zaviralec adrenergičnih receptorjev beta, ne zadostujejo.

Če ga ne zdravimo, lahko povišan tlak v očesu poškoduje vidni živec, posledica pa sta poslabšanje vida ali celo slepota. Če je vaš zdravnik ugotovil, da imate povišan tlak v očesu, boste potrebovali redne preglede oči in meritve očesnega tlaka.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO DORZOLAMID/TIMOLOL TEVA

NE uporabljajte zdravila Dorzolamid/timolol Teva, kapljice za oko, raztopina

- če ste alergični (preobčutljivi) na dorzolamidjev hidroklorid, timololijev maleat, zaviralce adrenergičnih receptorjev beta ali katerikoli sestavino tega zdravila (glejte 6. Dodatne informacije spodaj);
- če imate hudo okvaro ledvic ali težave z ledvicami ali neustrezno vrednost pH (ravnovesje med kislinami in bazami) krvi;
- če imate ali ste kdaj imeli težave z dihanjem, kot je astma, ali če imate hudo kronično obstruktivno pljučno bolezen kot je bronhitis (huda bolezen pljuč, ki lahko povzroči piskajoče dihanje, težave pri dihanju in/ali dolgotrajen kašelj).
- če imate počasen utrip srca, srčno popuščanje ali motnje srčnega ritma (nepravilno bitje srca).

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Dorzolamid/timolol Teva

Pred uporabo zdravila Dorzolamid/timolol Teva svojemu zdravniku povejte o vseh zdravstvenih težavah ali težavah z očmi, ki jih imate ali ste jih imeli v preteklosti, zlasti, če gre za:

- koronarno srčno bolezen (simptomi so lahko bolečine v prsih, tiščanje v prsih, oteženo dihanje, dušenje), popuščanje srca, nizek krvni pritisk.
- težave srčnega ritma kot je počasen srčni utrip,
- imate težave pri dihanju, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen (bolezen pljuč, ki lahko povzroči sopenje, tažave pri dihanju in/ali dolgotrajen kašelj),
- motnje v prekrvavitvi (Raynaud-ova bolezen ali Raynaud-ov sindrom)
- sladkorno bolezen; timolol lahko prikrije znake in simptome nizke koncentracije glukoze v krvi (hipoglikemija)
- prekomerno delovanje ščitnice; timolol lahko prikrije znake in simptome.

Če se ste alergični ali pa se pojavijo alergijske reakcije, kot so izpuščaji, otekanje obraza, ustnic, jezika in/ali grla, kar bi lahko otežuje dihanje ali požiranje, se morate takoj posvetovati z zdravnikom.

Zdravniku povejte, če ste imeli v preteklosti bolezen srca, saj bo v tem primeru zdravnik pozorno spremljal vaš srčni pulz in ostale simptome med uporabo tega zdravila.

Zdravniku povejte, če občutite mišično šibkost ali če so pri vas odkrili miastenijo gravis.

Če se pri vas pojavi vnetje očesne veznice (rdeče in vneto oko), oteklost oči ali vek, kožni izpuščaj, huda kožna reakcija ali srbenje v očesu ali okoli njega, se nemudoma obrnite na zdravnika. Ti simptomi so lahko posledica alergijske reakcije ali neželenih učinkov tega zdravila (glejte »Možni neželeni učinki«).

V primeru okužbe očesa, poškodbe očesa, operacije na očesu, pojava drugih reakcij ali poslabšanja že obstoječih simptomov to povejte svojemu zdravniku.

Zdravila Dorzolamid/timolol Teva niso raziskali pri bolnikih, ki uporabljajo kontaktne leče. Če uporabljate mehke kontaktne leče, se posvetujte z zdravnikom, preden začnete uporabljati zdravilo Dorzolamid/timolol Teva.

Pred kirurškim posegom in anestezijo (tudi pri zobozdravniku) povejte zdravniku ali zobozdravniku, da jemljete zdravilo Dorzolamid/timolol Teva, ker obstaja možnost, da timolol povzroči spremembo učinkov drugih zdravil, ki se uporabljajo med anestezijo.

Uporaba pri otrocih

Izkušenj z uporabo tega zdravila pri dojenčkih in otrocih je malo.

Uporaba pri starejših bolnikih

V študijah s tem zdravilom (formulacija s konzervansom) so bili njegovi učinki pri starejših in mlajših bolnikih podobni.

Uporaba pri bolnikih z okvaro jeter

Zdravniku povejte, če imate ali ste v preteklosti imeli težave z jetri.

Uporaba drugih zdravil

Zdravilo Dorzolamid/timolol Teva lahko vpliva ali pa naj vplivajo druga zdravila, ki jih uporabljate, vključno druge kapljice za zdravljenje glavkoma. Obvestite zdravnika, če uporabljate ali nameravate uporabiti zdravila, ki zmanjšujejo krvni pritisk, zdravila za srce ali za zdravljenje sladkorne bolezni. Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali nameravate vzeti katerokoli zdravilo (vključno s kapljicami za oko), tudi če ste ga dobili brez recepta. To je še posebej pomembno, če za vas velja karkoli od naslednjega:

- če jemljete antihipertenzivna zdravila, ki se uporabljajo za zniževanje visokega krvnega tlaka, ali zdravila za zdravljenje bolezni srca, kot so zaviralci kalcijevih kanalov, zaviralci adrenergičnih receptorjev beta ali digoksin;

- če jemljete zdravila za zdravljenje motenj srčnega utripa ali nerednega srčnega utripa, kot sta kinidin (ki se lahko uporablja tudi za zdravljenje nekaterih vrst malarije) ali digoksin;
- če uporabljate druge kapljice za oči, ki vsebujejo zaviralec adrenergičnih receptorjev beta;
- če jemljete kak drug zaviralec karboanhidraze, kot je acetazolamid. To vrsto zdravila lahko uporabljate skozi usta, kot kapljice za oko ali drugače;
- če jemljete zaviralce monoamin-oksidge (MAOi) za zdravljenje depresije ali druge bolezni;
- če jemljete parasimpatikomimetike, ki se predpisujejo za lažje uriniranje. Parasimpatomimetiki so tudi vrsta zdravil, ki se včasih uporablja za normaliziranje črevesne peristaltike;
- če jemljete narkotike, kot je morfin, za lajšanje zmernih do močnih bolečin, ali če jemljete velike odmerke aspirina; čeprav ni dokazov, da dorzolamidjev hidroklorid medsebojno deluje z aspirinom, je znano, da z aspirinom medsebojno delujejo nekatera druga zdravila, ki so sorodna dorzolamidjevemu hidrokloridu in se jemljejo skozi usta;
- če jemljete zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni ali visoke ravni sladkorja v krvi;
- če jemljete zdravila za zdravljenje depresije kot stafluoksetin in paroksetin;
- če jemljete epinefrin (adrenalin).

Nosečnost in dojenje

Uporaba med nosečnostjo

Povejte zdravniku, če ste noseči, če mislite, da ste morda noseči, ali če skušate zanositi. Zdravila Dorzolamide/Timolol Teva ne smete uporabljati med nosečnostjo, razen, če vaš zdravnik presodi, da je nujno potrebno.

Uporaba v obdobju dojenja

Povejte zdravniku, če dojite ali če boste začeli dojiti. Zdravila Dorzolamide/Timolol Teva ne smete uporabljati v obdobju dojenja. Timolol lahko prehaja v mleko.

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Možni neželeni učinki, kot je zamegljen vid, lahko vplivajo na sposobnost nekaterih bolnikov za vožnjo in/ali upravljanje strojev. Če imate kakršnekoli težave, ne vozite in ne uporabljate strojev ter se posvetujte z zdravnikom.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO DORZOLAMID/TIMOLOL TEVA

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Primerno odmerjanje in trajanje zdravljenja vam bo določil zdravnik.

Običajni odmerek je ena kapljica v prizadeto oko (očesi) dvakrat dnevno, na primer zjutraj in zvečer.

Če uporabljate to zdravilo skupaj z drugimi kapljicami za oko, si morate kapljice vkapati z vsaj 10-minutnim razmikom.

Odmerkov ne smete spreminjati, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Če morate prenehati z zdravljenjem, se takoj posvetujte z zdravnikom (glejte »Če prenehate jemati zdravilo Dorzolamide/Timolol« spodaj).


Pazite, da se s konico vsebnika ne dotaknete očesa ali predela okoli očesa. Konica se lahko okuži z bakterijami, ki lahko povzročijo okužbo očesa. To lahko pripelje do resne poškodbe očesa in celo do izgube vida. Da bi preprečili okužbo vsebnika, si pred uporabo zdravila umijte roke in pazite, da se s konico vsebnika ničesar ne dotaknete.

Navodila za uporabo


Raztopino iz vsakega vsebnika z enim odmerkom je treba takoj po odprtju vkapati v prizadeto oko oziroma obe očesi. Pred vsako uporabo je treba odpreti nov vsebnik z enim odmerkom in ga takoj po uporabi zavreči, ker po odprtju vsebnika raztopina ne ostane sterilna.

Priporočamo vam, da si pred uporabo kapljic za oko umijete roke. Morda vam bo lažje, če si boste zdravilo vkapali v oko pred ogledalom.


1. Odprite vrečko iz folije, ki vsebuje 5 ločenih vsebnikov z enim odmerkom.
2. Najprej si umijete roke, nato pa odlomite enega od vsebnikov s traku, kakor je prikazano.



3. Zasukajte zgornji del vsebnika, kakor je prikazano.



4. Nagnite glavo nazaj in rahlo potegnite spodnjo veko navzdol, da nastane žep med veko in očesom, kakor je prikazano.



5. V prizadeto oko (oziroma obe očesi) kapnite eno kapljico zdravila, kakor vam je naročil zdravnik. Vsak vsebnik z enim odmerkom vsebuje dovolj raztopine za obe očesi.
6. Ko kapnete zdravilo v oko, zavrzite uporabljeni vsebnik z enim odmerkom, tudi če je v njem še kaj raztopine. Tako boste preprečili okužbo raztopine, ki ne vsebuje konzervansa.
7. Shranite preostale vsebnike v vrečko iz folije; uporabiti jih morate v 15 dneh po odprtju vrečke. Če vam 15 dni po odprtju vrečke ostane kakšen vsebnik, ga morate ustrezno zavreči in odpreti novo vrečko. Pomembno je, da nadaljujete uporabo kapljic za oko, kakor vam je predpisal zdravnik.

Po vnosu zdravila Dorzolamide/Timolol Teva pritisnite prst na rob očesa pri nosu (kot prikazuje slika, spodaj), za 2 minuti. S tem preprečimo, da bi timolol uhajal v ostale predele telesa.



Če ste uporabili večji odmerek zdravila Dorzolamid/timolol Teva, kot bi smeli

Pomembno je, da upoštevate odmerek, ki vam ga je predpisal zdravnik. Če kapnete preveč kapljic v oko ali če pogoltnete nekaj raztopine iz vsebnika, se boste morda slabo počutili. Med drugim lahko postanete omotični, imate glavobol, težko dihate, se vam upočasni srčni utrip ali se počutite bolni in utrujeni. Če občutite kateregakoli od zgoraj opisanih učinkov, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Dorzolamid/timolol Teva

Pomembno je, da uporabljate zdravilo tako, kakor vam je naročil zdravnik. Če ste pozabili vzeti odmerek, ga vzemite takoj, ko je mogoče. Vendar izpustite pozabljeni odmerek, če je skoraj že čas za naslednjega, in nadaljujte običajni režim odmerjanja. Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadomestili pozabljenega.

Če ste prenehali jemati zdravilo Dorzolamid/timolol Teva

Če bi radi prenehali jemati to zdravilo, se najprej posvetujte z zdravnikom. V nobenem primeru ne smete nenadoma končati zdravljenja, ker bi se nekateri simptomi lahko poslabšali, zlasti če imate koronarno srčno bolezen ali prekomerno delovanje ščitnice.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Dorzolamid/timolol Teva neželene učinke, vendar se ti ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Običajno lahko nadaljujete z uporabo kapljic, razen če se pojavijo resni neželeni učinki. Če ste v skrbeh, o tem obvestite zdravnika ali farmacevta. Ne prenehajte z uporabo zdravila Dorzolamid/timolol Teva, preden se posvetujete z zdravnikom.

Redko (pri 1 do 10 od 10.000 uporabnikov) se lahko pojavijo alergijske reakcije, kot so oteklost ustnic, oči in ust, težave z dihanjem ali hude kožne reakcije z mehurji ali luščenjem. Če občutite kateregakoli od teh učinkov, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

V primeru okužbe očesa, pojava drugih očesnih reakcij ali poslabšanja že obstoječih simptomov to povejte svojemu zdravniku.

Pri uporabi zdravila Dorzolamid/timolol Teva so opazili naslednje neželene učinke. Tako kot tudi ostala zdravila, ki se dajejo v oči, se timolol absorbira v kri. Ta lahko povzroči podobne neželene učinke, kot tiste, ki se lahko pojavijo pri uporabi intravenske in/ali oralne oblike antagonistov adrenergičnih receptorjev beta. Pojavnost neželenih učinkov po uporabi kapljic za oči je nižja, kot če se zdravilo jemlje-oralno ali injicira. Spodaj navedeni neželeni učinki vključujejo reakcije, ki so jih opazili pri zdravljenju bolezni oči z antagonisti adrenergičnih receptorjev beta:

Zelo pogosti neželeni učinki (pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- pekoč občutek in zbadanje v očesu in okolici,
- težave pri okušanju: nekateri bolniki so poročali o grenkem okusu po uporabi kapljic za oko.

PIL;UK/H/2364/001/IB/005

Pogosti neželeni učinki (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov):

- glavobol;
- znaki in simptomi draženje očesa (kot naprimer pekoče oči, občutek, zbadanje v očesu, srbeče, solzne, pordele oči) vnetje vek, vnetje roženice, razjeda na roženici (poškodba prve plasti zrkla), zmanjšana občutljivost roženice (oseba ne občuti, če ji kaj pade v oko, in ne občuti bolečine) suhe oči, boleče oči, zamegljen vid;
- sinuzitis;
- slabost;
- šibkost/utrujenost.

Občasni neželeni učinki (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov):

- omotica, depresija;
- vnetje šarenice (obarvanega dela očesa), spremembe vida;
- počasnejši utrip srca, omedlevica;
- zasoplost/težko dihanje;
- prebavne motnje;
- ledvični kamni.

Redki neželeni učinki (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov):

- sistemski eritematozni lupus (rdeči madeži oziroma izpuščaji, v glavnem na obrazu, ki jih lahko spremljajo utrujenost, vročina, bolečine v sklepih in bolečine v mišicah);
- občutek otrplosti/mravljinčenja, nenavaden občutek kot pik igle in šivanke, možganska kap, poslabšana prekrvavitev možgan, nespečnost (insomnija), nočne more, izguba spomina, zmanjšanje spolne želje, mišična šibkost/poslabšanje miastenije gravis (bolezni mišic);
- oteklost in/ali razdraženost očesa in okolice, povešanje zgornje očesne veke (delno zaprto oko), krastasta veka, odstop žilnice po filtracijskem posegu, ki lahko povzroči motnje vida, nizek tlak spremljajo jih lahko spremembe in motnje vida, dvojni vid;
- zvonjenje v ušesu;
- nizek krvni tlak, bolečine v prsih, palpitacije, spremembe v srčnem utripu ali povečano bitje srca, srčni napad, edem (otekanje), srčno popuščanje (bolezen srca z zasopljeno in otekanjem rok in nog, zaradi zadrževanja tekočin), težave v srčnem ritmu, hladne dlani in stopala, Raynaud-ov fenomen (poslabšana prekrvavitev, ki povzroča otrpelost prstov na nogah in rokah in spremembo barve le teh), krči in/ali bolečine v nogah pri hoji (klavdikacija);
- zasoplost, kašelj, težave pri dihanju, kratka sapa, krčenje dihalnih poti v pljučih (pri bolnikih, ki že imajo težave s pljuči), izcedek iz nosu, krvavitev iz nosu;
- razdraženost grla, suha usta, driska;
- izpuščaj ali vnetje kože, kožni izpuščaj srebrnega izgleda (psoriza) ali njeno poslabšanje, izpadanje las;
- Peyroniejeva bolezen (ki lahko povzroči ukrivljenost penisa);
- občutek šibkosti mišic, ki ni posledica telesne vadbe ali utrujenosti
- splošne alergijske reakcije, vključujoč otekanje podkožja, ki se lahko pojavi na obrazu in udih in lahko povzroči težave pri dihanju in požitanju, koprivnica, srbeč izpuščaj, omejen ali razširjen izpuščaj, srbenje, nenadna življensko orgožajoča alergijska reakcija.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- nizka raven glukoze v krvi;
- srčna odpoved;
- bolečine v trebuhu, bruhanje;
- bolečine v mišicah, ki jih ne povzroča telesna aktivnost;
- spolne motnje.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika, zlasti če opazite kakršnekoli spremembe in motnje vida pri uporabi zdravila Dorzolamid/timolol Teva po operaciji oči.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA DORZOLAMID/TIMOLOL TEVA

- Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
- Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na vsebniku in škatli. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.
- 15 dni po prvem odprtju vrečke zavržite morebitne vsebnike z enim odmerkom, ki jih niste uporabili.
- Odprt vsebnik z enim odmerkom, v katerem je še nekaj raztopine, zavržite takoj po prvi uporabi.
- Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
- Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.
- Vsebnike shranjujte v kartonski škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.
- Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Dorzolamid/timolol Teva

- Zdravilni učinkovini sta dorzolamid in timolol. En mililiter vsebuje 20 mg dorzolamida v obliki 22,26 mg dorzolamidijevega hidroklorida in 5 mg timolola v obliki 6,83 mg timololijevega maleata.
- Pomožne snovi so hidroksietilceluloza, manitol, natrijev citrat dihidrat, natrijev hidroksid in voda za injekcije.

Izgled zdravila Dorzolamid/timolol Teva in vsebina pakiranja

- Bistra, brezbarvna, rahlo viskozna raztopina. Vsaka vrečka iz folije vsebuje 5 ali 15 vsebnikov iz polietilena majhne gostote, ki vsebujejo po en odmerek (0,2 ml raztopine).
- Na voljo so pakiranja po 5, 20, 30, 60 in 120 vsebnikov z enim odmerkom. Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Dorzolamid/timolol Teva

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542DR Utrecht, Nizozemska

Izdelovalec

Teva Runcorn

Aston Lane North, Whitehouse Vale Industrial Estate, Preston Brook, Runcorn Cheshire WA7 3FA
Velika Britanija

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Velika Britanija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

PIL;UK/H/2364/001/IB/005

Nizozemska

TEVA SANTE
Rue Bellocier, 89107 Sens
Francija

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő
Madžarska

TEVA Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov
Češka

Za zdravilo je izdano dovoljenje za promet v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija	Dorzolamid/Timolol Teva 2 %/0,5 % Augentropfen im Einzeldosisbehältnis
Bolgarija	Dorzolol 2 %/0,5 % Eye drops, solution
Ciper	Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva 2/0,5%
Danska	Dorzolamid/Timolol Teva
Estonija	Dotimopt
Finska	Dorzolamide/timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä
Francija	DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA 20mg / 5mg / ml, collyre en solution en récipient unidose
Grčija	Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva 2/0,5% οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα - Εφάπαξ δόσης
Italija	Dorzolamide /Timololo Teva Italia 2%/0.5% collirio
Latvija	Dotimopt 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums
Litva	Dotimopt 20 mg/5 mg/ml akių lašai, tirpalas
Madžarska	Dorzolamid-Timolol-Teva szemcsepp
Nizozemska	Dorzolamide/Timolol 20mg/5 mg conserveermiddelvrij PCH, oogdruppels, oplossing voor eenmalig gebruik ml
Poljska	Dotiteva MINIMS
Portugalska	Dorzolamida + Timolol Teva
Romunija	Optikum 20 mg/ 5 mg/ ml, picaturi oftalmice, solutie
Slovaška	Dorzotim
Slovenija	Dorzolamid/timolol Teva brez konzervansa 20 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina
Španija	Dorzolamida/Timolol Colirteva 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución en envase unidos
Švedska	Dorzolamide/timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare
Velika Britanija	Dorzolamide/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml Preservative-Free, Single Dose Eye Drops, Solution

Navodilo je bilo odobreno 10.02.2012