

Navodilo za uporabo

Syntocinon 5 i.e. koncentrat za raztopino za infundiranje / raztopina za injiciranje
Syntocinon 10 i.e. koncentrat za raztopino za infundiranje / raztopina za injiciranje

sintetični oksitocin

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Syntocinon in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Syntocinon
3. Kako uporabljati zdravilo Syntocinon
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Syntocinon
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Syntocinon in za kaj ga uporabljamo

Kaj je zdravilo Syntocinon

SYNTOCINON 5 i.e./ml in 10 i.e./ml koncentrat za raztopino za infundiranje / raztopina za injiciranje vsebuje učinkovino, ki jo imenujemo oksitocin.

Syntocinon sodi v skupino zdravil, ki jih imenujemo oksitocinska zdravila in spodbujajo krčenje maternice (uterusa) oziroma popadke. Učinkovina je povsem enaka oksitocinu, naravnemu hormonu, ki se sprošča iz hipofize.

Za kaj uporabljamo zdravilo Syntocinon

Pred porodom (antepartum)

- za spodbujanje (indukcijo) ali pospeševanje popadkov (poroda)
- za okrepitev prešibkih popadkov (inercije ali oslabelosti maternice) med porodom
- v zgodnjih stopnjah nosečnosti kot dodatno zdravljenje pri nedokončanem, neizogibnem ali zadržanem splavu.

Po rojstvu otroka (postpartum)

- za spodbujanje krčenja maternice med carskim rezom po rojstvu otroka in posteljice
- za preprečevanje in zdravljenje poporodne krvavitve, kadar se maternica po rojstvu otroka in posteljice ne krči dovolj močno

Če vas zanima, kako zdravilo Syntocinon deluje ali zakaj so vam ga predpisali, se obrnite na zdravnika.

Kako deluje zdravilo Syntocinon

Zdravilo Syntocinon deluje tako, da spodbuja ritmično krčenje maternice med porodom (popadke) in po rojstvu otroka.

Spremljanje med zdravljenjem z zdravilom Syntocinon

Med prejemanjem infuzije zdravila Syntocinon bo zdravstveno osebje skrbno spremljalo vas in vašega otroka, da bi preprečili zaplete, in odmerjanje zdravila ustrezno prilagodilo vašemu odzivu.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Syntocinon

Ne uporabljajte zdravila Syntocinon

- če ste **alergični na učinkovino** ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če zdravnik meni, da **sprožanje ali pospeševanje krčenja maternice za vas ne bi bilo primerno, na primer:**
 - če imate že neobičajno močne (hipertonične) popadke,
 - če vašemu otroku primanjkuje kisika (plodova stiska), kadar ne sledi takojšen porod,
 - če zdravnik odsvetuje spontan oziroma vaginalni porod;
- če **pri otroku ali materi obstajajo razlogi za carski rez, na primer:**
 - če je **glava vašega otroka prevelika** za vašo medenico (kefalopelvično nesorazmerje),
 - če je **vaš otrok v porodnem kanalu v nepravilnem položaju** (nenormalna vstava),
 - če **posteljica leži blizu ustja maternice ali preko njega** (predležea posteljica, placenta praevia),
 - če **vašemu otroku primanjkuje kisika** zaradi krvnih žil, ki potekajo preko ustja maternice (predležea žilje, vasa praevia),
 - če se **posteljica loči od maternice še preden se otrok rodi** (prezgodnja ločitev posteljice),
 - če se med otroka in ustje maternice zagodzi **ena ali več zank popkovnice** pred razpokom jajčnega mehurja (zdrs popkovnice) ali po njem (prolaps popkovnice),
 - če je maternica prekomerno raztegnjena in **bi se zato lahko raztrgala** (ruptura maternice), v primeru, da na primer nosite več kot enega otroka (mnogoplodna nosečnost) ali imate **preveč plodovnice** v maternici (polihidramniji),
 - če ste **bili prej noseči že najmanj petkrat** (visoka mnogorodnost) ali imate brazgotino na maternici zaradi predhodnega **carskega reza** ali drugega kirurškega posega,
 - če ste prejeli **zdravila, ki jih imenujemo prostaglandini** (uporabljamo jih za spodbujanje [indukcijo] poroda ali za zdravljenje želodčne razjede). Zdravila Syntocinon se ne sme uporabiti v obdobju 6 ur po uporabi vaginalnih prostaglandinov, ker se delovanje obeh vrst zdravil lahko okrepi.

Če kar koli od navedenega velja za vas, **ne smete prejeti zdravila Syntocinon, pač pa se morate posvetovati z zdravnikom.**

Če menite, da bi lahko bili alergični na zdravilo Syntocinon, se posvetujte z zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Syntocinon

- Zdravilo Syntocinon sme dajati samo zdravstveno osebje. Prejemate ga lahko samo v bolnišnici, kjer usposobljeno zdravstveno osebje lahko spremlja krčenje maternice in ustrezno ukrepa v nujnih primerih.
- Alergija na lateks: učinkovina v zdravilu Syntocinon lahko pri bolnikih z alergijo na lateks povzroči hudo alergijsko reakcijo (anafilaksijo). Povejte zdravniku, če veste, da ste alergični na lateks.

Zdravila Syntocinon se ne sme uporabljati v daljših obdobjih

- če zdravilo **ne more okrepiti popadkov** (inercija maternice, ki se ne odziva na oksitocin),
- če imate **zvišan krvni tlak, če so v vašem urinu prisotne beljakovine in otekate** (preeklampsija ali nosečnostna toksemija),
- če imate hude **težave s srcem in/ali krvnim obtokom** (hudo kardiovaskularno bolezen).

Pri uporabi zdravila Syntocinon je potrebna previdnost

- če ste nagnjeni k **bolečinam za prsnico** (k angini pectoris, ki jo povzroča premajhen pretok krvi po žilah, ki oskrbujejo srce) zaradi **že prisotne bolezni srca in/ali krvnega obtoka** (kardiovaskularne bolezni),
- če imate ugotovljeno **motnjo srčnega ritma** ("sindrom dolgega intervala QT") oziroma z njo povezane simptome ali jemljete zdravila, za katera je znano, da povzročajo ta sindrom,
- če zdravilo prejmete s hitro intravensko injekcijo (bolus), lahko to povzroči **znižanje krvnega tlaka** (hipotenzijo), **nenaden kratkotrajen občutek vročine** (vročinski obliv), pogosto po celem telesu, in **pospešen srčni utrip** (refleksna tahikardija).

Pri odmerjanju zdravila Syntocinon za spodbujanje in pospeševanje poroda:

- ga je treba vedno dati v obliki **intravenske infuzije**,
- hitrost infundiranja je treba nastaviti tako, da vzdržuje podoben vzorec popadkov kot pri spontanem porodu, pri tem je treba upoštevati odziv posamezne porodnice. Previsoki odmerki lahko povzročijo **zelo močne neprekinjene popadke (tetanične kontrakcije) in celo raztrganje (rupturo) maternice** z resnimi zapleti pri otroku (**plodova stiska ali smrt**) ali pri vas.

Pri uporabi zdravila Syntocinon bodite še posebno pozorni:

- če sta vas zdravnik ali babica opozorila, da je normalen porod lahko otežen, ker ima vaš **otrok preveliko glavo**, da bi lahko vstopila v vašo medenico (kefalopelvično nesorazmerje),
- če vaši popadki **postajajo med porodom vedno šibkejši** (sekundarna inercija maternice),
- če imate blago ali zmerno **zvišan krvni tlak zaradi nosečnosti** ali **težave s srcem in/ali krvnim obtokom** (kardiovaskularno bolezen),
- če ste stari **več kot 35 let**,
- če ste imeli **carski rez** s kirurškim rezom tik nad sečnim mehurjem (carski rez v spodnjem delu maternice),
- če imate **težave z ledvicami** (zdravilo Syntocinon lahko povzroči zastajanje vode v telesu).

Če kar koli od navedenega velja za vas, **čimprej obvestite zdravnika**.

- V redkih primerih lahko zdravilo Syntocinon povzroči **nenormalno strjevanje krvi, krvavitev in anemijo** (diseminirano intravaskularno koagulacijo).
- Visoki odmerki zdravila Syntocinon lahko povzročijo, da tekočina iz maternice (**plodovnica**) **vdre v krvni obtok** (embolija s plodovnico) v času porodnih popadkov in/ali rojstva ploda.
- Visoki odmerki zdravila Syntocinon, ki jih porodnica prejema dalj časa, sočasno pa spije ali prejme večjo količino tekočine, lahko povzročijo:
 - hudo **napihnjenost trebuha in oteženo dihanje** (akutni pljučni edem),
 - **znižano koncentracijo soli (natrija) v krvi** (hiponatriemijo).

Pred začetkom jemanja zdravila Syntocinon se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Druga zdravila in zdravilo Syntocinon

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. Posebno pomembno pa je, da zdravniku poveste, če ste prejeli katero od naslednjih zdravil:

- anestetike za lokalno ali regionalno anestezijo, zlasti za epiduralno anestezijo (injekcijo lokalnega anestetika v okolico hrbtenjače) za lajšanje bolečin med porodom: zdravilo Syntocinon lahko okrepi njihov učinek zoževanja žil (vazokonstrikcije) in povzroči zvišanje krvnega tlaka,
- zdravila, ki jih imenujemo prostaglandini (uporabljamo jih za spodbujanje [indukcijo] poroda ali za zdravljenje želodčne razjede), in podobna zdravila: zdravilo Syntocinon lahko okrepi njihovo delovanje na krčenje maternice,
- zdravila, ki lahko povzročijo motnje srčnega ritma (podaljšanje intervala QT): zdravilo Syntocinon lahko še okrepi ta učinek,
- anestetiki v obliki plina ali hlapne tekočine, ki povzročijo splošno anestezijo, če jih vdihavamo, (kot so halotan, ciklopropan, sevofluran ali desfluran) lahko oslabijo delovanje zdravila Syntocinon na krčenje maternice.

Nosečnost in dojenje

Nosečnost

Glede na obsežne izkušnje z zdravilom Syntocinon, njegovo kemijsko zgradbo in farmakološke lastnosti ni pričakovati, da bi lahko pri uporabi v skladu z indikacijami škodovalo otroku. Zdravilo Syntocinon se sme uporabljati za spodbujanje poroda le pod zdravniškim nadzorom.

Dojenje

Zdravilo Syntocinon je mogoče v majhnih količinah najti v materinem mleku, pri tem pa ni pričakovati, da bi lahko škodljivo vplivalo na otroka, saj se v njegovih prebavilih hitro inaktivira. Iz tega razloga je uporaba zdravila Syntocinon varna za novorojenčka.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Podatek ni potreben.

Zdravilo Syntocinon vsebuje natrij

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na 1 ml ampulo, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

3. Kako uporabljati zdravilo Syntocinon

Zdravilo Syntocinon je treba dati v obliki infuzije ali injekcije v veno. Zdravilo se sme odmerjati samo v bolnišnici, kjer usposobljeno zdravstveno osebje lahko spremlja krčenje maternice. Glejte tudi poglavje **Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Syntocinon.**

Koliko zdravila Syntocinon je treba uporabiti

Koliko zdravila Syntocinon je treba uporabiti, bo določil zdravnik oziroma drug zdravstveni delavec. Za več informacij glejte poglavje na koncu navodila za uporabo. Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju.

Kdaj uporabljati zdravilo Syntocinon

Kdaj je treba uporabiti zdravilo Syntocinon, bo določil zdravnik. Za več podatkov se obrnite na zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca. Če se vam zdi, da je učinek zdravila Syntocinon premočan ali prešibak, se pogovorite z zdravnikom ali z drugim zdravstvenim delavcem.

Uporaba zdravila Syntocinon

Zdravilo Syntocinon je treba pred uporabo običajno razredčiti, nato pa ga zdravstveni delavec daje z intravensko (kapalno) infuzijo ali z injekcijo.

Uporaba pri starejših (stari 65 let ali več)

- O uporabi pri starejših bolnicah ni podatkov. Zdravilo Syntocinon ni namenjeno uporabi pri starejših.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih (v starosti od 2 do 17 let)

- O uporabi pri otrocih (starih od 2 do 11 let) ni podatkov. Zdravilo Syntocinon ni namenjeno uporabi pri otrocih.
- O uporabi pri mladostnikih (starih od 12 do 17 let) ni podatkov. Zdravilo Syntocinon ni namenjeno uporabi pri mladostnikih.

Kako dolgo je treba uporabljati zdravilo Syntocinon

Kako dolgo je treba uporabljati zdravilo Syntocinon, bo določil zdravnik. Če ste v dvomih, se pogovorite z zdravnikom ali z drugim zdravstvenim delavcem.

Če ste prejeli večji odmerek zdravila Syntocinon, kot bi smeli

To zdravilo prejimate v bolnišnici, zato ni zelo verjetno, da bi lahko prejeli prevelik odmerek. Če bi do tega kljub vsemu prišlo, bi šlo za nujno stanje, pri katerem bi osebje v bolnišnici takoj ukrepalo.

Če bi kdor koli pomotoma prejel to zdravilo, mora takoj poiskati zdravniško pomoč v bolnišnici na urgentnem bloku. Če je mogoče, naj ima s seboj preostanek zdravila ali prazno ovojnino zdravila.

Posledice premočnih krčenj maternice, ki bi jih povzročil prevelik odmerek zdravila Syntocinon, so navedene v poglavju 2 (**Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Syntocinon**) in poglavju 4 (**Možni neželeni učinki**):

- lahko pride do tega, da se posteljica prezgodaj loči od maternice (abrupcija placente),
- nekaj tekočine, ki obdaja plod, (plodovnice) lahko vdre v vaš krvni obtok (embolija s plodovnico),
- lahko pride do plodove stiske, hudih motenj dihanja pri otroku (asfiksije) in do smrti otroka,
- lahko pride do razpoka ali raztrganja (rupture) maternice.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Syntocinon

Ker vam bo zdravilo v vsakem primeru dal zdravnik ali drug zdravstveni delavec, ni velike verjetnosti, da bi izpustili odmerek.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Syntocinon

O tem, kdaj je treba prekiniti zdravljenje z zdravilom Syntocinon, bo odločil zdravnik. Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila lahko ima tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Nekateri neželeni učinki so lahko resni

Redki neželeni učinki (*pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov*):

- življenjsko nevarna, takojšnja sistemska alergijska reakcija (anafilaktična/anafilaktoidna reakcija) z zadihanostjo (dispnejo) in nizkim krvnim tlakom (hipotenzijo); življenjsko nevarna, takojšnja sistemska alergijska reakcija z močnim padcem krvnega tlaka (anafilaktični/anafilaktoidni šok).

Neželeni učinki z neznano pogostnostjo (*pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti*):

Učinki pri materi

- pomanjkanje krvi v srčni mišici (ishemija miokarda)
- motnja srčnega ritma (dolgi interval QTc)
- nizek krvni tlak (hipotenzija)
- premočno krčenje maternice (hipertonija)
- neprekinjeni popadki (tetanične kontrakcije)
- raztrganje maternice (ruptura uterusa)
- zastajanje tekočine (zastrupitev z vodo)
- znižana koncentracija natrija (soli) v krvi (hiponatriemija)
- akutni zastoj tekočine v pljučih (akutni pljučni edem)
- nenaden kratkotrajen občutek vročine, običajno po celem telesu (rdečica)
- nenormalno strjevanje krvi, krvavitev in anemija (diseminirana intravaskularna koagulacija)
- otekanje obraza, ustnic, jezika, grla in/ali rok in nog (možni znaki angioedema)

Če pride do česar koli od navedenega, **takoj obvestite zdravnika**.

Učinki pri otroku

Premočno krčenje maternice lahko povzroči:

- znižano koncentracijo natrija (soli) v krvi (hiponatriemijo pri novorojenčku)
- pomanjkanje kisika (plodovo stisko)
- dušenje zaradi premajhne oskrbe s kisikom in/ali preveč ogljikovega dioksida (asfiksijo)

- smrt

Če je kateri koli od navedenih učinkov močno izražen, **takoj obvestite zdravnika.**

Pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- glavobol
- hiter srčni utrip (tahikardija)
- počasen srčni utrip (bradikardija)
- občutek slabosti
- bruhanje

Če vas kateri koli od teh učinkov huje prizadene, **povejte zdravniku.**

Občasni neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- motnje srčnega ritma (aritmija)

Če vas kateri koli od teh učinkov huje prizadene, **povejte zdravniku.**

Redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- kožni izpuščaj

Če vas kateri koli od teh učinkov huje prizadene, **povejte zdravniku.**

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Syntocinon

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Po prvem odprtju: potrebno porabiti takoj.

Po redčenju: Kemijska in fizikalna stabilnost je bila dokazana za 24 ur pri 15°C - 25°C. Z mikrobiološkega stališča, je treba pripravljeno raztopino uporabiti takoj, razen, če metoda odpiranja/rekonstitucije/redčenja izključuje tveganje za mikrobiološko kontaminacijo. Če uporabnik pripravljene raztopine ne uporabi takoj, je za čas in pogoje shranjevanja pred uporabo odgovoren sam.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Syntocinon

- Učinkovina je sintetični oksitocin.
1 ml koncentrata za raztopino za infundiranje / raztopina za injiciranje (ena ampula) vsebuje 5 i.e. sintetičnega oksitocina oziroma 10 i.e. sintetičnega oksitocina.
- Druge sestavine zdravila so: natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, koncentrirana očetna kislina (ledocet), voda za injekcije.

Izgled zdravila Syntocinon in vsebina pakiranja

Zdravilo Syntocinon je sterilna bistra in brezbarvna raztopina. Na voljo je v omotih z 10 kartonskimi škatlami po 10 ampul (10 x 10) po 1 ml.

Zdravilo Syntocinon 5 i.e. koncentrat za raztopino za infundiranje / raztopina za injiciranje je na voljo tudi v škatli z 10 ampulami po 1 ml.

Način in režim izdaje zdravila

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Viartis Healthcare Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart, Dublin 15
DUBLIN
Irska

Proizvajalec

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs
69800 Saint Priest Cedex
Francija

Haupt Pharma Livron
1 rue Comte de Sinard, Livron Sur Drome, 26250
Francija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 7. 2. 2024

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:**Indukcija ali pospeševanje poroda**

Zdravilo Syntocinon dajemo v intravenski kapalni infuziji, najbolje z infuzijsko črpalko z nastavljivo hitrostjo infundiranja. Za kapalno infuzijo je priporočljivo razredčiti 5 i.e. zdravila Syntocinon v 500 ml fiziološke elektrolitne raztopine (kot je raztopina natrijevega klorida 9 mg/ml). Kadar je natrijev klorid kontraindiciran, se lahko uporabi raztopina glukoze 50 mg/ml. Za zagotovitev enakomernega razmešanja je treba steklenico ali vrečko pred uporabo nekajkrat prebrniti. Začetno hitrost infuzije je treba nastaviti na 1 do 4 milienote/minuto (2 do 8 kapljic/minuto). Hitrost infuzije je možno postopoma povečevati v presledkih, ki ne smejo biti krajši od 20 minut, in v korakih, ki ne smejo presegati 1-2 milienote/minuto, dokler vzorec kontrakcij ni podoben kot pri normalnem porodu. Pri nosečnosti malo pred rokom pogosto zadošča infuzija manj kot 10 milienot/minuto (20 kapljic/minuto), največja priporočena hitrost infuzije je 20 milienot/minuto (40 kapljic/minuto). V izjemnih primerih, pri katerih so potrebne večje hitrosti, na primer intrauterina smrt ali indukcija poroda v zgodnejšem stadiju nosečnosti, ko je maternica manj občutljiva za oksitocin, je priporočljiva uporaba bolj koncentrirane raztopine zdravila Syntocinon, na primer 10 i.e. v 500 ml. Pri uporabi avtomatizirane infuzijske črpalke, ki dovaja manjše volumne kot kapalna infuzija, je treba koncentracijo, primerno za infuzijo znotraj priporočenega razpona odmerjanja, izračunati glede na specifikacije črpalke. Pogostost, intenzivnost in trajanje kontrakcij, pa tudi plodovo srčno frekvenco je treba skrbno spremljati ves čas infuzije. Ko je ustrezna raven maternične aktivnosti dosežena, je pogosto mogoče zmanjšati hitrost infuzije. Infuzijo je treba nemudoma prekiniti v primeru hiperaktivnosti maternice in/ali plodove stiske. Pri ženskah ob roku ali malo pred rokom, pri katerih se po infuziji celotne količine 5 i.e. ne vzpostavijo redne kontrakcije, je priporočljivo opustiti poskus indukcije poroda; lahko ga ponovimo naslednji dan, ko spet začnemo s hitrostjo 1 do 4 milienote/minuto.

Nedokončani, neizogibni ali zadržani splav

5 i.e., danih z intravensko infuzijo (5 i.e., razredčenih v fiziološki elektrolitni raztopini in danih z intravensko kapalno infuzijo oziroma najbolje z infuzijsko črpalko z nastavljivo hitrostjo infundiranja, s trajanjem infuzije 5 minut), ali 5 i.e. do 10 i.e., danih intramuskularno, nato po potrebi intravenska infuzija s hitrostjo 20 do 40 milienot/minuto.

Carski rez

5 i.e., danih z intravensko infuzijo (5 i.e., razredčenih v fiziološki elektrolitni raztopini in danih z intravensko kapalno infuzijo oziroma najbolje z infuzijsko črpalko z nastavljivo hitrostjo infundiranja, s trajanjem infuzije 5 minut) takoj po otrokovem rojstvu.

Preprečevanje poporodne krvavitve

Običajni odmerek je 5 i.e., danih z intravensko infuzijo (5 i.e., razredčenih v fiziološki elektrolitni raztopini in danih z intravensko kapalno infuzijo oziroma najbolje z infuzijsko črpalko z nastavljivo hitrostjo infundiranja, s trajanjem infuzije 5 minut) ali 5 i.e. do 10 i.e., danih intramuskularno po iztisu posteljice. Pri ženskah, ki dobijo zdravilo Syntocinon za indukcijo ali pospeševanje poroda, je treba infuzijo nadaljevati s povečano hitrostjo v tretji porodni dobi in še nekaj ur po tem.

Zdravljenje poporodne krvavitve

5 i.e., danih z intravensko infuzijo (5 i.e., razredčenih v fiziološki elektrolitni raztopini in danih z intravensko kapalno infuzijo oziroma najbolje z infuzijsko črpalko z nastavljivo hitrostjo infundiranja, s trajanjem infuzije 5 minut), ali 5 i.e. do 10 i.e., danih intramuskularno, v težkih primerih nato še v intravenski infuziji raztopine, ki vsebuje 5 i.e. do 20 i.e. oksitocina v 500 ml raztopine elektrolita, s hitrostjo, ki je potrebna za obvladovanje atonije maternice.

Posebne skupine bolnikov**Okvara ledvic**

Študij pri bolnicah, ki imajo okvaro ledvic, niso izvajali.

Okvara jeter

Študij pri bolnicah, ki imajo okvaro jeter, niso izvajali.

Pediatrična populacija

Študij pri pediatričnih bolnikih niso izvajali.

Geriatrični bolniki

Študij pri starejših bolnikih (starih 65 let ali več) niso izvajali.