

NAVODILO ZA UPORABO

Daonil 5 mg tablete glibenklamid

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Daonil in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Daonil
3. Kako jemati zdravilo Daonil
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO DAONIL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Način delovanja

Zdravilo Daonil vsebuje glibenklamid, peroralni antidiabetik iz skupine sulfonilsečnin, ki znižuje krvni sladkor predvsem tako, da zveča odzivnost celic beta v trebušni slinavki za krvni sladkor in spodbuja izločanje insulina. Zveča odzivnost tkiv za insulin in zavira nastajanje glukoze v jetrih. Glibenklamid se dobro absorbira iz prebavil. Največjo koncentracijo v krvi doseže v 2 do 4 urah po zaužitju. Izloča se večinoma skozi ledvice, deloma pa z žolčem v obliki presnovkov, ki lahko pripomorejo k učinku zmanjšanega krvnega sladkorja glibenklamida.

Terapevtske indikacije

Sladkorna bolezen tipa 2, kadar z dieto, ustrezno fizično aktivnostjo in zmanjšanjem telesne mase ne moremo zadovoljivo zmanjšati nivoja krvnega sladkorja.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO DAONIL

Ne jemljite zdravila Daonil:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) glibenklamid ali katerikoli sestavino zdravila Daonil.
- če ste alergični na (preobčutljivi za) druge sulfonilsečnine, sulfonamide, sulfonamidne diuretike ali probenecid (možne so alergijske navzkrižne reakcije).
- če imate sladkorno bolezen tipa 1
- če je pri vas sekundarno zdravljenje z glibenklamidom popolnoma odpovedalo.
- če imate presnovne motnje (npr. diabetično ketoacidozo. Ketoacidoza je zvečana kislost v krvi ali tkivih zaradi kopičenja ketonskih teles).
- če ste v diabetični predkomi ali komi.
- če so vam odstranili del ali celotno trebušno slinavko.
- če imate hudo okvaro ledvic.
- če imate hudo okvaro jeter.
- če ste noseči (glejte poglavje Nosečnost in dojenje).
- če dojite (glejte poglavje Nosečnost in dojenje).

- če se zdravite z bosentanom (glejte poglavje Jemanje drugih zdravil).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Daonil

Za učinkovito urejanje krvnega sladkorja poleg rednega jemanja zdravila Daonil potrebujete tudi ustrezno dieto in primerno telesno dejavnost. V primeru da se vam poveča telesna teža, je potrebno tudi zmanjšanje le te. Na začetku zdravljenja vas bo zdravnik poučil o prednostih in nevarnostih zdravila Daonil. Poudariti mora pomen rednega jemanja zdravil, spremembe v prehrani, telesne dejavnosti, morda tudi zmanjšanje telesne mase in dobrega sodelovanja z njim.

Med zdravljenjem vam bo zdravnik redno preverjal glukozo v krvi in urinu in po potrebi tudi hemoglobin A_{1c} in/ali fruktozamin ter druge parametre (npr. lipide v krvi).

Hiperglikemija (zvišana koncentracija glukoze v krvi)

Hiperglikemija se lahko pojavi, če se ne boste držali režima zdravljenja, če hipoglikemični učinek zdravila Daonil ni zadosten ali v posebej stresnih situacijah.

Simptomi zvišane koncentracije krvnega sladkorja (hiperglikemija) so huda žeja, suha usta, pogostejše odvajanje vode, srbeča in/ali suha koža, glivične bolezni ali okužbe kože ter oslABLJENA zmogljivost.

Hipoglikemija (nenormalno znižana koncentracija glukoze v krvi)

Tveganje prekomernega znižanja koncentracije krvnega sladkorja je zvečano zlasti če:

- ste starejša oseba
- če bruhate in imate drisko
- jeste premalo, imate neredno prehrano in izpuščate obroke,
- neustrezno uživate ogljikove hidrate in imate neobičajno telesno dejavnost,
- spremenite prehrano,
- uživate alkohol in izpuščate obroke hrane,
- imate okvarjeno delovanje ledvic ali hudo okvaro delovanja jeter,
- če je odmerka zdravila Daonil previsok ali dolgotrajno zdravljenje z neprimerno velikimi odmerki zdravila,
- imate motnje delovanja žlez z notranjim izločanjem, ki vplivajo na presnovo ogljikovih hidratov ali kompenzirajo znižanje koncentracije krvnega sladkorja (npr. ščitnica, hipofiza, nadledvična žleza),
- sočasno jemljete druga zdravila (glejte poglavje Jemanje drugih zdravil).

Zdravnika morate obvestiti o zgoraj navedenih dejavnostih tveganja in o vsakem znižanju koncentracije krvnega sladkorja. V takih primerih je potrebno prilagoditi odmerke in po potrebi tudi celotni režim zdravljenja. To velja tudi, če zbolite ali spremenite življenjske navade.

Opozorilni znaki hipoglikemije so lahko blažji ali se celo ne pojavijo, če se hipoglikemija razvije postopoma, pri starejših, pri bolnikih s prizadetostjo avtonomnega živčevja in pri sočasnem zdravljenju z zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, klonidinom, rezerpinom, gvanetidinom ali drugimi simpatolitiki.

Če ste starejša oseba obstaja tveganje za podaljšano hipoglikemijo in zato vas je potrebno na zdravilu posebej skrbno stabilizirati in med uvodnim obdobjem zdravljenja natančno nadzirati.

Možni simptomi hipoglikemije so na primer:

slabost, bruhanje, huda lakota, tremor (hitro ritmično tresenje mišic, udov in drugih delov telesa), nemir, mravljinčenje v predelu ust, bledica, razdražljivost, motnje koncentracije, zmanjšana reaktivnost, zmedenost, potrtost, glavobol, omotica, šibkost, utrujenost, motnje spanja, neobglenost, delirij (bledež), zaspanost, plitvo dihanje, bradikardija (počasno bitje srca), negotovost pri gibanju ali prehodni znaki nevroloških izpadov, npr. prizadetost vida in govora (afazija), znaki paralize (izguba ali oslabitev mišične moči in aktivne gibljivosti) ali paraliza (boleči dražljaji se občutijo prijetno).

Prisotni so lahko tudi znaki zaradi kompenzacijskih mehanizmov: potenje, hladna in vlažna koža, strah, hiter srčni utrip, zvečan krvni tlak, palpitacije (neprijetni občutki od hitrem ali močnem utripanju srca), angina pectoris (napad hude bolečine v prsnem košu za prsnico, ki pogosto izžareva v levi zgornji ud ali vrat ter je pogosto povezan z občutkom dušenja ali smrtnega strahu, pojavi se ob naporu in razburjenju) in motnje srčnega ritma.

Pri napredujoči hipoglikemiji lahko izgubite samonadzor in zavest. V takšnem primeru boste imeli ponavadi hladno, vlažno kožo in lahko se pojavijo krči. Klinična slika hipoglikemije je lahko podobna apopleksiji (izliv krvi v kak organ). Simptomi hipoglikemije skoraj vedno izginejo, ko se epizoda konča. Tudi če se simptomi na začetku popravijo, se hipoglikemija lahko ponovi.

Hipoglikemija vas na splošno bolj ogroža če ne sodelujete pri zdravljenju ali če imate jasne znake možganske skleroze (bolezensko spremembo na možganih, ki privede do utrditve tkiva).

Hujši hipoglikemiji se lahko izognete, če takoj zaužijete obrok z ogljikovimi hidrati (glukozo ali sladkor v obliki sladkornih kock, sladkanega sadnega soka ali čaja). Vedno imejte pri sebi vsaj 20 g glukoze. V hujših primerih boste potrebovali tudi tujo pomoč. Umetna sladila niso učinkovita za zdravljenje zmanjšane koncentracije krvnega sladkorja.

Zmanjšana koncentracija krvnega sladkorja se po prehodnem izboljšanju lahko ponovi, zato je potrebno daljše opazovanje, v hujših primerih tudi zdravniška pomoč in sprejem v bolnišnico. Zdravnike, ki niso osebni zdravniki (npr. med hospitalizacijo, po nezgodi ali če zboli na počitnicah), morate vedno opozoriti na sladkorno bolezen in zdravila, ki jih jemljete. V stresnih okoliščinah (poškodba, operacija, vročinska stanja) se lahko sladkorna bolezen poslabša in povzroči hiperglikemijo; v takih primerih bo zdravnik začasno uvedel zdravljenje z insulinom.

Pri bolnikih s pomanjkanjem encima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza se lahko pojavi znižanje ravni hemoglobina in povečan razpad rdečih krvnih celic (hemolitična anemija). Zdravnik bo razmislil o uporabi drugih zdravil.

Jemanje drugih zdravil

Prosimo, bodite pozorni, ker se lahko navedbe nanašajo tudi na zdravila, ki ste jih jemali v preteklosti ali jih boste jemali v prihodnosti.

Do neželenega povečanja ali zmanjšanja hipoglikemičnega učinka zdravila Daonil lahko pride, če sočasno jemljete nekatera zdravila. Učinkovitost in tveganje za zmanjšanje koncentracije krvnega sladkorja je zvečano pri istočasnem jemanju drugih peroralnih antidiabetikov, insulina, zaviralcev encima angiotenzin-konvertaza, anabolikov, moških spolnih hormonov, kloramfenikola, kumarinskih derivatov, ciklofosfamida, dizopiramida, fenfluramina, feniramidola, fibratnih hipolipemikov, fluoksetina, gvanetidina, fosfamidov, zaviralcev encima monoaminooksidaza, mikonazola, para-aminosalicilne kisline (PAS), pentoksifilina (veliki parenteralni odmerki), fenilbutazona, azapropazona, oksifenbutazona, probenecida, kinolonov, salicilatov, sulfinpirazona, sulfonamidov, klaritromicina, tetraciklinov, tritokvalina in perheksilina.

Hipoglikemičen učinek zdravila Daonil je zmanjšan pri jemanju acetazolamida, barbituratov, zaviralcev receptorjev beta, kortikosteroidov, diazoksida, saluretikov, adrenalina in drugih simpatomimetikov, glukagona, odvajal, nikotinske kisline, estrogenov in gestagenov, fenotiazinov, fenitoina, rifampicina, izoniazida in ščitničnih hormonov.

Antagonisti receptorjev H_2 , zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, klonidin in rezerpin lahko povečajo ali zmanjšajo učinke glibenklamida na znižanje koncentracije krvnega sladkorja.

Glibenklamid lahko zveča ali zmanjša učinkovitost kumarinskih derivatov (snovi proti strjevanju krvi).

Glibenklamida in bosentana ne smete jemati sočasno, ker sočasna uporaba povzroči povišan nivo jetrnih encimov in zavira izločanje žolčnih soli (glejte poglavje Ne jemljite zdravila Daonil).

Pentamidin lahko v posameznih primerih privede do hude hiperglikemije ali hipoglikemije.

Zdravilo Daonil lahko poveča plazemsko koncentracijo ciklosporina, kar potencialno vodi v povečanje toksičnosti le tega. Pri sočasnem jemanju zdravil, bo zdravnik spremljal in prilagodil odmerek ciklosporina.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila Daonil skupaj s hrano in pijačo

Uživanje alkohola lahko zveča ali zmanjša učinkovitost glibenklamida na zniževanje koncentracije krvnega sladkorja.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Zaradi možnega tveganja za otroka zdravila Daonil med nosečnostjo in dojenjem ne smete uporabljati. Zdravnik vam bo predpisal zdravljenje z insulinom. Če dojite in ne želite jemati insulina, potem morate prenehati z dojenjem. Če želite zanositi oz. če zanosite, morate o tem obvestiti zdravnika, ki vam bo predpisal zdravljenje z insulinom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Psihofizična sposobnost za upravljanje vozil ali strojev je lahko zmanjšana zaradi hipo- ali hiperglikemije, zlasti na začetku zdravljenja, pri spremembah režima zdravljenja, pri nerednem jemanju zdravila Daonil ali neredni prehrani. Zgodi se lahko, da delo na višini (npr. na lestvah, drogoviht. itn.) ni več mogoče ali je mogoče le do neke mere. To še posebej velja, če je zdravilo Daonil uporabljeno skupaj z alkoholom ali zdravili, ki delujejo na osrednje živčevje.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Daonil

Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO DAONIL

Pri jemanju zdravila Daonil natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerkov ne smete spreminjati ali zdravljenja prekinjati, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Prav tako ne smete brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom spreminjati svoje prehrane. Časovni razpored odmerkov določi zdravnik glede na vaše potrebe, oziroma življenske navade.

Zdravilo Daonil morate jemati redno ob predpisanem času in v predpisanih odmerkih. Odmerkov ne smete prekoračiti.

Tablete pogoltnite cele, z zadostno količino tekočine (1/2 do 1 kozarcem). Ne smete jih žvečiti.

Začetni in vzdrževalni odmerek vam bo določil zdravnik glede na vrednosti rednih kontrol glukoze v krvi in urinu. Spremljanje krvnega sladkorja in glukoze v urinu omogoča tudi razpoznavanje primarne in sekundarne odpovedi zdravljenja.

Začetni odmerek: Običajni odmerek na začetku zdravljenja je 1/2 do 1 tableta (kar ustreza od 2,5 mg do 5 mg glibenklamida) na dan. Zdravljenje je priporočljivo začeti z najmanjšim možnim odmerkom. To še posebej velja za vas če ste nagnjeni k hipoglikemiji ali tehtate manj kot 50 kg. V primeru

nezadostne presnovne urejenosti je odmerek treba postopoma povečevati v presledkih od nekaj dni do enega tedna do terapevtskega dnevnega odmerka, ki ne sme preseči 3 tablet zdravila Daonil (kar ustreza 15 mg glibenklamida) na dan.

Vzdrževalni odmerek: Običajni enkratni odmerek je 1 do 2 tableti (kar ustreza 5 do 10 mg glibenklamida). Največji enkratni odmerek je 2 tableti. Večje dnevne odmerke si razdelite na najmanj dva manjša odmerka. Če je dnevna potreba večja od 2 tablet zdravila Daonil, morate 2 tableti vzeti pred zajtrkom oziroma pred prvim glavnim obrokom, preostanek celotnega dnevnega odmerka pa pred večerjo. Nikoli ne smete izpustiti obrok potem, ko ste že vzeli zdravilo. Ne priporočamo več kot 3 tablete na dan; večji dnevni odmerek je le izjemoma bolj učinkovit.

Prilagajanje odmerkov: Včasih (npr. če se zaradi izboljšanja presnovne urejenosti poveča občutljivost za insulin) je potrebno postopoma zmanjšati odmerke ali celo prekiniti zdravljenje z zdravilom Daonil (to še posebej velja če ste starejši). Odmerke je potrebno prilagoditi pri večji spremembi telesne mase, spremembi življenjskih navad ali drugih dejavnikov za zvečano tveganje hipo- ali hiperglikemije (glejte poglavje Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Daonil).

Trajanje zdravljenja: Zdravljenje z zdravilom Daonil je običajno dolgotrajno.

Kombinacije z drugimi zdravili, ki znižujejo krvni sladkor

Ob pojavu sekundarne odpovedi je mogoče poskusiti kombinirano zdravljenje z insulinom. Če endogeno izločanje insulina povsem odpove, je indicirana monoterapija z insulinom. Zdravilo Daonil je mogoče uporabiti tudi v kombinaciji z drugimi peroralnimi antidiabetiki, ki ne sproščajo insulina (metformin, akarboza, gvarska moka (uprašeno seme cijamopsisa)).

Prehod z drugih zdravil, ki znižujejo koncentracijo krvnega sladkorja (hipoglikemiki) na zdravilo Daonil: Ne poznamo natančnega razmerja učinkovitosti glibenklamida in drugih hipoglikemikov. Običajno boste začeli z 1/2 do 1 tableto na dan, ne glede na velikost odmerka hipoglikemika, ki ste ga jemali pred tem. Odmerke zdravila Daonil vam bo zdravnik zvečeval skladno z navodili za začetno odmerjanje. V redkih primerih je potreben časovni razmak med prekinitvijo jemanja drugega hipoglikemika in začetkom jemanja zdravila Daonil, da se izognemo hipoglikemiji zaradi skupnega učinka obeh zdravil.

Uporaba pri mladih odraslih

Ker je sladkorna bolezen tipa 2 pri mladih odraslih redka, se glibenklamid v tej starostni skupini uporablja le v povsem izjemnih primerih. Pri bolnikih, ki tehtajo manj kot 50 kg, se zdravljenje začne z najmanjšim možnim dnevnim odmerkom 2,5 mg glibenklamida. V drugih ozirih je postopek enak kot pri starejših odraslih.

Glibenklamid je neučinkovit kot dodatek insulinu pri sladkorni bolezni tipa 1.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Daonil, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Če ste vzeli prevelik ali dodaten odmerek zdravila Daonil, nemudoma zaužijte glukozo, sladkor ali tekočino, ki vsebuje veliko sladkorja, ter se takoj posvetujte z zdravnikom. Zaradi možnosti dolgotrajne in ponavljajoče se hipoglikemije vas bodo skrbno nadzorovali, dokler ne boste zunaj nevarnosti. Kot previdnostni ukrep vas bodo morda sprejeli v bolnišnico.

V primeru, če vzamete prevelik odmerek zdravila Daonil in padete v nezavest vam bodo injicirali glukozo ali aplicirali glukagon v veno, pod kožo ali v mišico, dokler se znova ne zaveste.

Odmerjanje raztopine glukoze mora biti skrbno, da ne pride do nevarnih hiperglikemičnih napadov, zlasti pri otrocih, ki so zdravilo Daonil zaužili po nesreči; zdravnik jim bo natančno nadzoroval krvni sladkor.

Če ste v komi se lahko hitro razvije hipoglikemični šok; njegovi simptomi so nezavest, tahikardija (hitro utripanje srca), vlažna koža, hipertermija (zvišanje telesne temperature nad normalo), nemir, hiperrefleksija (stanje čezmerne refleksne odzivnosti) in pareza s pozitivnim refleksom Babinskega.

Če ste vzeli smrtno nevarno količino zdravila Daonil, vas je treba razstrupiti z izpiranjem želodca in uporabo aktivnega oglja, če od zaužitja prevelikega odmerka še ni minilo preveč časa. Po injiciranju glukoze vam bodo dali infuzijo z nizko koncentracijo glukoze. Prejemali boste infuzijo dokler ne bodo gotove hipoglikemične epizode in posledično vam bodo še 24 ur spremljali koncentracijo krvnega sladkorja.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Daonil

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Pomembno je, da zdravilo Daonil jemljete ob pravem času. Če ni tako (npr. če ste pozabili vzeti tablete), napake nikakor ne poskušajte popraviti s poznejšim zaužitjem večih tablet. Če ste vzeli zdravilo, ne smete izpustiti obrokov. Z zdravnikom se morata vnaprej dogovoriti za postopek v primeru takšnih napak oz. v primeru, da zdravila ne morete vzeti ob vnaprej določenem času.

Če ste prenehali jemati zdravilo Daonil

Ne prenehajte jemati zdravila Daonil, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Daonil neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo med zdravljenjem z zdravilom Daonil so v nadaljevanju razvrščeni po organskih sistemih. Ocena njihove pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni možna.

Presnovne in prehranske motnje

Med zdravljenjem se lahko pojavi hipoglikemija. Pojavi se lahko zaradi znižanja krvnega sladkorja, ki ga povzroči zdravilo Daonil, v primerih, ko je porušeno ravnoesje med odmerkom zdravila, uživanjem ogljikovih hidratov (dieto), telesno dejavnostjo in drugimi dejavniki, ki vplivajo na presnovo. Hipoglikemija je pri glibenklamidu lahko dolgotrajna in lahko povzroči hudo stanje s smrtno nevarno komo.

V posameznih primerih se lahko pojavi hiponatriemija (znižana koncentracija natrija v krvi).

Očesne bolezni

prehodne motnje vida (zlasti na začetku zdravljenja zaradi spremenjene ravni krvnega sladkorja)

Bolezni prebavil

slabost, bruhanje, riganje, kovinski okus, tiščanje v želodcu, napihnjenost, bolečine v želodcu in driska.

Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov

V posameznih primerih se lahko pojavi vnetje jeter, zvišana raven jetrnih encimov in / ali zastoj žolča in zlatenica, kar pa lahko vodi v smrtno nevarno odpoved jeter.

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

V posamičnih primerih se lahko pojavi blaga do zmerno huda trombocitopenija (znižana koncentracija trombocitov (krvnih ploščic v krvi). Zelo redko pa se pojavi tudi eritrocitopenija (znižana koncentracija rdečih krvničk v krvi), levkopenija (znižana koncentracija belih krvničk v krvi), granulocitopenija (znižana koncentracija določene vrste belih krvničk v krvi), agranulocitoza (pomanjkanje določene vrste belih krvničk), pancitopenija (zmanjšano število vseh krvnih celic) in hemolitična anemija (vrsta slabokrvnosti).

Bolezni kože in podkožja

Pojavijo se lahko preobčutljivostne reakcije na koži (kot so srbenje, kožni izpuščaji, koprivnica, prevelika občutljivost kože na sončno svetlobo). Prehodne preobčutljivostne reakcije na koži se lahko v posameznih primerih razvijejo v hude, smrtno nevarne reakcije z oteženim dihanjem, padcem krvnega tlaka in celo smrtno nevarnim šokom. V takih primerih morate zdravljenje takoj prekiniti in obvestiti zdravnika.

V posameznih primerih se lahko pojavita tudi nevarni alergijski vaskulitis (vnetje krvne ali limfne žile).

Možni so posamezni primeri generaliziranih preobčutljivostnih reakcij z izpuščajem, bolečino v sklepu, zvišano telesno temperaturo, proteinurijo (beljakovine v urinu) in zlatenico.

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Možna je navzkrižna občutljivost za sulfonamide, sulfonamidne derivate in probenecid.

Bolezni sečil

Ugotovljeno je, da ima glibenklamid blag diuretičen učinek.

V primeru neželenih učinkov se posvetujte z zdravnikom; zdravnik bo odločil, ali se zdravljenje z zdravilom Daonil nadaljuje ali ne.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA DAONIL

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini za zaščito pred svetlobo in vlago.

Zdravila Daonil ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnin. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Daonil

- Zdravilna učinkovina je glibenklamid. Ena tableta vsebuje 5 mg glibenklamida.
- Pomožne snovi so: laktoza monohidrat, brezvodni koloidni silicijev dioksid, koruzni škrob, magnezijev stearat, predgelirani koruzni škrob, smukec.

Izgled zdravila Daonil in vsebina pakiranja

Bele, bipolarne, podolgovate tablete z razdelilno zarezo. Tableta se lahko deli na enaki polovici. Na vsaki strani razdelilne zareze je odtisnjen LDI, druga stran tablete pa je brez oznak.

Pakiranje: Škatla s 30 tabletami (3 x 10 ali 2 x 15 tablet v pretisnem omotu).

Način izdajanja zdravila

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec

Sanofi Winthrop Industrie, 56, Route de Choisy-au-Bac, 60205 Compiègne, Francija

Navodilo je bilo odobreno

09.04.2010