

Navodilo za uporabo

Olinapril - H 20 mg/12,5 mg tablete

enalaprilijev maleat / hidroklorotiazid

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Olinapril - H in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Olinapril - H
3. Kako jemati zdravilo Olinapril - H
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Olinapril - H
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Olinapril - H in za kaj ga uporabljamo

Enalapril spada v skupino zdravil, imenovanih zaviralci ACE, ki delujejo tako, da širijo krvne žile in tako srcu olajšajo črpanje krvi po njih. Hidroklorotiazid spada v skupino zdravil, imenovanih diuretiki. Ti pospešujejo izločanje vode z urinom. Količina vode v krvi se tako zmanjša in zato se zmanjša prostornina krvi, ki kroži po telesu.

Enalaprilijev maleat ali hidroklorotiazid, če se ju jemlje posamično, znižujeta visok krvni tlak. Če pa se ju jemlje skupaj, tako kot v tabletah Olinapril - H, se lahko njun učinek še zveča.

Zdravnik vam je Olinapril - H predpisal zato, ker imate bolezen, imenovano hipertenzija ali visok krvni tlak.

Če se zaradi visokega krvnega tlaka ne zdravite – četudi se morda počutite dobro – lahko povzroči okvaro srca in ledvic, v nekaterih primerih pa možgansko kap, srčni infarkt, srčno in/ali ledvično odpoved ali slepoto.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Olinapril - H

Ne jemljite zdravila Olinapril - H

- če ste alergični na zdravilni učinkovini ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za znižanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren.

- če ste alergični na katero koli zdravilo, ki spada v skupino sulfonamidov (vprašajte zdravnika, katera so ta zdravila, če o tem niste prepričani).
- če ste noseči že več kot tri mesece (uporaba zdravila tudi v zgodnjem obdobju nosečnosti ni priporočljiva - glejte poglavje Nosečnost in dojenje).
- če vam zastaja urin.
- če imate hudo okvaro ledvic ali jeter.
- če ste kadar koli doživeli alergijske kožne reakcije z otekanjem obraza in žrela (angioedem), ki so nastale zaradi zdravljenja z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, so bile dednega ali neznanega vzroka.
- če ste vzeli ali trenutno jemljete sakubitril/valsartan, zdravilo, ki se uporablja pri zdravljenju vrste dolgotrajnega (kroničnega) srčnega popuščanja pri odraslih, zaradi povečanega tveganja za angioedem (hitro otekanje pod kožo na predelu, kot je žrelo).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Olinapril - H se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

- Če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
 - antagonist receptorjev angiotenzina II (ta zdravila imenujemo tudi "sartani" – mednje spadajo na primer valsartan, telmisartan in irbesartan), še zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo
 - aliskiren.

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija) v krvi.

Glejte tudi informacije pod naslovom "Ne jemljete zdravila Olinapril - H".

- Če jemljete katero od naslednjih zdravil, se lahko poveča tveganje za angioedem:
 - racekadotril, zdravilo za zdravljenje driske;
 - zdravila za preprečevanje zavrnitve presajenih organov in za zdravljenje raka (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus);
 - vildagliptin, zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni.

Preden začnete jemati zdravilo Olinapril - H, morate z zdravnikom preveriti, tudi:

- če imate težave z ledvicami ali ste na dializi;
- če imate težave z jetri;
- če se zdravite zaradi sladkorne bolezni;
- če imate težave s srcem, ki se imenujejo stenoza aorte, hipertrofijska kardiomiopatija ali obstrukcija iztoka;
- če imate protin (putiko);
- če veste, da bi utegnili imeti velike vrednosti sečne kisline v krvi,
- če jemljete zdravila za odvajanje vode (diuretike);
- če imate hudo bolezen vezivnega tkiva, ki se imenuje sistemski lupus eritematosus;
- če imate ishemično srčno bolezen ali cerebrovaskularno bolezen;
- če imate neravnovesje soli in tekočin;
- če so vam pred kratkim presadili ledvico;
- če ste pred kratkim močno bruhal ali imeli drisko;
- če imate bolezen, ki se imenuje stenoza ledvične arterije (zoženje arterij, ki oskrbuje ledvice s krvjo);
- če ste imeli kožnega raka ali če se vam med zdravljenjem pojavijo nepričakovane kožne spremembe. Zdravljenje s hidroklorotiazidom, še posebej na dolgi rok z velikimi odmerki, lahko poveča tveganje za razvoj nekaterih vrst kožnega raka ali raka ustnice (nemelanomski kožni rak). Med jemanjem zdravila Olinapril - H zaščitite kožo pred izpostavljenostjo soncu in UV-žarkom.

Zdravniku morate povedati, če menite, da da bi lahko bili noseči ali če načrtujete zanositev. Uporaba zdravila Olinapril - H ni priporočljiva v zgodnjem obdobju nosečnosti. Zdravila ne smete jemati, če ste noseči več kot tri mesece, saj lahko zdravilo v tem obdobju resno škoduje vašemu otroku (glejte poglavje Nosečnost in dojenje).

Med jemanjem zdravila Olinapril - H morate upoštevati naslednje:

- Če se zdravite s t. i. aferezo LDL, ko se s pomočjo aparature iz vaše krvi odstranjuje holesterol, morate zdravniku, ki vas zdravi, povedati, da jemljete zdravilo Olinapril - H.
- Pred kakršnim koli kirurškim posegom ali prejemom anestetika (tudi pri zobozdravniku) morate zdravniku ali zobozdravniku povedati, da jemljete zdravilo Olinapril - H.
- Če vas desenzibilizirajo, kar pomeni, da želijo zdravniki zmanjšati vašo preobčutljivost za čebelji ali osji strup, morate zdravniku, ki vas zdravi, povedati, da jemljete zdravilo Olinapril - H.
- Pred ugotavljanjem, ali vaše žleze obščitnice (to so žleze v vratu, ki nadzorujejo vrednost kalcija v krvi) delujejo pravilno, morate zdravniku, ki vas zdravi, povedati, da jemljete zdravilo Olinapril - H.
- Zdravniku morate povedati, če intenzivno bruha in/ali imate drisko.
- Zdravnik bo morda želel pred začetkom zdravljenja z zdravilom Olinapril - H in nato v časovnih presledkih med njim poleg merjenja krvnega tlaka opraviti tudi krvne preiskave in tako preveriti, ali vaše ledvice delujejo pravilno.
- Če imate angino pectoris, bolezensko stanje pa se med jemanjem zdravila Olinapril - H poslabša, morate o tem seznanimi zdravnika.
- Med zdravljenjem z zdravilom Olinapril - H se lahko pojavi kašelj. Značilno je, da je kašelj neproduktiven, trdovraten in po koncu zdravljenja mine.

Visok krvni tlak se lahko zdravi in nadzoruje z zdravili, kakršno je Olinapril - H. Zdravnik vam bo prav tako morda svetoval nekaj sprememb življenjskega sloga, ki bodo prispevale k znižanju krvnega tlaka, na primer hujšanje, pitje le zmerne količine alkohola ali čisto nič, prenehanje kajenja, zmanjšanje vnosa soli s hrano. Zdravnik vas bo morda tudi opogumil za manj naporno telesno vadbo.

Otroci in mladostniki

Uporaba zdravila Olinapril - H ni priporočena za otroke.

Druga zdravila in zdravilo Olinapril - H

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zdravnik vam bo morda moral spremeniti odmere in/ali upoštevati druge previdnostne ukrepe, če jemljete antagonist receptorjev angiotenzina II ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovoma "Ne jemljite zdravila Olinapril - H" in "Opozorila in previdnostni ukrepi").

Če jemljete katero koli od spodaj naštetih zdravil, morate o tem prav tako seznanimi zdravnika:

- zdravila za zdravljenje duševnih motenj, na primer litij ali antipsihotike;
- barbiturate (sedativi, ki se uporabljajo za zdravljenje nespečnosti ali epilepsije);
- zdravila, ki zmanjšujejo mišično napetost (npr. tubokurarin, zdravila za sprostitve mišic pri operacijah);
- narkotike (morfinu podobna zdravila za lajšanje hudih bolečin);
- fenotiazine (zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje duševnih motenj ali za zaviranje bruhanja in slabosti);
- antidiabetična zdravila (zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni), tudi snovi za peroralno uporabo, ki zmanjšujejo vrednost sladkorja v krvi, in inzulin;
- olestiramin aliolestipol, ki se uporabljata za nadzor vrednosti holesterola;

- nesteroidna protivnetna sredstva (NSAID), ki lajšajo bolečine, vnetje in okorelost, povezano z bolečinami, še posebej tistimi, ki vplivajo na mišice, kosti in sklepe;
- presorne amine, na primer efedrin, noradrenalin ali adrenalin za zdravljenje hipotenzije, šoka, srčne odpovedi, astme ali alergij;
- simpatomimetike;
- ACTH za ugotavljanje pravilnega delovanja nadledvične žleze;
- kortikosteroide za zdravljenje različnih bolezni: revme, artritisa, alergijskih reakcij, nekaterih kožnih bolezni, astme ali določenih krvnih motenj;
- alopurinol za zdravljenje protina;
- imunosupresivna sredstva, na primer ciklosporin, za zdravljenje avtoimunskih bolezni, denimo revmatoidnega artritisa, ali po presaditvi organov;
- zdravila za zdravljenje raka;
- antacide, ki se uporabljajo za lajšanje slabe prebave;
- prokainamid, ki se uporablja za zdravljenje nenormalnega srčnega ritma;
- druga zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka;
- prehranska dopolnila s kalijem (vključno z nadomestki soli), diuretiki, ki varčujejo s kalijem, in druga zdravila, ki lahko povečajo količino kalija v krvi (npr. trimetoprim in kotrimoksazol za zdravljenje okužb, ki jih povzročajo bakterije; ciklosporin, imunosupresivno zdravilo za preprečevanje zavrnitve presajenih organov, in heparin, zdravilo, ki se uporablja za redčenje krvi za preprečevanje strdkov);
- zdravila z zlatom, ki se uporabljajo za zdravljenje artritisa (npr. natrijev avrotiomalat);
- zdravila, ki se najpogosteje uporabljajo za preprečevanje zavračanja presajenih organov (sirolimus, everolimus in druga zdravila, ki spadajo v skupino zaviralcev mTOR). Glejte poglavje "Opozorila in previdnostni ukrepi".

Zdravnik bo na podlagi podatkov o jemanju naštetih zdravil zdravljenje po potrebi spremenil.

Zdravilo Olinapril - H skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Če med zdravljenjem z zdravilom Olinapril - H pijete alkoholne pijače, se lahko pojavita omotica in vrtoglavica, še posebej, kadar vstanete. Če se vam to zgodi, morate pitje alkoholnih pijač opustiti.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katero koli zdravilo.

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če ste noseči, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev. Zdravnik vam bo praviloma svetoval, da prekinete z jemanjem zdravila Olinapril - H preden zanosite ali takoj ko izveste, da ste noseči. Zdravnik vam bo praviloma svetoval jemanje drugega zdravila namesto zdravila Olinapril - H.

Jemanje zdravila Olinapril - H ni priporočljivo med nosečnostjo. Zdravila pa ne smete jemati, če ste noseči več kot 3 mesece, saj lahko resno škoduje vašemu otroku, če ga jemljete v tem obdobju.

Če zanosite med zdravljenjem z zdravilom Olinapril - H, takoj obvestite zdravnika.

Dojenje

Obvestite zdravnika, če dojite ali nameravate začeti dojit. Uporaba zdravila Olinapril - H ni priporočljiva za doječe matere. Dojenje novorojenčkov (prvih nekaj tednov po rojstvu), zlasti prezgodaj rojenih, med jemanjem zdravila Olinapril - H ni priporočljivo.

Če je dojenček starejši, vam bo zdravnik razložil koristi in tveganja jemanja zdravila Olinapril - H med dojenjem v primerjavi z drugim zdravljenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Olinapril - H lahko pri nekaterih ljudeh povzroči omotico in utrujenost. Če se pojavita tudi pri vas, se izogibajte dejavnostim, pri katerih je potrebna zbranost, na primer vožnji avta ali delu s stroji.

Zdravilo Olinapril - H vsebuje laktozo.

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

Zdravilo Olinapril - H vsebuje natrij

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na tableto, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

3. Kako jemati zdravilo Olinapril - H

Pri jemanju zdravila Olinapril - H natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odrasli

Tablete pogoltnite. Koliko tablet na dan boste jemali, je odvisno od vašega zdravstvenega stanja. Običajen odmerek je ena tableta, ki se jo vzamejo enkrat na dan. Po potrebi se lahko odmerek zveča na dve tableti, ki se ju prav tako vzame enkrat na dan. Jemati morate toliko tablet, kot vam je predpisal zdravnik, ne več in ne manj.

Če trenutno jemljete tudi druge diuretike (zdravila za odvajanje vode), se pred začetkom jemanja zdravila Olinapril - H posvetujte z zdravnikom.

Bolniki z okvarjenim delovanjem ledvic

Glede na to, kako hudo okvaro delovanja ledvic imate, vam bo zdravnik svetoval primerno odmerjanje zdravila Olinapril - H.

Starejši bolniki

Če vam zdravnik ne predpiše drugače, upoštevajte običajne odmerke za odrasle.

Otroci

Zdravilo Olinapril - H ni primerno za otroke.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Olinapril - H, kot bi smeli

Če ste po pomoti vzeli preveč tablet, se ČIMPREJ posvetujte z zdravnikom.

Najpogostejši znaki prevelikega odmerjanja nastanejo zaradi prevelikega znižanja krvnega tlaka in so lahko omotica, vrtoglavica, omedlevica ali stanje izgube zavesti brez znakov odzivanja na okolje. Pojavi se lahko tudi dehidracija (izsušenost) telesa zaradi zvečanega izločanja urina (značilna znaka sta žeja in glavobol).

Če ste pozabili vzeti zdravilo Olinapril - H

Če ste odmerek zdravila pozabili vzeti, vzemite naslednjega tako, kot ponavadi, vendar to povejte zdravniku. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Olinapril - H neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Ponavadi so blagi in v večini primerov zdravljenja ni treba ustaviti.

Zdravilo morate nemudoma prenehati jemati in takoj poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo hudi kožni izpuščaji ali otekanje rok, ust, grla, obraza ali oči ter težave z dihanjem ali požiranjem. Zelo pomembno je, da zdravilo nemudoma prenehate jemati in obiščite zdravnika, če se pojavita huda omotica ali vrtoglavica (še posebej na začetku zdravljenja ali po zvečanju odmerka ali potem ko vstanete).

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov

- zamegljen vid
- omotica
- kašelj
- slabost (navzea)
- šibkost (astenija)

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov

- zmanjšana koncentracija kalija v krvi, povečane koncentracije holesterola, trigliceridov in sečne kisline v krvi
- glavobol, depresija, omedlevica (sinkopa), sprememba okusa
- nizek krvni tlak, znižanje krvnega tlaka pri vstajanju, neredno bitje srca, bolečina v prsnem košu (angina pectoris), hitro bitje srca
- oteženo dihanje (dispneja)
- driska, bolečina v trebuhu
- izpuščaji
- mišični krči
- bolečina v prsnem košu, utrujenost
- povečana koncentracija kalija v krvi, povečana koncentracija kreatinina v serumu

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

- slabokrvnost (anemija)
- zardevanje, hitro in močno utripanje srca (palpitacije), srčna ali možganska kap, morebiti kot posledica čezmernega znižanja krvnega tlaka pri bolnikih z velikim tveganjem za srčno-žilne zaplete
- šumenje v ušesih (tinitus)
- izcedek iz nosu (rinoreja), vneto grlo in hripavost, astma
- črevesna zapora (ileus), vnetje trebušne slinavke (pankreatitis), bruhanje, prebavne motnje (dispepsija), nabiranje plinov v črevesju (flatulenca), zaprtje, izguba apetita (anoreksija), razdražen želodec, suha usta, razjeda v prebavilih
- okvarjeno delovanje ledvic, ledvična odpoved, beljakovine v seču (proteinurija)
- srbenje, potenje, koprivnica, izpadanje las
- bolečine v sklepih (artralgija)
- tresoč občutek (zaradi majhne koncentracije sladkorja v krvi), majhna koncentracija magnezija v krvi, putika
- impotenca
- neprijetno počutje, zvišana telesna temperatura
- zmedenost, zaspanost, nespečnost, živčnost, vrtoglavica, mravljinčenje ali zbadanje v rokah ali stopalih (parestezije), zmanjšanje spolne sle,
- povečana koncentracija sečnine v serumu, zmanjšana koncentracija natrija v krvi

Redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov

- spremembe v krvni sliki (majhno število nekaterih krvničk, nizke vrednosti hemoglobina in hematokrita), zmanjšano delovanje kostnega mozga, otekle bezgavke, avtoimunske bolezni

- povečana koncentracija glukoze v krvi
- nenavadne sanje, motnje spanja, omrtvelost (pareza)
- slab dotok krvi v prste na rokah in nogah, kar povzroči spremembe barve kože (bledico, modrikavost in rdečino) ter bolečine (Raynaudov sindrom)
- nenormalne spremembe v pljučnem tkivu (pljučni infiltrati), dihalna stiska, vnetje nosne sluznice (rinitis), alergijska vnetja pljuč (alveolitis, eozinofilna pljučnica - znaki so lahko kašelj, zvišana telesna temperatura in težko dihanje)
- vnetje ali razjede v ustih, boleč in otekel jezik
- odpoved jeter, propad jetrnih celic (jetrna nekroza, ki je lahko smrtna), vnetje jeter (hepatitis), vnetje žolčnika (holecistitis), predvsem pri bolnikih z obstoječo holelitiazio, zlatenica
- resne kožne reakcije (multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom, ekfoliativni dermatitis, toksična epidermalna nekroliza, pemfigus, eritroderma), kožni eritematozni lupus, rdečkasto obarvane pike na koži, ki nastanejo zaradi majhnih krvavitev (purpura)
- vnetje ledvic (intersticijski nefritis), zmanjšano izločanje seča
- povečanje prsi pri moških
- povečano delovanje jetrnih encimov ali povečana koncentracija bilirubina v krvi

Zelo redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov

- otekanje črevesne sluznice; znaki lahko vključujejo bolečino v trebuhu, slabost in bruhanje
- povečana koncentracija kalcija v krvi

Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

- sindrom neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona (ki povzroči zmanjšanje koncentracije natrija v krvi), kožni rak in rak ustnice (nemelanomski kožni rak)

Poročali so o kompleksu simptomov, ki ga lahko spremljajo nekateri ali vsi naslednji neželeni učinki: zvišana telesna temperatura, vnetje mren, ki obdajajo nekatere notranje organe (serozne mreže), vnetje žil, bolečine/vnetje mišic, bolečine/vnetje sklepov in spremembe nekaterih laboratorijskih vrednosti (pozitiven titer ANA, zvišana hitrost sedimentacije krvi, eozinofilija in levkocitoza).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Olinapril - H

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datuma izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnem omotu in kartonski škatli poleg oznake »EXP:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Olinapril - H

Zdravilni učinkovini sta enalapriljev maleat in hidroklorotiazid. Ena tableta vsebuje 20 mg enalapriljevega maleata in 12,5 mg hidroklorotiazida.

Druge sestavine zdravila so:

natrijev hidrojenkarbonat, laktoza monohidrat, koruzni škrob, predgelirani škrob, rumeni železov oksid (E172), premreženi natrijev karmeloizat, magnezijev stearat (E470b)

Izgled zdravila Olinapril - H in vsebina pakiranja

Zdravilo Olinapril - H so svetlo rumene, okrogle, ravne tablete brez razdelilne zareze.

Zdravilo je pakirano v:

- škatle z dvema pretisnima omotoma po 10 tablet z 20 mg enalapriljevega maleata in 12,5 mg hidroklorotiazida
- škatle z devetimi pretisnimi omoti po 10 tablet z 20 mg enalapriljevega maleata in 12,5 mg hidroklorotiazida

Način in režim izdaje zdravila Olinapril - H

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija.

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20.09.2019.