

Navodilo za uporabo

Augmentin 500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Augmentin 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

amoksisicilin/klavulanska kislina

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
- Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Augmentin in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Augmentin
3. Kako uporabljati zdravilo Augmentin
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Augmentin
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Augmentin in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Augmentin je antibiotik, ki deluje tako, da ubija bakterije, ki povzročajo okužbe. Vsebuje dve različni učinkovini, ki se imenujeta amoksisicilin in klavulanska kislina. Amoksisicilin spada v skupino zdravil, imenovanih "penicilini", katerih delovanje je lahko včasih onemogočeno (inaktivirano). Druga zdravilna učinkovina (klavulanska kislina) prepreči, da bi se to zgodilo.

Zdravilo Augmentin je indicirano za zdravljenje naslednjih bakterijskih okužb pri odraslih in otrocih:

- hude okužbe ušes, nosu in grla,
- okužbe dihalnih poti,
- okužbe sečil,
- okužbe kože in mehkih tkiv, vključno z okužbami obzobnega tkiva,
- okužbe kosti in sklepov,
- okužbe v trebušni votlini,
- okužbe ženskih spolnih organov.

Zdravilo Augmentin se uporablja za preprečevanje okužb, povezanih z večjimi kirurškimi posegi pri odraslih in otrocih.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Augmentin

Ne uporabljajte zdravila Augmentin:

- če ste alergični na amoksisicilin, klavulansko kislino, penicilin ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če ste imeli kdaj resno alergijsko reakcijo na kakšen drug antibiotik. Ta lahko obsega izpuščaj na koži ali oteklost obraza ali grla;
- če ste imeli kdaj težave z jetri ali zlatenico (porumenelost kože) med jemanjem kakšnega antibiotika.

- ➔ **Ne uporabljajte zdravila Augmentin, če kaj od naštetega velja za vas.** Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro, preden vzamete zdravilo Augmentin.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Posvetujte se z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro, preden uporabite zdravilo Augmentin:

- če imate infekcijsko mononukleozo;
- če se zdravite zaradi težav z jetri ali ledvicami;
- če urina ne odvajate redno.

Če niste prepričani, ali kaj od naštetega velja za vas, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro, preden prejmete zdravilo Augmentin.

V nekaterih primerih bo zdravnik morda opravil preiskave za ugotovitev, katera vrsta bakterije vam povzroča okužbo. Odvisno od rezultatov boste morda dobili drugačno jakost zdravila Augmentin ali drugo zdravilo.

Stanja, na katera morate biti pozorni

Zdravilo Augmentin lahko poslabša nekatera obstoječa stanja oz. bolezni ali povzroči resne neželene učinke. Med takšnimi so alergijske reakcije, konvulzije (napadi krčev) in vnetje debelega črevesa. Da boste zmanjšali tveganje težav, morate biti med uporabo zdravila Augmentin pozorni na določene simptome. Glejte "*Stanja, na katera morate biti pozorni*" v **poglavju 4**.

Preiskave krvi in urina

Če morate opraviti preiskavo krvi (npr. testi stanja rdečih krvnih celic ali testi jetrne funkcije) ali preiskavo urina (za glukozo), morate zdravniku ali medicinski sestri povedati, da prejimate zdravilo Augmentin. Zdravilo Augmentin namreč lahko vpliva na izvide takšnih preiskav.

Druga zdravila in zdravilo Augmentin

Obvestite zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Če obenem z zdravilom Augmentin jemljete alopurinol (uporablja se pri protinu), obstaja večja možnost za alergijsko kožno reakcijo.

Če jemljete probenecid (uporablja se pri protinu), se bo zdravnik morda odločil za prilagoditev odmerka zdravila Augmentin.

Če hkrati z zdravilom Augmentin jemljete zdravila za preprečevanje krvnih strdkov (npr. varfarin), so lahko potrebne dodatne preiskave krvi.

Zdravilo Augmentin lahko vpliva na delovanje metotreksata (to je zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje raka ali revmatskih bolezni).

Zdravilo Augmentin lahko vpliva na delovanje mofetilmikofenolata (zdravila, ki se uporablja za preprečevanje zavrnitve presajenih organov).

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro, preden vzamete to zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Augmentin lahko povzroči neželene učinke in simptomi lahko povzročijo, da niste sposobni upravljati vozil.

Ne vozite in ne upravljajte strojev, če se ne počutite dobro.

Zdravilo Augmentin vsebuje natrij in kalij:

500 mg/100 mg prašek za injiciranje ali infundiranje

- Zdravilo Augmentin 500 mg/100 mg prašek za injiciranje ali infundiranje vsebuje približno 31,4 mg (1,4 mmol) natrija. Če ste na dieti z nadzorovanim vnosom natrija, morate to upoštevati.
- Zdravilo Augmentin 500 mg/100 mg prašek za injiciranje ali infundiranje vsebuje približno 19,6 mg (0,5 mmol) kalija. To morate upoštevati bolniki z obolenjem ledvic ali bolniki na dieti z nadzorovanim vnosom kalija.

1000 mg/200 mg prašek za injiciranje ali infundiranje

- Zdravilo Augmentin 1000 mg/200 mg prašek za injiciranje ali infundiranje vsebuje približno 62,9 mg (2,7 mmol) natrija. Če ste na dieti z nadzorovanim vnosom natrija, morate to upoštevati.
- Zdravilo Augmentin 1000 mg/200 mg prašek za injiciranje ali infundiranje vsebuje približno 39,3 mg (1,0 mmol) kalija. To morate upoštevati bolniki z obolenjem ledvic ali bolniki na dieti z nadzorovanim vnosom kalija.

3. Kako uporabljati zdravilo Augmentin

Tega zdravila si nikdar ne boste dajali sami. Zdravilo vam bo dala strokovno usposobljena oseba, na primer zdravnik ali medicinska sestra.

Priporočeni odmerki so:

Odrasli in otroci, težji od 40 kg

Standardni odmerek	1000 mg/200 mg vsakih 8 ur.
Za zaustavitev okužb med in po operaciji	1000 mg/200 mg pred operacijo sočasno z anestetikom. Odmerek se lahko spreminja v odvisnosti od vrste operacije. Zdravnik lahko odmerek ponovi, če operacija traja več kot 1 uro.

Otroci, lažji od 40 kg

- Vsi odmerki so izračunani na osnovi otrokove telesne mase v kilogramih.

Otroci, stari 3 mesece ali več	25 mg/5 mg na kilogram telesne mase vsakih 8 ur.
Otroci, mlajši od 3 mesecev ali lažji od 4 kg	25 mg/5 mg na kilogram telesne mase vsakih 12 ur.

Bolniki z obolenji ledvic in jeter

- Če imate obolenje ledvic, boste morda dobili drugačen odmerek. Zdravnik bo morda izbral drugo jakost ali drugo zdravilo.
- Če imate obolenje jeter, vas bo zdravnik natančno spremljal in morda boste bolj redno napoteni na kontrolo delovanja jeter.

Način aplikacije zdravila Augmentin

- Zdravilo Augmentin boste dobili v obliki injekcije v veno ali v obliki intravenske infuzije.
- Poskrbite, da boste med zdravljenjem z zdravilom Augmentin zaužili dovolj tekočine.
- Običajno ne boste prejemali zdravila Augmentin dlje kot dva tedna, ne da bi zdravnik ponovno preučil vaše zdravljenje.

Če ste dobili večji odmerek zdravila Augmentin, kot bi smeli

Malo verjetno je, da bi dobili večji odmerek zdravila Augmentin, kot bi smeli. Če mislite, da ste dobili večji odmerek zdravila Augmentin, kot bi smeli, to nemudoma povejte zdravniku, farmacevtu ali medicinski sestri. Znaki so lahko prebavne motnje (siljenje na bruhanje, bruhanje ali driska) ali konvulzije.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Spodaj so naštetih neželeni učinki, ki se lahko pojavijo pri uporabi tega zdravila.

Stanja, na katera morate biti pozorni

Alergijske reakcije:

- izpuščaj na koži,
 - vnetje žil (*vaskulitis*), ki se lahko kaže kot rdeče ali vijolične dvignjene lise na koži, a lahko prizadene tudi katerikoli drug del telesa,
 - zvišana telesna temperatura, bolečine v sklepih, oteklost vratnih, pazdušnih ali dimeljskih bezgavk,
 - oteklost, včasih obraza ali grla (*angioedem*), ki povzroči težave z dihanjem,
 - kolaps.
- ➔ Če se vam pojavi kateri od teh simptomov, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Nehajte jemati zdravilo Augmentin.

Vnetje debelega črevesa

Vnetje debelega črevesa, ki povzroči vodeno drisko, po navadi s krvjo in sluzjo, bolečine v trebuhu in/ali zvišano telesno temperaturo.

- ➔ Če se vam pojavi kateri od teh simptomov, se čim prej posvetujte z zdravnikom.

Pogosti neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri do 1 od 10 oseb.

- kandidiaza – glivična okužba nožnice, ust ali kožnih gub,
- driska.

Občasni neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri do 1 od 100 oseb.

- izpuščaj na koži, srbenje,
- dvignjen, srbeč izpuščaj (*koprivnica*),
- siljenje na bruhanje (navzea), zlasti med jemanjem velikih odmerkov;

➔ Če se vam pojavi, vzemite zdravilo Augmentin pred jedjo.

- bruhanje,
- prebavne motnje,
- omotica,

- glavobol.

Občasni neželeni učinki, ki se lahko pokažejo na preiskavah krvi:

- zvišanje nekaterih snovi (*encimov*), ki jih izdelujejo jetra.

Redki neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri do 1 od 1000 oseb.

- izpuščaj na koži, ki je lahko mehurjast in na pogled podoben majhnim tarčam (temne osrednje pike, obdane z bledim kolobarjem in temnim obročem ob robu – *multiformni eritem*);
➔ Če opazite katerega od teh simptomov, se morate nujno posvetovati z zdravnikom.
- oteklina in rdečica okoli vene, ki je zelo občutljiva na dotik.

Redki neželeni učinki, ki se lahko pokažejo na preiskavah krvi:

- majhno število celic, udeleženih v strjevanju krvi,
- majhno število belih krvnih celic.

Neznana pogostost

Pogostosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov.

- alergijske reakcije (glejte zgoraj),
- vnetje debelega črevesa (glejte zgoraj),
- vnetje možganskih ovojnic (*aseptični meningitis*),
- resne kožne reakcije:
 - razširjen izpuščaj z mehurji in lupljenjem kože, zlasti okrog ust, nosu, oči in spolovil (*Stevens-Johnsonov sindrom*) ter hujša oblika, ki povzroči obsežno lupljenje kože (več kot 30 % telesne površine – *toksična epidermalna nekroliza*);
 - razširjen rdeč izpuščaj na koži z majhnimi gnojnimi mehurčki (*bulozni eksfoliativni dermatitis*);
 - rdeč, luskast izpuščaj z bulami pod kožo in z mehurji (*eksentematozna pustuloza*);
 - gripi podobni simptomi z izpuščajem, povišano telesno temperaturo (vročina), zateklimi bezgavkami in nenormalnimi rezultati preiskave krvi (vključno s povišanim številom belih krvnih teles (eozinofilija) in jetrnih encimov) (*z zdravilom povzročeni kožni izpuščaj z eozinofilijo in sistemskimi simptomi (DRESS)*).

➔ Če se vam pojavi kateri od teh simptomov, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

- vnetje jeter (*hepatitis*),
- zlatenica, ki jo povzroči zvišanje bilirubina (snovi, ki nastaja v jetrih) v krvi. Koža in očesne beločnice zato lahko porumenijo,
- vnetje cevki v ledvicah,
- podaljšan čas strjevanja krvi,
- konvulzije (napadi krčev; pri bolnikih, ki jemljejo velike odmerke zdravila Augmentin ali imajo težave z ledvicami).

Neželeni učinki, ki se lahko pokažejo na preiskavah krvi ali urina:

- hudo zmanjšanje števila belih krvnih celic,
- majhno število rdečih krvnih celic (*hemolitična anemija*),
- kristali v urinu.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (8) 2000 500
Faks: +386 (8) 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si.

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Augmentin

Datum izteka roka uporabnosti zdravila in navodila za shranjevanje na nalepki so informacije za zdravnika, medicinsko sestro ali farmacevta. Zdravilo vam bo pripravil zdravnik, farmacevt ali medicinska sestra. Zdravilo je treba uporabiti v 20 minutah po pripravi.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Augmentin

500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

- Zdravilni učinkovini sta amoksicilin in klavulanska kislina. Ena viala vsebuje 500 mg amoksicilina v obliki natrijevega amoksicilinata, ter 100 mg klavulanske kisline v obliki kalijevega klavulanata.

1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

- Zdravilni učinkovini sta amoksicilin in klavulanska kislina. Ena viala vsebuje 1000 mg amoksicilina v obliki natrijevega amoksicilinata, ter 200 mg klavulanske kisline v obliki kalijevega klavulanata.

Zdravili Augmentin 500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje in Augmentin 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje ne vsebujeta pomožnih snovi. Prosimo, glejte poglavje 2 za nadaljnje informacije o vsebnosti natrija in kalija.

Zdravnik, medicinska sestra ali farmacevt bo pred uporabo pripravil raztopino za injiciranje z ustrezno tekočino (kot je voda za injiciranje ali tekočina za injiciranje/infundiranje).

Izgled zdravila Augmentin in vsebina pakiranja

Augmentin 500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje je na voljo v obliki sterilnega praška za pripravo raztopine za injiciranje ali infundiranje v vialah iz prozornega stekla. Na voljo so pakiranja po 1, 5 ali 10 vial.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Augmentin 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje je na voljo v obliki sterilnega praška za pripravo raztopine za injiciranje ali infundiranje v vialah iz prozornega stekla. Na voljo so pakiranja po 1, 5, 10, 25 ali 100 vial.
Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Imetnik dovoljenja za promet in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

GSK d.o.o., Ljubljana, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Clarendon Road, Worthing, West Sussex, BN14 8QH, Velika Britanija

ali

Biopharma S.r.l., Via delle Gerbere 22/30, 00134 Santa Palomba, Roma, Italija

ali

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irska

Način in režim izdajanja zdravila:

H- Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, uporablja pa se samo v bolnišnicah.

To zdravilo je odobreno v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Ciper – Augmentin

Češka – Augmentin

Francija – Augmentin IV

Nemčija – Augmentan IV

Madžarska – Augmentin

Islandija – Augmentin IV

Irska – Augmentin Intravenous

Malta – Augmentin Intravenous

Nizozemska – Augmentin

Poljska – Augmentin

Slovenija – Augmentin

Velika Britanija - Augmentin Intravenous

1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Belgija – Augmentin

Ciper – Augmentin

Češka – Augmentin

Estonija – Augmentin

Francija – Augmentin IV

Nemčija – Augmentan IV

Grčija – Augmentin

Madžarska - Augmentin

Islandija- Augmentin IV

Irska - Augmentin Intravenous

Italija - Augmentin

Latvija – Augmentin

Luksemburg – Augmentin

Malta – Augmentin Intravenous

Nizozemska – Augmentin

Poljska – Augmentin

Romunija – Augmentin Intravenos
Slovenija – Augmentin
Španija – Augmentine Intravenoso
Velika Britanija – Augmentin Intravenous

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 19. 3. 2019.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Za dodatne informacije glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila.

Aplikacija

Zdravilo Augmentin je mogoče aplicirati bodisi v obliki počasne intravenske injekcije v 3 do 4 minutah neposredno v veno ali preko kapalnega nastavka ali v obliki infuzije tekom 30 do 40 minut. Zdravilo Augmentin ni primerno za intramuskularno aplikacijo.

Priprava

Samo za enkratno uporabo. Neporabljeni raztopino zavržite.
Priprava/razredčenje morata biti opravljena v aseptičnih pogojih. Raztopino je treba pred uporabo pregledati in se prepričati, da ne vsebuje delcev in da ni obarvana. Uporabiti se sme le bistro raztopino brez delcev.

Viale zdravila Augmentin niso primerne za večodmerno uporabo.
Neuporabljeni zdravilo ali odpadni material zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Priprava raztopin za intravensko injiciranje
Običajno topilo je voda za injekcije Ph. Eur.

Med pripravo se lahko pojavi prehodno rožnato obarvanje ali pa tudi ne. Pripravljene raztopine so po navadi brezbarvne do rumene barve.

Zdravilo Augmentin za bolusno injiciranje je treba uporabiti v 20 minutah po pripravi.

500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Zdravilo Augmentin 500 mg/100 mg je treba raztopiti v 10 ml topila. Tako nastane približno 10,5 ml raztopine za uporabo v enkratnem odmerku.

1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Zdravilo Augmentin 1000 mg/200 mg je treba raztopiti v 20 ml topila. Tako nastane približno 20,9 ml raztopine za uporabo v enkratnem odmerku.

Priprava raztopin za intravensko infundiranje

500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Zdravilo Augmentin je treba pripraviti tako, kot je opisano zgoraj za injiciranje. Pripravljeno raztopino je treba brez odlašanja dodati v 50 ml tekočine za infundiranje z uporabo minivrečke ali birete v liniji.

1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Zdravilo Augmentin je treba pripraviti tako, kot je opisano zgoraj za injiciranje. Pripravljeno raztopino je treba brez odlašanja dodati v 100 ml tekočine za infundiranje z uporabo minivrečke ali birete v liniji.

Stabilnost pripravljenih raztopin

Pripravljene vialo (za intravensko injiciranje ali pred razredčenjem za infundiranje)

500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Pripravljeno raztopino (1 viala z 10 ml vode za injekcije) je treba uporabiti ali razredčiti takoj, v 20 minutah.

1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Pripravljeno raztopino (1 viala z 20 ml vode za injekcije) je treba uporabiti ali razredčiti takoj, v 20 minutah.

Razredčenje za intravensko infundiranje

500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Kemična in fizikalna stabilnost med uporabo sta dokazani za 2-3 ure pri temperaturi 25 °C in za 8 ur pri temperaturi do 5 °C. Z mikrobiološkega stališča je treba pripravljeno in razredčeno raztopino (1 pripravljena viala z najmanj 50 ml tekočine za infundiranje) uporabiti takoj.

1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Kemična in fizikalna stabilnost med uporabo sta dokazani za 2-3 ure pri temperaturi 25 °C in za 8 ur pri temperaturi do 5 °C. Z mikrobiološkega stališča je treba pripravljeno in razredčeno raztopino (1 pripravljena viala z najmanj 100 ml tekočine za infundiranje) uporabiti takoj.

500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje, 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Intravenske infuzije amoksisicilin-klavulanata je mogoče dati v številnih različnih intravenskih tekočinah. Zadovoljiva koncentracija antibiotika se ohrani pri 5 °C in pri sobni temperaturi (25 °C) v priporočenih količinah naslednjih infuzijskih tekočin. Če so pripravljene in hranjene pri sobni temperaturi (25 °C), je treba infundiranje dokončati v časih, navedenih v spodnji preglednici.

<u>Intravenska infuzija</u>	<u>Čas stabilnosti pri 25 °C</u>
Voda za injekcije Ph.Eur.	3 ure
0,9 % m/v raztopina natrijevega klorida za intravensko infundiranje (9 mg/ml)	3 ure
Sestavljena raztopina natrijevega klorida za injiciranje 1959 (Ringerjeva raztopina)	2 uri
Sestavljena raztopina natrijevega laktata za intravensko infundiranje (Ringerjev-laktat: Hartmann)	2 uri
0,3 % m/v raztopina kalijevega klorida in 0,9 % m/v raztopina natrijevega klorida za intravensko infundiranje (3 mg/ml in 9 mg/ml)	2 uri

Za shranjevanje pri 5 °C je mogoče pripravljene raztopine zdravila Augmentin dodati predohlajenim infuzijskim vrečkam, v katerih je voda za injekcije Ph. Eur. ali natrijev klorid BP (0,9 % m/v), ki jih je mogoče shranjevati do 8 ur. Infuzijo je treba dati takoj, ko doseže sobno temperaturo.

Stabilnost raztopin zdravila Augmentin je odvisna od koncentracije. Če je potrebna uporaba bolj koncentriranih raztopin, je treba obdobje stabilnosti ustrezno korigirati.

Zdravilo Augmentin je manj stabilno v infuzijah, ki vsebujejo glukozo, dekstran ali bikarbonat. Pripravljene raztopine zdravila Augmentin je mogoče injicirati v kapalne infuzije v trajanju 3 do 4 minut. Neporabljeno raztopino antibiotika je treba zavreči.