

GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE

Glicerol

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

- Kaj je zdravilo Glicerinske svečke za odrasle in za kaj ga uporabljamo
- Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Glicerinske svečke za odrasle
- Kako uporabljati zdravilo Glicerinske svečke za odrasle
- Možni neželeni učinki
- Shranjevanje zdravila Glicerinske svečke za odrasle
- Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Glicerinske svečke za odrasle vsebuje glicerol, ki deluje odvajalno. Glicerol nase veže vodo, zaradi česar povečuje vsebnost vode v blatu in ga na ta način mehča. Poveča drsljivost in lajša njegovo odvajanje. Rahlo draži tudi sluznico danke, kar dodatno sproži refleks odvajanja. Odvajalni učinek nastopi hitro, običajno v 20–30 minutah, lahko pa šele po 90 minutah.

Zdravilo Glicerinske svečke za odrasle uporabljamo:

- pri kratkotrajnem zaprtju, ki je npr. posledica spremembe okolja ali načina prehranjevanja;
- pri stanjih, ko je potrebno neboleče odvajanje mehkega blata (npr. pri hemoroidih, razjedah okrog zadnjične odprtine, po kirurških posegih);
- za čiščenje črevesa pred posegi in preiskavami.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE

Ne uporabljajte zdravila Glicerinske svečke za odrasle:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) glicerol ali katero koli drugo sestavino tega zdravila (navedena v poglavju 6),
- v primeru zapore črevesja ali če imate težave v predelu trebuha, ki so neznanega izvora in jih še ni obravnaval zdravnik.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Če za odvajanje blata potrebujete odvajala vsakodnevno, je treba raziskati vzrok nastanka zaprtja.

Dolgotrajnemu, kroničnemu jemanju odvajal se je treba izogibati.

To zdravilo ni za uživanje!

Otroci

Glicerinske svečke za odrasle niso namenjene za uporabo pri otrocih, mlajših od 6 let. Svetujemo, da pri otrocih, mlajših od 6 let, uporabite Glicerinske svečke za otroke.

Druga zdravila in zdravilo Glicerinske svečke za odrasle

Ni podatkov o vplivu zdravila Glicerinske svečke za odrasle na druga zdravila.

Sočasno s tem zdravilom ne uporabljajte drugih zdravil v obliki svečk, saj zaradi odvajalnega učinka Glicerinskih svečk za odrasle drugo zdravilo ne bo imelo predvidenega učinka.

Zdravilo Glicerinske svečke za odrasle skupaj s hrano

Ni podatkov, da bi hrana ali pijača vplivala na učinkovitost tega zdravila. Glicerinske svečke za odrasle lahko uporabljate ne glede na obroke hrane.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite to zdravilo.

Glicerinske svečke za odrasle lahko uporabljajo nosečnice in doječe matere.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Glicerinske svečke za odrasle vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Način uporabe in odmerjanje

Odrasli in otroci, starejši od 6 let:

Običajni odmerek sta 1 do 2 svečki dnevno.

Ob zaprtju vstavite 1 svečko v danko (rektum).

Če odvajalni učinek ne nastopi v roku 1 ure po vstavitvi svečke, lahko vstavite še 1 svečko v danko.

Svečko iz dvojnega traku odstranite tako, da dvojni trak pretrgate po zarezi na spodnji (zašiljeni) strani, izluščite svečko in jo vstavite globoko v danko s konico naprej, kjer jo zadržite vsaj 15 minut.

Opozorilo: uporabljena svečka se običajno izloči nerazpadla, skupaj z blatom.

Zdravilo Glicerinske svečke za odrasle je namenjeno izključno za uporabo v danki in ga ne zaužijte!

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Glicerinske svečke za odrasle, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Glicerinske svečke za odrasle, kot bi smeli in če se po prevelikem odmerku pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje tega zdravila lahko povzroči močnejše draženje sluznice danke in drisko.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Glicerinske svečke za odrasle

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pri uporabi tega zdravila se lahko pojavijo alergijske ali preobčutljivostne reakcije na sluznici v analnem predelu, ki se kažejo kot rahel pekoč občutek. Pogostnost pojavljanja neželenih učinkov ni znana.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli od neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

- Tel.: 08 2000 500
- Faks: 08 2000 510
- E-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
- Spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte na suhem mestu pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte zaščiteno pred svetlobo v originalni ovojnini.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in dvojnem traku poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Glicerinske svečke za odrasle

Zdravilna učinkovina je glicerol.
1 svečka vsebuje 1,9 g glicerola (Glycerolum).

Pomožne snovi so stearinska kislina, natrijev karbonat (E500) in prečiščena voda.

Izgled zdravila in vsebina pakiranja

Svečke so prozorne do belkaste barve, valjaste oblike, zašiljene na enem koncu.

Pakiranje: škatla vsebuje 10 svečk (2 dvojna trakova s po 5 svečkami) v vrečki.

Način in režim izdaje zdravila Glicerinske svečke za odrasle

Izdelek Glicerinske svečke za odrasle je galensko zdravilo.

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Lekarne Maribor
Minařikova ulica 6
2000 Maribor



Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na proizvajalca: Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor.

- Tel.: 02 450 28 00
- E-pošta: info@mb-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano:
junij 2024