

B. NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Eleber 60 mg koncentrat in vehikel za raztopino za infundiranje kabazitaksel

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, s farmacevtom ali z medicinsko sestro.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom, s farmacevtom ali z medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Eleber in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Eleber
3. Kako uporabljati zdravilo Eleber
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Eleber
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Eleber in za kaj ga uporabljamo

Vaše zdravilo se imenuje Eleber. Njegovo splošno ime je kabazitaksel. Zdravilo Eleber spada v skupino zdravil, imenovanih "taksani", ki se uporabljajo za zdravljenje raka.

Zdravilo Eleber se uporablja za zdravljenje raka prostate, ki je napredoval po kemoterapiji z drugimi zdravili. Deluje tako, da prepreči rast in razmnoževanje celic.

Kot del zdravljenja boste vsak dan zaužili tudi kortikosteroidno zdravilo (prednizon ali prednizolon). Za informacije o tem drugem zdravilu se obrnite na svojega zdravnika.

2. Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Eleber

Ne uporabljajte zdravila Eleber:

- če ste alergični na kabazitaksel, druge taksane, polisorbit 80 ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če imate premalo belih krvnih celic (število nevtrofilcev manj kot ali enako $1.500/\text{mm}^3$),
- če imate hude motnje delovanja jeter,
- ste pred kratkim prejeli ali boste prejeli cepivo proti rumeni mrzlici.

Če kaj od navedenega velja za vas, ne smete dobiti zdravila Eleber. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, preden dobite zdravilo Eleber.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred vsakim zdravljenjem z zdravilom Eleber boste morali opraviti preiskave krvi, s katerimi bo zdravnik preveril, ali imate dovolj krvnih celic ter zadostno delovanje jeter in ledvic, da lahko dobite zdravilo Eleber.

Zdravniku morate nemudoma povedati:

- če imate zvišano telesno temperaturo. Med zdravljenjem z zdravilom Eleber je verjetneje, da se vam število belih krvnih celic zmanjša. Zdravnik vam bo kontroliral kri in splošno stanje glede

znakov okužbe. Morda vam bo dal druga zdravila za ohranitev števila krvnih celic. Osebam z majhnim številom krvnih celic se lahko pojavijo smrtno nevarne okužbe. Najzgodnejši znak okužbe je lahko zvišana telesna temperatura; če se vam pojavi, morate o tem takoj obvestiti zdravnika.

- če ste kdaj imeli kakšne alergije. Med zdravljenjem z zdravilom Eleber se lahko pojavijo resne alergijske reakcije.
- če imate hudo ali dolgotrajno drisko, čutite slabost v želodcu ali bruhanje. Vse to lahko povzroči hudo dehidracijo. Zdravnik vas bo morda moral zdraviti.
- če imate občutek omrtvičenosti, mravljinčenja, pekoč občutek ali zmanjšan občutek v vaših rokah in nogah.
- imate krvavitev iz črevesa ali spremenjeno barvo blata ali bolečine v želodcu. Če so krvavitve ali bolečine hude, bo zdravnik končal vaše zdravljenje z zdravilom Eleber. Zdravilo Eleber namreč lahko poveča tveganje za krvavitve ali za nastanek predrtja (luknje) v steni črevesa.
- če imate težave z ledvicami.
- če se vam pojavi rumeno obarvanje kože in oči, temno obarvanje urina, huda navzea (slabost) ali bruhanje, ker je to lahko znak težav z jetri.
- če opazite kakršnokoli pomembno povečanje ali zmanjšanje dnevnega volumna urina.
- če imate kri v urinu.

Če kaj od naštetega velja za vas, morate o tem nemudoma obvestiti svojega zdravnika. Zdravnik vam lahko zmanjša odmerek zdravila Eleber ali konča zdravljenje.

Druga zdravila in zdravilo Eleber

Obvestite svojega zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerikoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. Nekatera zdravila namreč lahko vplivajo na delovanje zdravila Eleber in zdravilo Eleber lahko vpliva na delovanje drugih zdravil. Med takšnimi zdravili so:

- ketokonazol, rifampicin (za okužbe),
- karbamazepin, fenobarbital ali fenitoin (za napade krčev),
- šentjanževka (*Hypericum perforatum*) (zeliščno zdravilo proti depresiji in drugim stanjem),
- statini (kot so simvastatin, lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin ali pravastatin) (za zniževanje ravni holesterola v vaši krvi),
- valsartan (za povišan krvni tlak),
- repaglinid (za sladkorno bolezen).

Med zdravljenjem z zdravilom Eleber se pred kakršnimkoli cepljenjem posvetujte s svojim zdravnikom.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Zdravilo Eleber ni indicirano za uporabo pri ženskah.

Če je vaša partnerka noseča ali bi lahko zanosila, med spolnimi odnosi uporabljajte kondom. Zdravilo Eleber se namreč lahko pojavi v semenu in lahko vpliva na plod. Priporočljivo je, da med zdravljenjem in še 4 mesece po zdravljenju ne zaplodite otroka. Priporočljivo je tudi, da se pred zdravljenjem posvetujete o shranitvi semen, kajti zdravilo Eleber lahko vpliva na plodnost moškega.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Med zdravljenjem s tem zdravilom se vam lahko pojavi utrujenost ali omotica. Če se vam to zgodi, ne upravljajte vozil, strojev ali orodij, dokler se ne počutite bolje.

Zdravilo Eleber vsebuje etanol (alkohol)

Zdravilo vsebuje 542,4 mg alkohola (etanola) v viali vehikla. Količina v odmerku tega zdravila ustreza manj kot 10 ml piva ali 4 ml vina.

Majhna količina alkohola v zdravilu ne bo imela nobenih opaznih učinkov.

3. Kako uporabljati zdravilo Eleber

Navodila za uporabo

Preden boste dobili zdravilo Eleber, boste dobili zdravila proti alergiji za zmanjšanje tveganja alergijskih reakcij.

- Zdravilo Eleber vam bo dal zdravnik ali medicinska sestra.
- Zdravilo Eleber je treba pred dajanjem pripraviti (redčiti). To navodilo vključuje praktične informacije za ravnanje z zdravilom Eleber in za njegovo dajanje, namenjene zdravnikom, medicinskim sestram in farmacevtom.
- Zdravilo Eleber boste dobili v kapalni infuziji v eno od ven (intravensko); dobili ga boste v bolnišnici, infuzija pa bo trajala približno eno uro.
- Kot del zdravljenja boste vsak dan zaužili tudi kortikosteroidno zdravilo (prednizon ali prednizolon).

Koliko zdravila boste dobili in kako pogosto

- Običajen odmerek je odvisen od telesne površine. Zdravnik bo izračunal vašo telesno površino v kvadratnih metrih (m²) in glede nanjo določil odmerek, ki ga morate dobiti.
- običajno se infuzija daje enkrat na 3 tedne.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Zdravnik se bo o tem z vami pogovoril in vam bo pojasnil možna tveganja in koristi vašega zdravljenja.

Nemudoma obiščite zdravnika, če opazite katerega od naslednjih neželenih učinkov:

- zvišano telesno temperaturo (vročino). Ta je pogosta (pojavlja se lahko pri največ 1 od 10 ljudi).
- hudo izgubo telesnih tekočin (dehidracijo). Ta je pogosta (pojavlja se lahko pri največ 1 od 10 ljudi). Pojavlja se lahko, če imate hudo ali dolgotrajno drisko, zvišano telesno temperaturo ali če bruha.
- hude bolečine v trebuhu ali bolečine v trebuhu, ki ne minejo. To se lahko pojavi, če imate predrtje v želodcu, požiralniku ali črevesu (gastrointestinalna perforacija). To lahko povzroči smrt.

Če kaj od naštetega velja za vas, morate o tem nemudoma obvestiti svojega zdravnika.

Med drugimi neželenimi učinki so:

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 ljudi):

- zmanjšanje števila rdečih krvnih celic (anemija) ali belih krvnih celic (ki so pomembne pri premagovanju okužb)
- zmanjšano število krvnih ploščic (kar se odraža kot povečano tveganje krvavitev)
- izguba apetita (neješčnost)
- prebavne težave, vključno s slabostjo v želodcu, bruhanjem, drisko ali zaprtjem
-
- bolečine v hrbtu
- kri v urinu
- utrujenost, šibkost ali pomanjkanje energije.

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 ljudi):

- spremenjeno okušanje
- kratka sapa
- kašelj
- bolečine v trebuhu
- kratkotrajna izguba las in dlak (večinoma se njihova normalna rast obnovi)
- bolečine v sklepih
- okužba sečil
- pomanjkanje belih krvnih celic, povezano z zvišano telesno temperaturo in okužbo
- občutek omrtnosti, mravljinčenja, pekoč občutek ali zmanjšano zaznavanje v dlaneh in stopalih
- omotica
- glavobol
- znižanje ali zvišanje krvnega tlaka
- nelagodje v želodcu, zgaga ali spahovanje
- bolečine v trebuhu
- hemoroidi
- mišični spazem
- boleče ali pogosto uriniranje
- inkontinenca urina
- bolezen ledvic ali težave z ledvicami
- razjeda v ustih ali na ustnicah
- okužbe ali tveganje okužb
- visok sladkor v krvi
- nespečnost
- duševna zmedenost
- občutek tesnobe
- nenormalni občutki ali izguba zaznavanja ali bolečine v dlaneh in stopalih
- težave z ravnotežjem
- hitro ali neredno bitje srca
- krvni strdek v nogi ali v pljučih
- zardevanje
- bolečine v ustih ali žrelu
- krvavitev iz danke
- nelagodje, občutljivost, šibkost ali bolečina mišic
- otekanje stopal ali nog
- mrzlica
- bolezninohta (sprememba barve nohta; nohti lahko odstopajo).

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 ljudi):

- nizek kalij v krvi
- zvonjenje v ušesih
- občutek vroče kože
- pordelost kože
- vnetje sečnega mehurja, ki se lahko pojavi, če je bil mehur kdaj izpostavljen obsevalnemu zdravljenju (cistitis zaradi pojava pomnjenja obsevanja).

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- intersticijska bolezen pljuč (vnetje pljuč, ki povzroča kašljanje in težave z dihanjem).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom ali z medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročati tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Eleber

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na zunanji ovojnini in na nalepki vial poleg oznake EXP. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Informacije o shranjevanju in roku uporabe zdravila Eleber, ko je že redčeno in pripravljeno za uporabo, so navedene v poglavju "PRAKTIČNE INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE O PRIPRAVI, UPORABI IN RAVNANJU Z ZDRAVILOM Eleber".

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Eleber

Učinkovina je kabazitaksel. En mililiter koncentrata vsebuje 40 mg kabazitaksela. Ena viala koncentrata vsebuje 60 mg kabazitaksela.

Pomožne snovi so polisorbit 80 in citronska kislina v koncentratu ter 96 % etanol in voda za injekcije v vehiklu (glejte poglavje 2 »Zdravilo Eleber vsebuje alkohol«).

Opomba: Obe viali, viala s koncentratom Eleber 60 mg/1,5 ml (polnilni volumen: 73,2 mg kabazitaksela/1,83 ml) in viala z vehiklom (polnilni volumen: 5,67 ml), vsebujeta presežek za nadomestitev izgube tekočine med pripravo. Po redčenju s **CELOTNO** količino priloženega vehikla ta presežek zagotavlja, da raztopina vsebuje 10 mg/ml kabazitaksela.

Izgled zdravila Eleber in vsebina pakiranja

Zdravilo Eleber sestavljata koncentrat in vehikel za raztopino za infundiranje (sterilen koncentrat).

Koncentrat je bistra, brezbarvna do bledorumena gosto tekoča raztopina. Vehikel je bistra in brezbarvna raztopina.

Eno pakiranje zdravila Eleber vsebuje:

- Ena viala iz bistrega stekla, zaprta s sivim zamaškom iz »fluorotech« klorobutilne gume, zapečatenim z aluminijasto zaporko (»flip-off«), ki vsebuje 1,5 ml (nominalni

volumen) koncentrata.

- Ena viala iz bistrega stekla, zaprta s sivim zamaškom iz »fluorotech« klorobutilne gume, zapečatenim z aluminijasto zaporko (»flip-off«), ki vsebuje 4,5 ml (nominalni volumen) vehikla.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila

H - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.

Imetnik dovoljenja za promet

Zentiva, k.s.,
U kabelovny 130,
Dolní Měcholupy,
102 37 Prague 10,
Česka

Proizvajalec

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA3000,
Malta

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Ime države članice	Ime zdravila
Bolgarija	Елебер 60 mg концентрат и разтворител за инфузионен разтвор
Česka	Eleber
Estonija	Eleber
Hrvaška	Eleber 60 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju
Islandija	Eleber
Latvija	Eleber 60 mg koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai
Litva	Eleber 60 mg koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui
Madžarska	Eleber 60 MG KONCENTRÁTUM ÉS OLDÓSZER OLDATOS
Poljska	Eleber
Romunija	Eleber 60 mg koncentrat și solvent pentru soluție perfuzabilă
Slovaška	Eleber 60 mg koncentrát a rozpúšťadlo na
Slovenija	Eleber 60 mg koncentrat in vehikel za raztopino

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 14.11.2023.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju.

PRAKTIČNE INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE O PRIPRAVI, UPORABI IN RAVNANJU Z ZDRAVILOM Eleber 60 mg KONCENTRAT IN VEHIKEL ZA RAZTOPINO ZA INFUNDIRANJE

Te informacije dopolnjujejo poglavji 3 in 5 navodila za uporabo.
Pomembno je, da pred pripravo raztopine za infundiranje preberete celotni opis tega postopka.

Inkompatibilnosti

Zdravila se ne sme mešati z drugimi zdravili razen s tistimi, ki se uporabljajo za redčenje.

Rok uporabnosti in posebna navodila za shranjevanje

Škatla zdravila Eleber s koncentratom in vehiklom:

Za shranjevanje zdravila niso potrebni posebni temperaturni pogoji.

Po odprtju

Viali koncentrata in vehikla je treba uporabiti nemudoma. Če nista uporabljeni takoj, so čas in pogoji shranjevanja odgovornost uporabnika. Z mikrobiološkega stališča je treba dvostopenjski postopek redčenja opraviti v kontroliranih in aseptičnih pogojih (glejte "Previdnostni ukrepi za pripravo in uporabo", spodaj).

Po začetnem redčenju koncentrata Eleber 60 mg s **celotno** vsebino vial z vehiklom:

Kemična in fizikalna stabilnost med uporabo sta dokazano 30 minut pri sobni temperaturi.

Po končnem redčenju v vrečki/steklenici za infundiranje

Kemična in fizikalna stabilnost raztopine za infundiranje sta dokazano 8 ur pri sobni temperaturi (15 °C – 30 °C), vključno z 1-urnim časom infundiranja, in 48 ur v hladilniku, vključno z 1-urnim časom infundiranja.

Z mikrobiološkega stališča je treba raztopino za infundiranje uporabiti takoj. Če ni uporabljena takoj, je za čas in pogoje shranjevanja do uporabe odgovoren uporabnik. Shranjevanje običajno ne sme biti daljše od 24 ur pri temperaturi od 2 °C do 8 °C, razen če se redčenje izvaja v kontroliranih in validiranih aseptičnih pogojih.

Previdnostni ukrepi za pripravo in uporabo

Tako kot velja za druga zdravila proti raku, je tudi pri pripravi raztopin zdravila Eleber in ravnanju z njimi potrebna previdnost; uporabiti je treba pripomočke za zadrževanje, osebno zaščitno opremo (npr. rokavice) in upoštevati je treba postopke priprave.

Če pride zdravilo Eleber v katerikoli fazi ravnanja z njim v stik s kožo, je treba kožo takoj in temeljito umiti z milom in vodo. Če pride v stik s sluznico, jo je treba nemudoma in temeljito umiti z vodo.

Zdravilo Eleber sme pripravljati in dajati le osebje, usposobljeno za ravnanje s citotoksičnimi zdravili. Noseče članice osebja ne smejo ravnati z njim.

Preden koncentrat za raztopino za infundiranje dodate raztopinam za infundiranje, ga morate vedno redčiti s **celotno količino** priloženega vehiklom.

Koraki za pripravo

Pred mešanjem in redčenjem zdravila skrbno in **V CELOTI** preberite to poglavje. Zdravilo Eleber morate pred uporabo redčiti **V DVEH KORAKIH**. Upoštevajte spodnja navodila za pripravo.


Opomba: Obe viali, viala s koncentratom Eleber 60 mg/1,5 ml (polnilni volumen: 73,2 mg kabazitaksela/1,83 ml) in viala z vehiklom (polnilni volumen: 5,67 ml), vsebujeta presežek za nadomestitev izgube tekočine med pripravo. Po redčenju s **CELOTNO** količino spremljajočega vehikla ta presežek zagotavlja, da raztopina vsebuje 10 mg/ml kabazitaksela.

Za pripravo raztopine za infundiranje je treba naslednji dvostopenjski postopek redčenja opraviti aseptično.

Korak 1: Začetno redčenje koncentrata za raztopino za infundiranje s priloženim vehiklom.

Korak 1.1

Preglejte vialo koncentrata in priloženi vehikel.
Raztopina v viali s koncentratom in vehikel morata biti bistra.




Viala s koncentratom
(60 mg – 1,5 ml)

Viala z vehiklom

Korak 1.2

Uporabite brizgo z nameščeno iglo in aseptično izvlecite **celotno** količino priloženega vehikla iz viala tako, da vialo delno obrnete.




Viala z vehiklom

Korak 1.3

Injicirajte celotno vsebino v ustrezno vialo s koncentratom.

Da bo med brizganjem vehikla čim manj penjenja, usmerite iglo v notranjo steno viala z raztopino koncentrata in injicirajte počasi.

Po pripravi nastala raztopina vsebuje 10 mg/ml kabazitaksela.




10 mg/ml mešanica
koncentrata in vehikla

Viala z
vehiklom

Korak 1.4

Odstranite brizgo in iglo in previdno ročno premešajte tako, da vialo večkrat obrnete, dokler ne dobite bistre in homogene raztopine. To lahko traja približno 45 sekund



10 mg/ml mešanica
koncentrata in vehikla

Korak 1.5

To raztopino pustite, naj stoji približno 5 minut, nato preverite, da je homogena in bistra.

Normalno je, da pena ostane tudi še po tem času..



10 mg/ml mešanica
koncentrata in vehikla

Nastala mešanica koncentrata in vehikla vsebuje 10 mg/ml kabazitaksela (vsaj 6 ml uporabne količine). Naslednje redčenje je treba opraviti takoj (v teku 1 ure), kot je podrobno opisano v koraku 2.


Za dajanje predpisane odmerka je lahko potrebna več kot ena viala mešanice koncentrata in vehikla.

Korak 2: Drugo (končno) redčenje za infuzijo

Korak 2.1

Z graduirano brizgo, ki ima nameščeno iglo, aseptično izvlecite potrebno količino mešanice koncentrata in vehikla (10 mg/ml kabazitaksela). Primer: odmerek 45 mg zdravila Eleber bi zahteval 4,5 ml mešanice koncentrata in vehikla, pripravljene v koraku 1.

Ker je lahko po pripravi, opisani v koraku 1, na steni viala z raztopino prisotna pena, je bolje, da pri izvleku namestite iglo brizge na sredino.




10 mg/ml mešanica
koncentrata in vehikla

Korak 2.2

Injicirajte v sterilni vsebnik brez PVC, v katerem je 5 % raztopina glukoze ali 0,9 % raztopina natrijevega klorida za infundiranje.

Koncentracija raztopine za infundiranje mora biti med 0,10 mg/ml in 0,26 mg/ml.




Zahtevana količina
mešanice koncentrata in
vehikla

5% raztopina glukoze
ali 0,9 % raztopina
natrijevega klorida za
infundiranje

Korak 2.3

Odstranite brizgo in vsebino vrečke ali steklenice za infundiranje ročno premešajte z obračanjem sem in tja.



Korak 2.4

Tako kot vsa zdravila za parenteralno uporabo je treba nastalo raztopino za infundiranje pred uporabo pregledati. Ker je raztopina za infundiranje prenasočena, lahko sčasoma kristalizira. V takšnem primeru raztopine ne smete uporabiti, ampak jo morate zavreči.



Raztopino za infundiranje je treba uporabiti takoj. Vendar pa je lahko čas shranjevanja med uporabo daljši v specifičnih pogojih, omenjenih v poglavju **Rok uporabnosti in posebna navodila za shranjevanje**, zgoraj.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Način uporabe

Zdravilo Eleber se daje v 1-urni infuziji.

Infuzijo je priporočljivo dati po infuzijski liniji, ki ima filter z nominalno velikostjo por 0,22 mikrometrov (nanaša se tudi na 0,2 mikrometrov).

Infuzijskih vsebnikov iz PVC ali kompletov za infundiranje iz poliuretana se ne sme uporabljati za pripravo in dajanje raztopine za infundiranje.