

Navodilo za uporabo

Meropenem Sandoz 500 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje Meropenem Sandoz 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

meropenem

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Meropenem Sandoz in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Meropenem Sandoz
3. Kako uporabljati zdravilo Meropenem Sandoz
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Meropenem Sandoz
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Meropenem Sandoz in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Meropenem Sandoz spada v skupino zdravil, imenovanih karbapenemski antibiotiki. Deluje tako, da uničuje bakterije, ki lahko povzročijo hude okužbe.

- okužba pljuč (pljučnica)
- okužbe pljuč in bronhusov pri bolnikih s cistično fibrozo
- zapletene okužbe sečil
- zapletene okužbe v trebuhu
- okužbe, ki se lahko pojavijo med porodom ali po njem
- zapletene okužbe kože in mehkih tkiv
- akutna bakterijska okužba možganov (meningitis)

Zdravilo Meropenem Sandoz se lahko uporablja za zdravljenje nevtropeničnih bolnikov z zvišano telesno temperaturo, če obstaja sum, da je vzrok zvišane temperature bakterijska okužba.

Zdravilo Meropenem Sandoz se lahko uporablja za zdravljenje bakterijske okužbe krvi, ki je lahko povezana z zgoraj omenjenimi tipi okužbe.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Meropenem Sandoz

Ne uporabljajte zdravila Meropenem Sandoz, če:

- ste alergični na meropenem ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6)
- ste alergični na druge antibiotike kot so penicilini, cefalosporini ali karbapenemi, ker ste lahko v tem primeru alergični tudi na meropenem

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe antibiotikov se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro, če:

- imate kakšne zdravstvene težave, npr. z jetri ali ledvicami
- ste kdaj imeli hudo drisko po jemanju drugih antibiotikov

Pojavi se vam lahko pozitiven izvid določene preiskave (Coombsov test), ki kaže na prisotnost protiteles, ki lahko uničujejo rdeče krvne celice. Zdravnik se bo o tem pogovoril z vami.

Če niste prepričani, ali kaj od naštetega velja za vas, se pred uporabo zdravila Meropenem Sandoz posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

Druga zdravila in zdravilo Meropenem Sandoz

Obvestite zdravnika, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zdravilo Meropenem Sandoz lahko namreč vpliva na delovanje nekaterih zdravil in nekatera zdravila lahko vplivajo na zdravilo Meropenem Sandoz.

Še zlasti morate zdravniku ali medicinski sestri povedati, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- probenecid (uporablja se za zdravljenje protina)
- valprojsko kislino/natrijev valproat/valpromid (uporablja se za zdravljenje epilepsije). Zdravila Meropenem Sandoz se ne sme uporabljati, ker lahko zmanjša učinek natrijevega valproata.
- peroralno antikoagulantno sredstvo (uporablja se za zdravljenje ali preprečevanje krvnih strdkov)

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Zdravnik bo odločil, ali zdravilo Meropenem Sandoz smete prejeti.

Pomembno je, da zdravniku poveste, če dojite ali če nameravate dojit, preden prejmete meropenem.

Manjša količina tega zdravila lahko preide v materino mleko. Zato bo zdravnik odločil, ali smete uporabljati meropenem med dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Študije o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso bile izvedene. Vendar pa je treba upoštevati, da se uporabo meropenema povezuje z glavoboli, občutkom mravljinčenja ali zbadanja na koži (parestezije) in nehotenimi gibi mišic, zaradi česar se telo začne hitro in nenadzorovano tresti (konvulzije), kar običajno spremlja izguba zavesti in lahko vpliva na sposobnost vožnje ali upravljanje strojev.

Zdravilo Meropenem Sandoz vsebuje natrij

Meropenem Sandoz 500 mg: Zdravilo vsebuje približno 45 mg natrija na 500-mg odmerek. To je treba upoštevati pri bolnikih, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

Meropenem 1000 mg: Zdravilo vsebuje približno 90 mg natrija na 1000-mg odmerek. To je treba upoštevati pri bolnikih, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

Zdravniku, farmacevtu ali medicinski sestri morate povedati, če imate kakšno motnjo, zaradi katere potrebujete nadzorovan vnos natrija.

3. Kako uporabljati zdravilo Meropenem Sandoz

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika, farmacevta ali medicinske sestre.

Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.

Uporaba pri odraslih

- Odmerek je odvisen od vrste okužbe, ki je pri vas prisotna, kje v telesu je okužba in kako resna je. Zdravnik bo odločil, kolikšen odmerek potrebujete.

- Odmerek za odrasle je običajno od 500 mg (miligramov) do 2 g (grama). Običajno boste odmerek dobivali vsakih 8 ur. Kljub temu, lahko ob neustreznem delovanju ledvic, odmerek prejmete manj pogosto.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

- Odmerek za otroke v starosti od 3 mesecev do 12 let se določi glede na starost in otrokovo telesno maso. Običajni odmerek je med 10 in 40 mg zdravila Meropenem Sandoz na kilogram (kg) otrokove telesne mase. Odmerek se ponavadi daje vsakih 8 ur. Otroci, ki tehtajo več kot 50 kg, bodo prejeli odmerek za odrasle.

Kako boste prejeli zdravilo Meropenem Sandoz

- Zdravilo Meropenem Sandoz boste dobili z injekcijo ali infuzijo v eno od velikih ven.
- Običajno vam bo zdravilo Meropenem Sandoz dal zdravnik ali medicinska sestra.
- Nekateri bolniki, starši in negovalci so usposobljeni za dajanje zdravila Meropenem Sandoz doma. Navodila za dajanje zdravila doma so navedena v tem navodilu za uporabo (v poglavju z naslovom "Navodila za dajanje zdravila Meropenem Sandoz sebi ali komu drugemu doma"). Pri uporabi zdravila Meropenem Sandoz natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.
- Raztopine za injiciranje ne smete mešati z ali dodajati k raztopinam, ki vsebujejo druga zdravila.
- Injiciranje lahko traja okrog 5 minut ali od 15 do 30 minut. Zdravnik vam bo povedal, kako dajati zdravilo Meropenem Sandoz.
- Praviloma morate injekcije dobiti vsak dan ob istem času.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Meropenem Sandoz, kot bi smeli

Če pomotoma uporabite odmerek, večji od predpisanega, se takoj posvetujte z zdravnikom ali najbližjo bolnišnico.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Meropenem Sandoz

Če izpustite injekcijo, jo morate dobiti čim prej. Če pa je že skoraj čas za naslednjo injekcijo, preskočite izpuščeno injekcijo.

Ne vzemite dvojnega odmerka (dveh injekcij hkrati), če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Meropenem Sandoz

Ne prenehajte uporabljati zdravila Meropenem Sandoz, dokler vam tega ne določi zdravnik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Hude alergijske reakcije

Če imate hudo alergijsko reakcijo, **prenehajte uporabljati zdravilo Meropenem Sandoz in nemudoma obiščite zdravnika**. Morda potrebujete nujno zdravniško pomoč. Znaki, ki se lahko pojavijo nenadno, so:

- hud izpuščaj, srbenje ali koprivnica na koži
- otekanje obraza, ustnic, jezika ali drugih delov telesa
- kratka sapa, piskajoče dihanje ali težko dihanje.

Okvara rdečih krvnih celic (neznana pogostnost)

Znaki vključujejo:

- pojav zadihanosti, kadar je ne pričakujete
- rdeč ali rjav urin

Če opazite kaj od naštetega, **nemudoma obiščite zdravnika**.

Drugi možni neželeni učinki:

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- bolečine v trebuhu (želodcu)
- slabost (siljenje na bruhanje)
- bruhanje
- driska
- glavobol
- izpuščaj na koži, srbeča koža
- bolečine in vnetje
- zvečano število trombocitov v krvi (pokaže se na preiskavi krvi)
- spremenjeni izvidi preiskav krvi, vključno s preiskavami delovanja jeter

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- spremembe krvi. To vključuje zmanjšanje števila krvnih ploščic (zaradi česar se pri vas lahko poveča nagnjenost k modricam), zvečanje števila nekaterih belih krvnih celic, zmanjšanje števila drugih belih krvnih celic in povišano vrednost snovi, imenovane "bilirubin". Zdravnik vam bo morda občasno opravil preiskave krvi
- spremembe v izvidih preiskav krvi, vključno s preiskavami delovanja ledvic
- mravljinčenje
- glivične okužbe ust ali nožnice
- vnetje črevesja z drisko
- vnetje ven, v katere je injicirano zdravilo Meropenem Sandoz
- druge spremembe krvi. Simptomi lahko vključujejo pogoste okužbe, visoko telesno temperaturo in vnetje žrela. Zdravnik vam bo morda občasno opravil preiskave krvi
- nenaden pojav hudega izpuščaja, mehurjev na koži ali luščenja kože. Spremljajo jih lahko zvišana telesna temperatura in bolečine v sklepih.

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov)

- epileptični krči (konvulzije)

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti)

- Resna preobčutljivostna reakcija, ki vključuje zvišano telesno temperaturo, kožni izpuščaj in spremembe rezultatov testov delovanja jeter (zvišane ravni jetrnih encimov) in zvišanje števila določenih belih krvnih celic (eozinofilija) ter povečanje bezgavk. To so lahko znaki motnje preobčutljivosti več organov, znane kot DRESS sindrom.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana; Tel: +386 (0)8 2000 500, Faks: +386 (0)8 2000 510, e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Meropenem Sandoz

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na vsebniku poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Intravenska injekcija

Po pripravi: Pripravljeno raztopino za intravensko injiciranje je treba uporabiti takoj.

Čas od začetka priprave do konca intravenskega injiciranja ne sme biti daljši od 3 ur, če je zdravilo shranjeno pri temperaturi do 25 °C.

Intravenska infuzija

Po pripravi: Pripravljeno raztopino za intravensko infundiranje je treba uporabiti takoj. Čas od začetka priprave do konca intravenskega infundiranja ne sme biti daljši od:

- 3 ur med shranjevanjem pri temperaturi do 25 °C, če je zdravilo Meropenem Sandoz raztopljeno v 0,9% raztopini natrijevega klorida,
- 12 ur med shranjevanjem pri temperaturi od 2 - 8 °C, če je zdravilo Meropenem Sandoz raztopljeno v 0,9% raztopini natrijevega klorida.
- če je zdravilo Meropenem Sandoz raztopljeno v 5% raztopini glukoze (dekstroze), je treba pripravljeno raztopino uporabiti takoj.

Iz mikrobiološkega vidika je potrebno zdravilo uporabiti takoj, razen v primeru, če način odpiranja /priprave/redčenja izključuje nevarnost mikrobiološkega onesnaženja.

Če ni uporabljeno takoj, je za čas in pogoje shranjevanja pred uporabo odgovoren uporabnik.

Pripravljene raztopine ne zamrzujte.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Meropenem Sandoz

- Učinkovina je meropenem.
Ena viala vsebuje meropenem trihidrat, ki ustreza 500 mg brezvodnega meropenema.
Ena viala vsebuje meropenem trihidrat, ki ustreza 1000 mg brezvodnega meropenema.
- Druga sestavina zdravila je brezvodni natrijev karbonat.

Izgled zdravila Meropenem Sandoz in vsebina pakiranja

Meropenem je bel do svetlo rumen prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje v viali z gumijastim zamaškom in modro (pri 500 mg) ali rdečo (pri 1000 mg) aluminijasto-plastično zaporko. Zdravilo je na voljo v pakiranjih z 1 ali 10 vialami.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila

H – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Sandoz farmacevtska družba d.d.
Verovškova 57
1000 Ljubljana
Slovenija

Izdelovalec

Lek farmacevtska družba d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana

To zdravilo je odobreno v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija	Meropenem Sandoz GmbH 500 mg - Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung Meropenem Sandoz GmbH 1000 mg - Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung
Belgija	Meropenem Sandoz 500 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie Meropenem Sandoz 1g poeder voor oplossing voor injectie/infusie
Bolgarija	Меноинфекс 1000 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор Menoinfex 1000 mg powder for solution for injection/infusion
Danska	Meropenem Hexal
Finska	Meropenem Hexal 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten Meropenem Hexal 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Grčija	Meropenem/Sandoz
Hrvaška	Meropenem Sandoz
Italija	Meropenem Sandoz
Nemčija	Meropenem HEXAL® 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung Meropenem HEXAL® 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung
Norveška	Meropenem Hexal 500 mg pulver til infusjons- og injeksjonsvæske, oppløsning Meropenem Hexal 1 g pulver til infusjons- og injeksjonsvæske, oppløsning
Poljska	Meropenem Sandoz GmbH
Slovenija	Meropenem Sandoz 500 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje Meropenem Sandoz 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
Švedska	Meropenem Hexal 500 mg, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Meropenem Hexal 1 g, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Velika Britanija	Meropenem 500 mg powder for solution for injection/infusion Meropenem 1000 mg powder for solution for injection/infusion

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

26.3.2018

Nasvet/zdravstvena vzgoja

Antibiotiki se uporabljajo za zdravljenje okužb, ki jih povzročajo bakterije. Nobenega učinka nimajo proti okužbam, ki jih povzročajo virusi.

Včasih se okužba, ki jo povzročajo bakterije, ne odzove na zdravljenje z antibiotikom. Eden najpogostejših razlogov za to je odpornost bakterij, ki povzročajo okužbo, proti uporabljenemu antibiotiku. To pomeni, da lahko bakterije kljub antibiotiku preživijo in se celo razmnožujejo.

Bakterije lahko postanejo odporne proti antibiotikom zaradi številnih razlogov. Skrbna uporaba antibiotikov lahko pomaga zmanjšati možnost, da bi bakterije postale odporne proti njim.

Ko vam zdravnik predpiše antibiotik, je ta namenjen le za zdravljenje vaše trenutne bolezni.

Upoštevanje naslednjih nasvetov bo pomagalo preprečiti pojav odpornosti bakterij, ki lahko onemogočijo delovanje antibiotika.

1. Zelo pomembno je, da antibiotik jemljete v pravem odmerku, ob pravem času in pravo število dni. Preberite navodila na lekarniški signaturi in če česa ne razumete, prosite zdravnika ali farmacevta za pojasnilo.

2. Antibiotika ne smete jemati, če ni bil predpisan posebej za vas. Antibiotik morate uporabiti le za zdravljenje okužbe, za katero je bil predpisan.

3. Ne jemljite antibiotikov, ki so bili predpisani drugim, tudi če so imeli okužbo, podobno vaši.

4. Antibiotikov, ki so bili predpisani vam, ne smete dajati drugim.

5. Če vam potem, ko ste dokončali zdravljenje z antibiotikom, tako kot vam je naročil zdravnik, ostane kaj antibiotika, morate preostanek vrniti v lekarno za ustrezno odstranitev.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Navodila za dajanje zdravila Meropenem Sandoz sebi ali komu drugemu doma

Nekateri bolniki, starši in negovalci so usposobljeni za dajanje zdravila Meropenem Sandoz doma.

Opozorilo – To zdravilo smete doma dati sebi ali komu drugemu šele, ko vas je tega naučil zdravnik ali medicinska sestra.

Kako pripraviti to zdravilo

- Zdravilo je treba zmešati z drugo tekočino (topilom). Zdravnik vam bo povedal, koliko topila uporabiti.
- Zdravilo morate uporabiti, takoj ko ga pripravite. Ne zamrzujte.

1. Umijte si roke in jih dobro osušite. Pripravite čisto delovno površino.
2. Vzemite stekleničko (vialo) zdravila Meropenem Sandoz iz pakiranja. Preverite vialo in rok uporabnosti. Preverite ali je viala nedotaknjena in nepoškodovana.
3. Odstranite barvno zaporko in očistite sivi gumijasti zamašek z alkoholnim zložencem. Pustite, da se gumijasti zamašek posuši.
4. Na novo sterilno brizgo namestite novo sterilno iglo, ne da bi se dotaknili koncev.
5. V brizgo potegnite priporočeno količino sterilne "vode za injekcije". Količino potrebne tekočine prikazuje spodnja preglednica:

Odmerek zdravila Meropenem Sandoz	Količina "vode za injekcije", potrebna za redčenje
500 mg (miligramov)	10 ml (mililitrov)
1000 mg	20 ml
1,5 g (grama)	30 ml
2 g	40 ml

Opomba: Če je vaš predpisani odmerek zdravila Meropenem Sandoz večji od 1000 mg, boste morali uporabiti več kot 1 vialo zdravila Meropenem Sandoz. Potem lahko potegnete tekočino iz vial v eno brizgo.

6. Zabodite iglo brizge skozi sredino sivega gumijastega zamaška in vbrizgajte priporočeno količino vode za injekcije v vialo ali vialo zdravila Meropenem Sandoz.
7. Potegnite iglo iz vialo in vialo dobro stresajte približno 5 sekund ali dokler se ves prašek v celoti ne raztopi. Sivi gumijasti zamašek še enkrat očistite z novim alkoholnim zložencem in pustite, da se gumijasti zamašek posuši.
8. Z batom brizge potisnjenim do konca v brizgo, iglo znova zabodite skozi sivi gumijasti zamašek. Nato primite brizgo in vialo ter vialo obrnite na glavo.
9. Bat potegnite nazaj in izvlecite vso tekočino iz vialo v brizgo tako, da konica igle ostane v tekočini.
10. Iz vialo odstranite iglo in brizgo ter prazno vialo zavržite na varno mesto.
11. Držite brizgo pokonci tako, da je igla obrnjena navzgor. Potrkajte po brizgi, da se mehurčki, ki so morda prisotni v tekočini, dvignejo na vrh brizge.
12. Odstranite morebitni zrak v brizgi tako, da rahlo potiskate bat, dokler ne iztisnete vsega zraka.
13. Če zdravilo Meropenem Sandoz uporabljate doma, morate ustrezno zavreči vse uporabljene igle in infuzijske cevke. Če se zdravnik odloči za prenehanje vašega zdravljenja, morate neuporabljeno zdravilo Meropenem Sandoz ustrezno zavreči.

Dajanje injekcije

Zdravilo lahko date po kratki kanili ali venflonu ali skozi nastavek ali centralni kanal.

Dajanje zdravila Meropenem Sandoz po kratki kanili ali venflonu

1. Odstranite iglo z brizge in iglo previdno odvrzite v vsebnik za ostre odpadke.
2. Obrišite konec kratke kanile ali venflona z alkoholnim zložencem in pustite, da se posuši. Odprite zaporko na kanili in namestite brizgo.
3. Počasi potiskajte bat brizge, da boste antibiotik enakomerno dajali približno 5 minut.
4. Ko končate z dajanjem antibiotika in je brizga prazna, brizgo odstranite in opravite izpiranje, kot vam je naročil zdravnik ali medicinska sestra.
5. Zaprite zaporko kanile in brizgo previdno odvrzite v vsebnik za ostre odpadke.

Dajanje zdravila Meropenem Sandoz skozi nastavek ali centralni kanal

1. Odstranite zaporko nastavka ali kanala, očistite konec kanala z alkoholnim zložencem in pustite, da se posuši.
2. Namestite brizgo in počasi potiskajte bat brizge, da boste antibiotik enakomerno dajali približno 5 minut.
3. Ko končate z dajanjem antibiotika, brizgo odstranite in opravite izpiranje, kot vam je naročil zdravnik ali medicinska sestra
4. Na centralni kanal namestite novo, čisto zaporko in brizgo previdno odvrzite v vsebnik za ostre odpadke.