

NAVODILO ZA UPORABO

PRAVASTATIN PLIVA 20 mg tablete

PRAVASTATIN PLIVA 40 mg tablete

pravastatinum

Pred uporabo natančno preberite to navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano za vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo PRAVASTATIN PLIVA in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo PRAVASTATIN PLIVA
3. Kako jemati zdravilo PRAVASTATIN PLIVA
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
6. Dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Pravastatin Pliva in za kaj ga uporabljamo

Tablete zdravila Pravastatin Pliva so namenjene zdravljenju koronarne srčne bolezni in hiperlipidemije (prevelikih količin holesterola in maščob v krvi).

Aktivna učinkovina v zdravilu Pravastatin Pliva je pravastatin. Pravastatin zavira delovanje encima, ki je pomemben za sintezo holesterola v telesu. Na ta način zniža količino maščob in holesterola v krvi in zmanjša možnosti za nastanek bolezni srca in žilja. Pri že obstoječem srčnožilnem obolenju upočasni proces ateroskleroze in zmanjša verjetnost za nastanek različnih zapletov kot sta srčni infarkt in možganska kap.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Pravastatin Pliva

Opozorite zdravnika, če imate kakšno kronično bolezen, presnovno motnjo, če ste preobčutljivi na sestavine zdravila ali če jemljete kakšna druga zdravila.

Ne jemljite zdravila Pravastatin Pliva

- če ste alergični (preobčutljivi) na pravastatin ali katerikoli sestavino zdravila Pravastatin Pliva ali
- če imate kakršnokoli aktivno bolezen jeter
- če ste noseči ali dojite.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Pravastatin Pliva

Zdravnika morate obvestiti, če imate katero od srčnožilnih obolenj ali motnje v delovanju jeter ali ledvic, če imate bolečine v mišicah. Zdravnik bo v teh primerih ustrezno ukrepal.

Če imate hude težave z dihanjem, se pred uporabo zdravila Pravastatin Pliva posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Jemanje drugih zdravil

Če jemljete katerokoli od naštetih zdravil, se posvetujte z zdravnikom:

- zdravila za zniževanje količine maščob in holesterola v krvi
- zdravila, ki vplivajo na imunski sistem (ciklosporin)

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila Pravastatin Pliva skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo lahko jemljete na tešče ali med jedjo.

Nosečnost in dojenje

Zdravnika obvestite, če ste noseči ali nosečnost načrtujete.

Zdravilo Pravastatin Pliva med nosečnostjo odsvetujemo. Če med zdravljenjem zanosite, takoj prenehajte jemati zdravilo Pravastatin Pliva in se posvetujte z zdravnikom.

Doječim materam zdravilo Pravastatin Pliva odsvetujemo. O nadaljnjem zdravljenju se posvetujte z zdravnikom.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni podatkov, da bi zdravilo Pravastatin Pliva vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Pravastatin Pliva

Zdravilo vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Pravastatin Pliva

Pri jemanju zdravila Pravastatin Pliva natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerkov ne smete spreminjati ali zdravljenja prekinjati, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

Odmerjanje in način uporabe

Svetujemo Vam, da se med zdravljenjem z zdravilom Pravastatin Pliva držite predpisane diete za zmanjšanje količine maščob in holesterola v krvi.

Zdravljenje s Pravastatinom Pliva je dolgotrajno. Priporočeni odmerki so od 10 mg do 40 mg dnevno. Pravastatin Pliva lahko vzamete s hrano ali na tešče. Priporočamo Vam, da vzamete zdravilo zvečer, vsak dan ob isti uri.

Zdravnik Vam lahko po potrebi zviša odmerek in Vam prilagodi način jemanja zdravila.

Uporaba pri otrocih

Varnost in učinkovitost uporabe zdravila pri otrocih nista dokazani. Zdravila zato ne dajajte otrokom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Pravastatin Pliva, kot bi smeli

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila Vam svetujemo, da se posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Pravastatin Pliva

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste pozabili vzeti zdravilo, vzemite naslednji odmerek kot ponavadi.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Pravastatin Pliva neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zdravilo Pravastatin Pliva bolniki običajno dobro prenašajo. Možni neželeni učinki so bolečine v kosteh, sklepih in mišicah, izpuščaji, glavobol, bolečine za prsnico, prebavne motnje in utrujenost, zlatenica, kožne spremembe. Začasno se lahko spremenijo vrednosti nekaterih krvnih preiskav.

V redkih primerih se lahko pojavijo bolečine v mišicah in oslABLjenost mišic. V takem primeru Vam svetujemo, da prenehate jemati zdravilo in se posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom.

Pri nekaterih statinih so poročali o naslednjih neželenih učinkih: motnje spanja, vključno z nespečnostjo in nočnimi morami, izguba spomina, motnje spolnosti, depresija in težave z dihanjem, vključno z vztrajnim kašljem in/ali zasoplostjo ali vročino.

Če se pri Vas pojavi alergijska reakcija na zdravilo, se kaže kot zatekanje obraza, ustnic, grla in jezika. To lahko povzroči težave pri dihanju ali požiranju. V takem primeru takoj prenehajte jemati zdravilo in obiščite zdravnika.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM!

Zdravila Pravastatin Pliva ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnicini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Shranjujte v originalni ovojnicini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Pravastatin Pliva

Zdravilna učinkovina je pravastatin.

Pomožne snovi so: laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, premreženi natrijev karmelozat (E468), železovi oksidi (E172), natrijev lavrilsulfat, povidon K30, smukec, brezvoden koloidni silicijev dioksid, natrijev stearilfumarat.

Izgled zdravila Pravastatin Pliva in vsebina pakiranja

Vsebnost oziroma sestava pakiranja

Tableta vsebuje 20 mg ali 40 mg natrijevega pravastatinata.

V zloženkah je 30 tablet po 20 mg ali 40 mg.

Pravastatin tablete 20 mg:

Tablete Pravastatin Pliva 20 mg so rumene, okrogle, bikonveksne tablete z zaobljenimi robovi in vtisnjeno oznako 20.

Škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pravastatin tablete 40 mg:

Tablete Pravastatin Pliva 40 mg so rumene, okrogle, bikonveksne tablete z zaobljenimi robovi in vtisnjeno oznako 40.

Škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Način in režim izdaje zdravila Pravastatin Pliva

Rp- Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

PLIVA LJUBLJANA d. o. o.

Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

Izdelovalec:

Galex d.d.

Tišinska 29g, Murska Sobota, Slovenija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

PLIVA LJUBLJANA d. o. o.
Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
tel.: 01/58 90 390
e-pošta: info@pliva.si

Datum zadnje revizije navodila
15.6.2011