

Pervivo

peroralna/oralna/dermalna raztopina

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila svojega zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7-14 dneh, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Pervivo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Pervivo
3. Kako jemati zdravilo Pervivo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Pervivo
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Pervivo in za kaj ga uporabljamo

Pervivo je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora. Namenjeno je naslednjim področjem uporabe:

- peroralna uporaba (zaužitje):
 - pri blagih prebavnih motnjah, na primer občutku polnosti, napenjanju, slabosti, pomanjkanju apetita,
 - za povečanje izločanja žolča, na primer po zaužitju premastne hrane;
- oralna uporaba (v ustih): pri blagih vnetjih v ustni votlini;
- zunanja uporaba:
 - pri pikih insektov,
 - za masažo pri blagih bolečinah v mišicah in sklepkih.

Navedena področja uporabe temeljijo izključno na dolgotrajnih izkušnjah.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7-14 dneh, se posvetujte s svojim zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Pervivo

Ne jemljite zdravila Pervivo

- če ste alergični na zdravilne učinkovine ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- pri resnih okvarah jetrne, želodčne in žolčne funkcije: nenadne bolezenske spremembe v trebuhu, navadno z močnimi bolečinami (akutni abdomen), vnetna črevesna obolenja, sveže kirurške spojitve med posameznimi deli črevesja (anastomoze v črevesju), izrazita ali popolna zapora črevesja (ileus), želodčna razjeda (ulkusna bolezen),
- pri božjasti (epilepsiji), alkoholizmu ali pri možganskih poškodbah,
- če imate bronhialno astmo (zaradi vsebnosti kafe v zdravilu Pervivo),
- če imate kožne bolezni ali poškodovano kožo.

Zdravilo vsebuje etanol (alkohol), zato ni primerno za otroke.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pogosta zunanja uporaba lahko povzroča suho kožo in draženje.

Druga zdravila in zdravilo Pervivo

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili ni znano. Zdravilo Pervivo vsebuje 40 vol. odstotkov etanola (alkohola), ki lahko spremeni ali stopnjuje učinek drugih zdravil.

Zdravilo Pervivo skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo lahko jemljete neodvisno od obrokov hrane.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da ste noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Zaradi vsebovanega etanola (alkohola) je uporaba zdravila Pervivo v nosečnosti in pri dojenju prepovedana. Zdravilo vsebuje 40 vol. odstotkov etanola. Zaradi neželenih učinkov etanola (alkohola) preberite opozorila v razdelku *Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Pervivo*.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zaradi vsebovanega etanola (alkohola) so pri jemanju zdravila Pervivo reakcije pri upravljanju z vozili in stroji lahko upočasnjene.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Pervivo

Zdravilo Pervivo vsebuje 40 vol. % etanola (alkohola), to je do 1578 mg na odmerek, kar ustreza 40 ml piva oziroma 17 ml vina na odmerek. Škodljivo je za tiste, ki trpijo za alkoholizmom. Na vsebnost etanola (alkohola) morajo biti pozorne nosečnice in doječe matere, otroci in skupine z velikim tveganjem, kot so bolniki z jetrnimi obolenji ali epilepsijo. Vsebovani etanol lahko zmanjša zbranost v prometu in zmožnost upravljanja s stroji.

Zdravilo Pervivo vsebuje invertni sladkor (mešanico glukoze in fruktoze). Vsak odmerek vsebuje največ 5 mg glukoze. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Pervivo

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila svojega zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočen odmerek je:

- peroralna uporaba (zaužitje): odrasli vzemite dva- do trikrat dnevno 1 čajno žličko (5 ml) nerazredčeno ali razredčeno s približno 1 decilitrom vode ali zeliščnega čaja, neodvisno od obroka hrane;
- oralna uporaba (v ustih): odrasli trikrat dnevno razredčite 3 čajne žličke raztopine v približno 1 decilitru vode in grgrajte;
- zunanja uporaba: odrasli večkrat dnevno raztopino rahlo vtrite v kožo.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Uporaba pri otrocih in mladostnikih ni priporočljiva.

Če vam zdravnik ni predpisal drugače, jemljite zdravilo glede na potrebo poljubno dolgo. Omejitev glede trajanja uporabe zdravila ni znana.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Pervivo, kot bi smeli

Če se po prevelikem odmerku pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom. Če ste zaužili velike količine zdravila, lahko pride do zastrupitve z etanolom (alkoholom). V tem primeru morate nemudoma poiskati zdravniško pomoč.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Pervivo

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Pozabljeni odmerek vzemite takoj, ko bo mogoče. Če je že skoraj čas za naslednji odmerek, pozabljeni odmerek izpuscite in nadaljujte zdravljenje po predpisani shemi.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V redkih primerih se lahko pojavi pekoč občutek v področju zgornjega trebuha (žličke). Zaužitje previsokega odmerka zdravila lahko vodi v slabost, bruhanje, drisko in glavobol. Pri alergiji na katero od vsebovanih sestavin se lahko pojavi alergijska reakcija. Pri pogosti uporabi se lahko pojavi draženje in suha koža.

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

5. Shranjevanje zdravila Pervivo

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C, na temnem mestu. Zdravila ne uporabljajte, če je bil varnostni mehanizem zaporka pred prvim odpiranjem odlomljen.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in steklenici. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Pervivo

Zdravilne učinkovine:

1000 ml vsebuje tekoči ekstrakt mešanice naslednjih rastlinskih drog:

Curcuma zedoaria Rosc., radix	korenina kurkume zedoarije	1,380 g
Angelica archangelica L., radix	korenina zdravilnega gozdnega korena	1,360 g
Fraxinus ornus L., exudatum	izloček malega jesena (mana)	1,360 g
Commiphora sp., gummi-resina	gumi smola komifore (mira)	0,700 g
Carlina acaulis L., radix	korenina brezstebelne kompave	0,680 g
Gentiana lutea L., radix	korenina rumenega svišča	0,500 g
Myristica fragrans Houtt., semen	seme pravega muškatočca (muškatni orešček)	0,280 g
Glycyrrhiza glabra L., radix	korenina golostebelnega sladkega korena	0,170 g
Menyanthes trifolata L., folium	list navadnega mrzličnika	0,120 g
Acorus calamus L., radix	korenina pravega kolmeža	0,047 g
Illicium verum Hooker fil., fructus	plod zvezdastega janeža	0,046 g
Citrus aurantium L. subsp. amara Engl., pericarpium (in insula Curacao coluntur)	oplodje grenkega pomarančevca (gojen na otoku Curacao)	0,038 g
Artemisia absinthium L., herba	zel pravega pelina	0,035 g
Citrus aurantium L. subsp. amara Engl., pericarpium	oplodje grenkega pomarančevca	0,031 g
Syzygium aromaticum L., flos	cvet dišečega klinčevca	0,030 g
Inula helenium L., radix	korenina velikega omana	0,020 g
Piper cubeba L., fructus	plod kubebe (vrste poprovca)	0,017 g
Cnicus benedictus L., herba	zel benediktinke	0,015 g
Zingiber officinale Roscoe, radix	korenina pravega ingverja	0,015 g
Languas galanga (L.) Stuntz., radix	korenina galange	0,014 g
Verbascum thapsus L., flos	cvet drobnocvetnega lučnika	0,014 g
Centaureum erythraea Rafn., folium	list navadne tavžentrože	0,013 g
Citrus sinensis Osbeck., pericarpium	oplodje pomarančevca	0,011 g
Achillea moschata Wulf., herba	zel muškatočnega rmana	0,006 g
Iris germanica L., radix	korenina perunike	0,005 g
camphora racemica	racemna kafra	0,750 g
theriak	terjak	0,970 g

Terjak vsebuje:

Mentha x piperitha L., folium, pulvis	list poprove mete v prahu
Salvia officinalis L., folium, pulvis	list žajblja v prahu
Angelica archangelica L., radix, pulvis	korenino zdravilnega gozdnega korena v prahu
Zingiber officinale Roscoe, radix, pulvis	korenino pravega ingverja v prahu
Myristica fragrans Houtt., semen, pulvis	seme pravega muškatočca (muškatni orešček) v prahu
invertosum (Glucosum, Fructosum, a. a.)	invertni sladkor
aroma mellis	aromo medu
aqua purificata	prečiščeno vodo

Ekstrakcijsko topilo je 43,4 odstotni (V/V) etanol. Zdravilo vsebuje 40 vol. % etanola.

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so: prečiščena voda, 96 odstotni (V/V) etanol, barvilo E 150 d (amoniakalno sulfidni karamel), destilat kolmeža, suhi sok korenine golostebelnega sladkega korena.

Izgled zdravila Pervivo in vsebina pakiranja

Zdravilo Pervivo je raztopina rumenorjave barve, čista, aromatična, z vonjem po kafri.

Zdravilo je na voljo v treh velikostih pakiranja:

- v škatli, ki vsebuje stekleničko s 50 ml raztopine,
- v škatli, ki vsebuje steklenico z 250 ml raztopine,
- v škatli, ki vsebuje steklenico s 500 ml raztopine.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Adriatic BST d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana

Izdelovalec

Richard Bittner AG, Ossiacherstrasse 7, 9560 Feldkirchen, Avstrija

Način izdaje zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Navodilo je bilo odobreno 24. 8. 2012.