

NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Če kateri neželeni učinek postane resen, ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj so Paracetamol svečke 500 mg in za kaj jih uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden uporabite Paracetamol svečke 500 mg
3. Kako uporabljati Paracetamol svečke 500 mg
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje Paracetamol svečk 500 mg
6. Dodatne informacije

PARACETAMOL SVEČKE 500 mg

Svečke

1. Kaj so Paracetamol svečke 500 mg in za kaj jih uporabljamo:

SESTAVA: 1 svečka vsebuje 500 mg paracetamola (Paracetamolium).

POMOŽNE SNOVI: Trda mast (Adeps solidus).

OPREMA: Zloženska z 10 svečkami v dvojnem traku.

DELOVANJE: Paracetamol deluje analgetično in antipiretično.

TERAPEVSKE INDIKACIJE: Paracetamol deluje proti blagim do zmernim bolečinam (zobobol, glavobol, bolečine po operacijah, poškodbah, ob menstruaciji), pri vročinskih stanjih, pri gripi in prehladu.

2. Kaj morate vedeti, preden uporabite Paracetamol svečke 500 mg

Ne uporabljajte Paracetamol svečk 500 mg, če ste preobčutljivi na katerokoli sestavino, imate hudo okvaro jeter ali ledvic ali jemljete druga zdravila, ki vsebujejo paracetamol.

PREVIDNOSTNI UKREPI IN OPOZORILA

Oslabele osebe, bolniki z zmanjšanim delovanjem jeter ali ledvic in alkoholiki naj se pred uporabo Paracetamol svečk posvetujejo z zdravnikom.

NOSEČNOST IN DOJENJE

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Pred uporabo Paracetamol svečk 500 mg se posvetujte z zdravnikom.

VPLIV NA SPOSOBNOST UPRAVLJANJA VOZIL IN STROJEV

Ni znanega vpliva.

NA KAJ MORATE BITI POZORNI, ČE JEMLJETE DRUGA ZDRAVILA

Možne so interakcije Paracetamol svečk 500 mg s probenecidom, metoklorpropamidom, zidovudinom, antikoagulant, holestiraminom, kloramfenikolom, antiepileptiki in zdravili, ki delujejo na jetra.

Paracetamol svečk ne uporabljajte sočasno z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol.

Med jemanjem odsvetujemo pitje alkoholnih pijač.

3. Kako uporabljati Paracetamol svečke 500 mg ODMERJANJE IN NAČIN JEMANJA

3-4x dnevno 1-2 svečki v črevo.

Svečko uporabimo tako, da pretrgamo plastični ovoj po zarezi, izluščimo svečko in jo vstavimo s konico naprej čim globlje v danko.

Največji dnevni odmerek ne sme biti večji od 6 svečk.

Presledek med dvema odmerkoma naj bo vsaj 4-6 ur.

UKREPI PRI PREVELIKEM ODMERJANJU

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila, se takoj posvetujte z

zdravnikom ali s farmacevtom.

Ob jemanju prevelikih odmerkov lahko pride do resnih poškodb jeter in ledvic.

Znaki prekomernega odmerjanja, ki se pojavijo v prvih 24 urah so slabost, bruhanje, zaspanost in potenje.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila imajo lahko tudi Paracetamol svečke 500 mg neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije. V tem primeru prekinite zdravljenje.

Če kateri neželeni učinek postane resen, ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje Paracetamol svečke 500 mg

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninu. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

6. Dodatne informacije:

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo je galenski izdelek.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:

Dolenjske lekarne Novo mesto,

Galenski laboratorij, Kandijska c. 1, 8000 Novo mesto.

Datum zadnje revizije navodila: 02. 12. 2013.