

1.3.1	Candesartan/Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

NAVODILO ZA UPORABO

1.3.1	Candesartan/Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Navodilo za uporabo

Kanpiduo 8 mg/2,5 mg tablete
Kanpiduo 16 mg/2,5 mg tablete
cileksetilkandesartanat/indapamid

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Kanpiduo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Kanpiduo
3. Kako jemati zdravilo Kanpiduo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kanpiduo
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Kanpiduo in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Kanpiduo vsebuje dve učinkovini, ki se imenujeta kandesartan in indapamid.

Kandesartan pripada skupini zdravil, znani pod imenom antagonisti receptorjev za angiotenzin II. Deluje tako, da sprosti in razširi krvne žile, kar pomaga znižati vaš krvni tlak.

Indapamid je diuretik. Večina diuretikov povečuje tvorbo urina, indapamid pa se od drugih diuretikov razlikuje po tem, da le rahlo povečuje tvorbo urina.

To zdravilo je namenjeno zniževanju visokega krvnega tlaka (hipertenzije) pri odraslih. Zdravnik vam lahko predpiše zdravilo Kanpiduo, če že jemljete kandesartan in indapamid v enakih odmerkih, kot ju vsebuje to zdravilo, vendar v ločenih tabletah.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Kanpiduo

Ne jemljite zdravila Kanpiduo

- če ste alergični na kandesartan, indapamid, druga zdravila iste vrste (imenovana sulfonamidi) ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če ste noseči že več kot 3 mesece (tudi v zgodnji nosečnosti raje ne jemljite zdravila Kanpiduo – glejte poglavje o nosečnosti);
- če imate hudo bolezen jeter, zaporo žolčnih poti (težave z iztekanjem žolča iz žolčnika) ali če imate bolezen, imenovano jetrna encefalopatija (degenerativna bolezen možganov);
- če je bolnik otrok, mlajši od 1 leta;
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za znižanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren;
- če imate nizko raven kalija v krvi.

1.3.1	Candesartan/Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Če niste prepričani, ali kaj od tega velja za vas, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete zdravilo Kanpiduo.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Kanpiduo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate težave s srcem, jetri ali ledvicami ali če se zdravite z dializo;
- če so vam pred kratkim presadili ledvico;
- če bruhate, ste pred kratkim močno bruhal ali imate drisko;
- če imate bolezen nadledvičnih žlez, imenovano Connov sindrom (imenovano tudi primarni hiperaldosteronizem);
- če imate nizek krvni tlak;
- če ste kdaj imeli možgansko kap;
- če imate sladkorno bolezen;
- če imate putiko (protin);
- če imate kakršne koli težave z motnjami srčnega ritma;
- če ste napoteni na preiskavo delovanja obščitnične žleze;
- če imate mišične motnje, vključno z mišično bolečino, občutljivostjo, šibkostjo ali krči;
- zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če obstaja možnost, da zanosite). Uporaba zdravila Kanpiduo ni priporočljiva v zgodnjem obdobju nosečnosti, po tretjem mesecu nosečnosti pa ga ne smete jemati, ker lahko povzroči resno škodo vašemu otroku (glejte poglavje o nosečnosti);
- če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
 - zaviralec ACE (npr. enalapril, lizinopril ali ramipril), zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo,
 - aliskiren;
- če zaviralec ACE jemljete skupaj z zdravilom, ki spada med zdravila, imenovana antagonisti mineralokortikoidnih receptorjev. To so zdravila za zdravljenje srčnega popuščanja (glejte »Druga zdravila in zdravilo Kanpiduo«);
- če ugotovite poslabšanje vida ali bolečine v očeh. To so lahko znaki kopičenja tekočine v žilni plasti očesa (kar povzroči odstop žilnice) ali povišanja očesnega tlaka, ki se lahko zgodi v nekaj urah do tednih po jemanju zdravila Kanpiduo. Če se ne zdravi, lahko to vodi v trajno izgubo vida. Če ste pred kratkim imeli alergijo na penicilin ali sulfonamide, je pri vas tveganje za pojav tega večje.

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija ali kalcija) v krvi.

Glejte tudi informacije pod naslovom »Ne jemljite zdravila Kanpiduo«.

Če imate katero od teh stanj, vas bo zdravnik morda pogosteje kontroliral in bo opravil nekatere preiskave.

Če imate predvideno operacijo, morate zdravniku ali zobozdravniku povedati, da jemljete zdravilo Kanpiduo. Zdravilo Kanpiduo lahko namreč v kombinaciji z nekaterimi anestetiki povzroči prevelik padec krvnega tlaka.

Zdravniku morate povedati, če ste imeli preobčutljivostne reakcije na svetlobo.

Športniki se morajo zavedati, da to zdravilo vsebuje učinkovino, ki lahko povzroči pozitiven izvid testov za doping.

1.3.1	Candesartan/Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Posvetujte se z zdravnikom, če se pri vas po jemanju zdravila Kanpiduo pojavijo bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje ali driska. O nadaljnjem zdravljenju bo odločil zdravnik. Ne prenehajte jemati zdravila Kanpiduo sami od sebe.

Če menite, da se lahko katera koli od zgoraj naštetih situacij nanaša na vas ali če imate kakršna koli vprašanja oz. dvome glede jemanja vašega zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Otroci in mladostniki

Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in učinkovitosti tega zdravila ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih.

Druga zdravila in zdravilo Kanpiduo

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zdravilo Kanpiduo lahko vpliva na delovanje nekaterih drugih zdravil in nekatera druga zdravila lahko vplivajo na delovanje zdravila Kanpiduo. Če jemljete določena zdravila, bo zdravnik morda moral občasno opraviti preiskave krvi.

Še zlasti morate zdravniku povedati, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- druga zdravila za znižanje krvnega tlaka, vključno z antagonisti adrenergičnih receptorjev beta, diazoksidom, zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE) (npr. enalapril, kaptopril, lizinopril ali ramipril) ali diuretiki, vključno z diuretiki, ki zadržujejo kalij (amilorid, spironolakton, triamteren);
- nesteroidna protivnetna zdravila, npr. ibuprofen, naproksen ali diklofenak, celekoksib ali etorikoksib (zdravila za lajšanje bolečin in vnetja);
- acetilsalicilno kislino (če jo jemljete več kot 3 g na dan) (zdravilo za lajšanje bolečin in vnetja);
- dodatke kalija ali nadomestke soli, ki vsebujejo kalij (zdravila, ki povečujejo količino kalija v krvi);
- heparin (zdravilo za redčenje krvi),
- kotrimoksazol (antibiotik), znan tudi kot trimetoprim/sulfametoksazol;
- litij (zdravilo za zdravljenje duševnih motenj);
- zdravila za zdravljenje motenj srčnega ritma (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amjodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis, bretilij);
- zdravila za zdravljenje psihičnih motenj, kot so depresija, tesnoba, shizofrenija (npr. triciklične antidepressive, antipsihotike, nevroleptike (kot so amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid, haloperidol, droperidol));
- bepridil (za zdravljenje bolečine v prsih (angine pectoris));
- cisaprid, difemanil (za zdravljenje prebavnih motenj);
- antibiotike za zdravljenje okužb (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin v obliki injekcij);
- vinkamin v obliki injekcij (za zdravljenje simptomatskih kognitivnih motenj pri starejših, vključno z izgubo spomina);
- halofantrin (antiparazitik za zdravljenje določenih vrst malarije);
- pentamidin (za zdravljenje določenih vrst pljučnice);
- mizolastin (za zdravljenje alergijskih reakcij, kot je seneni nahod);
- amfotericin B v obliki injekcij (zdravila za zdravljenje glivičnih okužb);
- peroralne kortikosteroide za zdravljenje različnih bolezni, vključno s hudo astmo in revmatoidnim artritisom;
- stimulantna odvajala;
- baklofen (za zdravljenje bolnikov s togostjo mišic, ki nastaja pri boleznih, kot je multipla skleroza);
- alopurinol (za zdravljenje protina);
- metformin (za zdravljenje sladkorne bolezni);

1.3.1	Candesartan/Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

- jodirana kontrastna sredstva (za rentgenske preglede);
- kalcijeve tablete ali druge kalcijeve dodatke;
- ciklosporin, takrolimus ali druga zdravila za zaviranje imunskega sistema po presaditvi organov, za zdravljenje avtoimunskih bolezni ali hudih revmatskih ter dermatoloških bolezni;
- tetrakozaktid (za zdravljenje Crohnove bolezni);
- metadon (za zdravljenje odvisnosti).

Zdravnik vam bo morda moral spremeniti odmere in/ali uporabiti druge previdnostne ukrepe:

- če jemljete zaviralec ACE ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovoma »Ne jemljite zdravila Kanpiduo« in »Opozorila in previdnostni ukrepi«);
- če jemljete zaviralec ACE skupaj z določenimi drugimi zdravili za zdravljenje srčnega popuščanja; ta zdravila imenujemo antagonisti mineralokortikoidnih receptorjev (npr. spironolakton, eplerenon).

Zdravilo Kanpiduo skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Zdravilo Kanpiduo lahko jemljete s hrano ali brez nje.

Če vam zdravnik predpiše zdravilo Kanpiduo, se morate z njim posvetovati glede pitja alkoholnih pijač. Alkohol lahko povzroči omotico ali vrtoglavico.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če obstaja možnost, da zanosite). Zdravnik vam bo praviloma svetoval, da prenehate jemati zdravilo Kanpiduo, preden zanosite ali takoj, ko izveste, da ste noseči in vam priporočil jemanje drugih zdravil namesto zdravila Kanpiduo. Jemanje zdravila Kanpiduo v zgodnjem obdobju nosečnosti ni priporočljivo, po tretjem mesecu nosečnosti pa ga ne smete jemati, ker lahko povzroči resno škodo vašemu otroku.

Dojenje

Povejte zdravniku, če dojite ali nameravate začeti dojit. Zdravilo Kanpiduo ni priporočljivo za doječe matere. Če želite dojit, zlasti, če je vaš otrok novorojenček ali nedonošenček, bo zdravnik za vas morda izbral drugo zdravljenje. Učinkovina indapamid se izloča v materino mleko.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo lahko povzroči neželene učinke zaradi znižanega krvnega tlaka, npr. omotico ali utrujenost (glejte poglavje 4). Verjetnost za nastanek neželenih učinkov je večja na začetku zdravljenja ali ob povečevanju odmerka. Če se neželeni učinki pojavijo, ne vozite, uporabljajte orodja ali upravljajte strojev.

Zdravilo Kanpiduo vsebuje laktozo

Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Kanpiduo

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Pomembno je, da zdravilo Kanpiduo jemljete vsak dan.

Priporočen odmerek zdravila Kanpiduo je ena tableta na dan, najbolje zjutraj. Zdravilo Kanpiduo lahko jemljete s hrano ali brez nje. Tableto pogoltnite s požirkom vode. Ne smete je zdrobiti ali

1.3.1	Candesartan/Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

žvečiti. Tableto poskusite vzeti vsak dan ob istem času. Tako si boste lažje zapomnili, da jo vzamete. Zdravljenje visokega krvnega tlaka običajno traja vse življenje.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Kanpiduo, kot bi smeli

Če ste vzeli več zdravila Kanpiduo, kot vam je predpisal zdravnik, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zelo velik odmerek zdravila Kanpiduo lahko povzroči slabost, bruhanje, znižanje krvnega tlaka, krče, omotico, zaspanost, zmedenost in spremembe v količini urina, ki ga proizvedejo ledvice.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Kanpiduo

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Vzemite le naslednji odmerek kot po navadi.

Če ste prenehali jemati zdravilo Kanpiduo

Ker traja zdravljenje visokega krvnega tlaka običajno vse življenje, se morate pred prenehanjem jemanja tega zdravila posvetovati z zdravnikom. Če prenehate jemati zdravilo Kanpiduo, se vam krvni tlak lahko ponovno zviša.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Pomembno je, da veste, kakšni so lahko neželeni učinki.

Takoj prenehajte jemati zdravilo in nemudoma obiščite zdravnika, če se pojavijo kateri koli od naslednjih neželenih učinkov, ki so lahko resni:

- angioedem in/ali koprivnica. Za angioedem je značilno otekanje kože udov ali obraza, otekanje ustnic ali jezika, otekanje sluznice grla ali dihalnih poti, kar ima za posledico kratko sapo ali oteženo požiranje. Če se pojavi, se takoj posvetujte z zdravnikom (zelo redki – pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov);
- zdravilo Kanpiduo lahko povzroči zmanjšanje števila belih krvnih celic. Odpornost proti okužbam se zato lahko zmanjša in lahko opazite utrujenost, okužbo ali zvišano telesno temperaturo. Če se to zgodi, se posvetujte z zdravnikom. Zdravnik vam bo morda občasno opravil preiskavo krvi, da bo preveril, če zdravilo Kanpiduo kakorkoli vpliva na kri (agranulocitoza) (zelo redki – pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov);
- hude kožne reakcije, vključno s hudim kožnim izpuščajem, pordelostjo kože po vsem telesu, močnim srbenjem, pojavom mehurjev na koži, lupljenjem in otekanjem kože, vnetjem sluznic (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza), ali druge alergijske reakcije (zelo redki – pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov);
- smrtno nevaren nereden srčni utrip (*Torsade de pointes*) (neznana pogostnost – pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti);
- vnetje trebušne slinavke, ki lahko povzroči hude bolečine v trebuhu in hrbtu, ki jih spremlja zelo slabo počutje (pankreatitis) (zelo redki – pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov);
- bolezen možganov, ki je posledica bolezni jeter (jetna encefalopatija) (neznana pogostnost – pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti);
- vnetje jeter (hepatitis) (neznana pogostnost – pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti);
- mišična šibkost, krči, občutljivost ali bolečina in še posebno, če se ob tem tudi slabo počutite ali imate sočasno zvišano telesno temperaturo, je to lahko posledica nenormalne razgradnje mišic (rabdomioliza) (neznana pogostnost – pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti).

1.3.1	Candesartan/Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Med drugimi možnimi neželenimi učinki so:

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- okužba dihal;
- nizka raven kalija v krvi;
- omotičnost/občutek vrtenja;
- glavobol;
- alergijske reakcije, pretežno dermatološke, pri bolnikih, ki so nagnjeni k alergijskim in astmatičnim reakcijam;
- rdeč, izbočen kožni izpuščaj.

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- nizka raven natrija v krvi, ki lahko privede do dehidracije in nizkega krvnega tlaka;
- bruhanje;
- impotenca (nezmožnost doseganja in vzdrževanja erekcije).

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1000 bolnikov):

- nizka raven klorida v krvi, nizka raven magnezija v krvi;
- občutek utrujenosti, mravljinčenje (parestezija);
- prebavne motnje (npr. slabost, zaprtje), suha usta.

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov):

- spremembe v krvnih celicah, kot so trombocitopenija (zmanjšanje števila krvnih ploščic (trombocitov), kar povzroči hiter pojav modric in krvavitve iz nosu), levkopenija, nevtropenija (zmanjšanje števila belih krvničk, kar lahko povzroči nepojasnjeno vročino, bolečino v grlu ali druge gripi podobne simptome – če se to pojavi, se posvetujte z zdravnikom) in anemija (zmanjšanje števila rdečih krvničk);
- spremembe izvidov preiskav krvi: zvišana raven kalija v krvi, zlasti če že imate težave z ledvicami ali srčno popuščanje. Če je to hudo, se lahko pojavijo utrujenost, šibkost, neredno bitje srca ali mravljinčenje.
- visoka raven kalcija v krvi;
- motnje srčnega ritma (ki povzročijo palpitacije (občutek razbijanja srca)), nizek krvni tlak;
- kašelj;
- nenormalno delovanje jeter, zvišana raven jetrnih encimov, kar lahko vpliva na nekatere preiskave;
- kožni izpuščaj, srbenje;
- bolečine v hrbtu, sklepih in mišicah;
- bolezen ledvic (simptomi so utrujenost, povečana potreba po uriniranju, srbeča koža, slabost, otekli udi);
- intestinalni angioedem: oteklost črevesja s simptomi, kot so bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje in driska.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- omedlevica;
- okvara vida; poslabšanje vida ali bolečine v očeh zaradi visokega tlaka (možni znaki kopičenja tekočine v žilni plasti očesa (kar povzroči odstop žilnice) ali akutni glavkom z zaprtim zakotjem);
- driska;
- če imate sistemski lupus eritematosus (bolezen imunskega sistema, ki povzroča vnetje in poškodbo sklepov, kit ali organov s simptomi, kot so kožni izpuščaji, utrujenost, izguba apetita, povečanje telesne mase in bolečine v sklepih), se bolezen lahko poslabša;
- poročali so tudi o primerih fotosenzitivnih reakcij (spremembe v videzu kože) po izpostavljanju sončnim ali umetnim UVA žarkom;
- mišični krči, mišična šibkost;

1.3.1	Candesartan/Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

- nenormalni zapis EKG srca;
- lahko pride tudi do sprememb v krvi, zato bo zdravnik morda zahteval krvne preiskave, da bo preveril vaše stanje. Nastopijo lahko naslednje spremembe laboratorijskih parametrov:
 - zvišana raven sečne kisline – snovi, ki lahko povzroči nastanek ali poslabšanje putike (boleč(i) sklep(i), zlasti na stopalih),
 - zvišana raven glukoze v krvi pri bolnikih s sladkorno boleznijo.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
 Sektor za farmakovigilanco
 Nacionalni center za farmakovigilanco
 Slovenčeva ulica 22
 SI-1000 Ljubljana
 Tel: +386 (0)8 2000 500
 Faks: +386 (0)8 2000 510
 e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
 spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Kanpiduo

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu za oznako »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

Pretisni omot shranjujte v škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Kanpiduo

- Učinkovini sta cileksetilkandesartanat in indapamid.
 Ena tableta vsebuje 8 mg cileksetilkandesartanata in 2,5 mg indapamida.
 Ena tableta vsebuje 16 mg cileksetilkandesartanata in 2,5 mg indapamida.
- Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so makrogol 8000, hidroksipropilceluloza, laktoza monohidrat, koruzni škrob, kalcijev karmelozat, brezvodni koloidni silicijev dioksid, mikrokristalna celuloza, magnezijev stearat, rdeči železov oksid (E172) – samo v 16 mg/2,5 mg tabletah. Glejte poglavje 2, »Zdravilo Kanpiduo vsebuje laktozo«.

1.3.1	Candesartan/Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Izgled zdravila Kanpiduo in vsebina pakiranja

8 mg/2,5 mg tablete: bele ali skoraj bele, okrogle, obojestransko izbočene tablete z oznako CI1 na eni strani. Premer tablete: 7 mm.

16 mg/2,5 mg tablete: svetlo rožnate, lisaste, okrogle, obojestransko izbočene tablete z oznako CI2 na eni strani. Premer tablete: 7 mm.

Zdravilo Kanpiduo je na voljo v pakiranjih po:

- 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tablet v pretisnih omotih,
- 14, 28, 56, 84, 98 tablet v pretisnih omotih, koledarsko pakiranje.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Kanpiduo

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvajalec

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Ulica Rada Pušenjaka 10, 9240 Ljutomer, Slovenija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemčija

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Finska	Candesartan/Indapamide Krka
Ciper, Portugalska	Candexin
Nemčija	Candecor-Inda
Španija, Estonija, Litva, Latvija, Poljska, Slovaška, Slovenija	Kanpiduo
Madržarska	Kanpi Duo
Romunija	Co-Karbis

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne: 17. 4. 2026