

1.3.1	Aciclovir
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

NAVODILO ZA UPORABO

Virolex 30 mg/g mazilo za oko aciclovirum

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Virolex in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Virolex
3. Kako uporabljati zdravilo Virolex
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Virolex
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO VIROLEX IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Mazilo za oko Virolex vsebuje zdravilno učinkovino aciklovir, ki spada med protivirusna zdravila. Zdravilo se uporablja za zdravljenje okužbe roženice z virusom *Herpes simplex* (herpesni keratitis).

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO VIROLEX

Ne uporabljajte zdravila Virolex:

- če ste alergični (preobčutljivi) na aciklovir, valaciklovir ali katerokoli sestavino zdravila Virolex.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Virolex:

- Med zdravljenjem z zdravilom Virolex ne uporabljajte kontaktnih leč.
- Takoj po nanosu mazila se lahko pojavi prehodni in blag skeleč občutek.

Uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Klinično pomembnih medsebojnih delovanj niso ugotovili.

Uporaba zdravila Virolex skupaj s hrano in pijačo

Hrana in pijača ne vplivata na delovanje zdravila.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Zdravnik vam bo zdravilo Virolex med nosečnostjo predpisal le, če je pričakovana korist večja od morebitnega tveganja.

Po nanosu mazila na oko le neznatna količina aciklovirja prehaja v mleko. Če dojite, se pred uporabo zdravila Virolex posvetujete z zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

SmPCPIL046496_1	23.01.2014 – Updated: 23.01.2014	Page 1 of 3
-----------------	----------------------------------	-------------

1.3.1	Aciclovir
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

Mazilo za oko lahko prehodno zmanjša ostrino vida, zato bodite pri vožnji in upravljanju strojev previdni.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO VIROLEX

Pri uporabi zdravila Virolex natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Pri zdravljenju z zdravilom Virolex je zelo pomembno, da zdravilo uporabite čimprej, takoj ko se pojavijo prvi znaki bolezni (v prodromalni fazi).

V spodnjo veznično vrečko nanesemo 1 cm mazila petkrat na dan, vsake 4 ure. Po ozdravitvi dajemo aciklovir še najmanj 3 dni.

Starejšim in otrokom odmerka ni potrebno prilagajati.

Po uporabi tubo takoj zaprite.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Virolex, kot bi smeli

Malo verjetno je, da bi zaužitje mazila povzročilo klinično sliko zastrupitve.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Virolex

Mazilo nanesite vsak dan ob približno istem času. Če pozabite, ga nanesite takoj, ko je to mogoče, in nato nadaljujte kot običajno.

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Virolex neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov

- površinsko pikčasto obolenje roženice (površinska pikčasta keratopatija), ki mine brez posledic

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov

- blag pekoč občutek takoj po nanosu
- vnetje očesne veznice (konjunktivitis)

Redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov

- vnetje veke (blefaritis)

Zelo redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov

- takojšnja alergijska reakcija, vključno s koprivnico (urtikarija) in otekanjem obraza in grla (angioedem)

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA VIROLEX

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

1.3.1	Aciclovir
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

Zdravila Virolex ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojni. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Po odprtju tube je mazilo za oko uporabno še 28 dni, če ga shranjujete pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Virolex

- Zdravilna učinkovina je aciklovir. En g mazila za oko vsebuje 30 mg aciklovirja.
- Pomožna snov je beli vazelin.

Izgled zdravila Virolex in vsebina pakiranja

Mazilo je homogeno, belo do skoraj belo.

Na voljo so škatle s tubo s 4,5 g mazila za oko.

Način in režim izdaje zdravila Virolex

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Navodilo je bilo odobreno 31.1.2014.