

B. NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Banavin 5 mg filmsko obložene tablete
Banavin 10 mg filmsko obložene tablete
Banavin 15 mg filmsko obložene tablete
Banavin 20 mg filmsko obložene tablete

vortioksetin

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Banavin in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Banavin
3. Kako jemati zdravilo Banavin
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Banavin
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Banavin in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Banavin vsebuje učinkovino vortioksetin. Sodi v skupino zdravil, imenovanih antidepresivi.

To zdravilo uporabljamo za zdravljenje epizod velike depresije pri odraslih.

Ugotovljeno je, da vortioksetin zmanjša širok spekter simptomov depresije, ki zajemajo žalost, notranjo napetost (občutek tesnobe), motnje spanja (zmanjšanje spanja), zmanjšanje apetita, težavo s koncentracijo, občutke ničvrednosti, izgubo zanimanja za stvari, ki so bolnika prej veselile, in občutek splošne upočasnosti.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Banavin

Ne jemljite zdravila Banavin

- če ste alergični na vortioksetin ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če jemljete druga zdravila za zdravljenje depresije, imenovana neselektivni zaviralci monoaminooksidaze ali selektivni zaviralci MAO-A. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Banavin se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če:

- jemljete zdravila s tako imenovanim serotoninergičnim učinkom, kot so:
- tramadol in podobna zdravila (močna zdravila za lajšanje bolečin);
- sumatriptan in podobna zdravila z učinkovino, ki se končuje na "triptan" (uporabljajo se za zdravljenje migrene). Jemanje teh zdravil skupaj z zdravilom Banavin lahko poveča tveganje za

serotoninski sindrom. Ta sindrom je lahko povezan s halucinacijami, nehotenim trzanjem, pospešenim bitjem srca, visokim krvnim tlakom, zvišano telesno temperaturo, slabostjo in drisko.

- ste kdaj imeli krče (epileptične napade).
Zdravnik vas bo zdravil previdno, če ste kdaj imeli krče ali imate nestabilna obolenja s krči/epilepsijo. Krči so možno tveganje pri zdravljenju, ki se uporabljajo za zdravljenje depresije. Zdravljenje je treba prekiniti pri vseh bolnikih, ki dobijo krče ali če se poveča njihova pogostnost.
- ste kdaj imeli manijo;
- ste nagnjeni h krvavitvam oziroma hitremu nastanku modric ali če ste noseči (glejte poglavje "Nosečnost in dojenje");
- imate nizko raven natrija v krvi;
- ste stari 65 let ali več;
- imate hudo bolezen ledvic;
- imate hudo obolenje jeter ali obolenje jeter, imenovano ciroza;
- imate ali ste kdaj imeli povišan tlak v očesu ali glavkom. Če med zdravljenjem oči postanejo boleče in se pojavi zamegljen vid, se posvetujte z zdravnikom.

Med zdravljenjem z antidepresivi, vključno z vortiooksetinom, se lahko pojavijo tudi občutki napadalnosti, vznemirjenosti, jeze in razdražljivosti. Če se to zgodi, se morate posvetovati z zdravnikom.

Misli na samomor in poslabšanje depresije

Pri bolnikih z depresijo in/ali anksiozno motnjo se občasno lahko pojavijo misli na samopoškodovanje ali samomor. Po prvi uvedbi zdravljenja z antidepresivi lahko te misli postanejo še hujše, saj ta zdravila začnejo delovati šele čez nekaj časa, običajno čez dva tedna, nekatera pa tudi pozneje.

Pojav takšnih misli je verjetnejši:

- če ste že kdaj razmišljali o samomoru ali samopoškodovanju;
- če ste mlajša odrasla oseba.

Podatki iz kliničnih preskušanj kažejo, da pri odraslih mlajših od 25 let s psihičnimi stanji med zdravljenjem z antidepresivi obstaja večje tveganje za pojav samomorilnega vedenja.

Če kadarkoli začnete razmišljati o samopoškodovanju ali samomoru, se nemudoma posvetujte z zdravnikom ali poiščite pomoč v najbližji bolnišnici. Morda bi bilo koristno, če za težave z depresijo ali anksiozno motnjo poveste sorodniku ali dobremu prijatelju in ga prosite, da prebere to navodilo. Prosite ga lahko tudi, da naj vas opozori, če meni, da se je depresija ali anksioznost poslabšala ali ga skrbijo spremembe v vašem vedenju.

Otroci in mladostniki

Vortiooksetina se ne sme uporabljati pri pediatričnih bolnikih (mlajših od 18 let), ker učinkovitost ni bila dokazana. Varnost vortiooksetina pri otrocih in mladostnikih, starih od 7 do 17 let, je opisana v poglavju 4.

Druga zdravila in zdravilo Banavin

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Povejte zdravniku, če jemljete katerokoli izmed naslednjih zdravil:

- fenelzin, iproniazid, isokarboksazid, nialamid, tranilcipromin (zdravila za zdravljenje depresije, imenovana neselektivni ireverzibilni zaviralci monoaminooksidaze); nobenega od teh zdravil ne smete jemati skupaj z zdravilom Banavin. Če jemljete katero izmed teh zdravil, je potrebno počakati 14 dni, preden začnete jemati zdravilo Banavin. Po prenehanju jemanja zdravila

- Banavin je potrebno počakati 14 dni, preden začnete jemati katero izmed teh zdravil.
- moklobemid (zdravilo za zdravljenje depresije);
 - selegilin, razagilin (zdravila za zdravljenje Parkinsonove bolezni);
 - linezolid (zdravilo za zdravljenje bakterijskih okužb);
 - zdravila s serotonergičnim učinkom npr. tramadol in podobna zdravila (močna zdravila proti bolečinam) ter sumatriptan in podobna zdravila z imeni učinkovin, ki se končajo na "triptan" (za zdravljenje migrene). Jemanje teh zdravil skupaj z zdravilom Banavin lahko poveča tveganje za nastanek serotoninškega sindroma (glejte poglavje "Opozorila in previdnostni ukrepi").
 - litij (zdravilo za zdravljenje depresije in duševnih motenj) ali triptofan;
 - zdravila za katera je znano, da povzročajo nizko raven natrija;
 - rifampicin (zdravilo za zdravljenje tuberkuloze in drugih okužb);
 - karbamazepin, fenitoin (zdravila za zdravljenje epilepsije ali drugih bolezni);
 - varfarin, dipiridamol, fenpropukumon, nekateri antipsihotiki, fenotiazini, triciklični antidepressivi, majhni odmerki acetilsalicilne kisline in nesteroidna protivnetna zdravila (zdravila za redčenje krvi in zdravila za lajšanje bolečin). Ta lahko povečajo nagnjenost h krvavitvam.

Zdravila, ki povečajo tveganje za krče:

- sumatriptan in podobna zdravila z učinkovino, ki se končuje na "triptan";
- tramadol (močno zdravilo za lajšanje bolečin);
- meflokin (zdravilo za preprečevanje in zdravljenje malarije);
- bupropion (zdravilo za zdravljenje depresije; uporablja se tudi za odvrčanje od kajenja);
- fluoksetin, paroksetin, in druga zdravila za zdravljenje depresije imenovana SSRI/SNRI, triciklični antidepressivi;
- šentjanževka (*Hipericum perforatum*) (zdravilo za zdravljenje depresije);
- kinidin (zdravilo proti motnjam srčnega ritma);
- klorpromazin, klorprotiksen, haloperidol (zdravila za zdravljenje duševnih motenj, ki pripadajo skupinam, imenovanim fenotiazini, tioksanteni, butirofenoni).

Povejte zdravniku, če jemljete katero od zgoraj navedenih zdravil, saj mora zdravnik vedeti, če pri vas že obstaja tveganje za epileptične napade.

Test za ugotavljanje prisotnosti drog

Če opravite test za ugotavljanje prisotnosti drog v urinu, so pri uporabi nekaterih metod testiranja rezultati testa zaradi jemanja zdravila Banavin lahko pozitivni na metadon, čeprav ga morda ne jemljete. Če se to zgodi, se lahko opravi natančnejše testiranje.

Zdravilo Banavin skupaj z alkoholom

Uživanje alkohola ob sočasnem jemanju tega zdravila ni priporočljivo.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Tega zdravila ne smete uporabljati med nosečnostjo, razen če zdravnik pravi, da je to nujno potrebno.

Če jemljete zdravila za zdravljenje depresije, vključno z zdravilom Banavin, v zadnjem trimesečju nosečnosti, morate vedeti, da se lahko pri novorojenčku pojavijo naslednji učinki: težave z dihanjem, modrikasta koža, krči, spremembe telesne temperature, težave s hranjenjem, bruhanje, nizka raven krvnega sladkorja, toge ali mlahave mišice, živahni refleksi, tresenje, nemirnost, razdražljivost, otopelost, neprestan jok, zaspanost in težave s spanjem. Če se pri novorojenčku pojavi kateri od teh simptomov, takoj obiščite zdravnika.

Poskrbite, da babica oziroma zdravnik veda, da se zdravite z zdravilom Banavin. Pri jemanju med nosečnostjo, zlasti v zadnjih treh mesecih nosečnosti, lahko zdravila, kot je zdravilo Banavin,

povečajo tveganje za hudo bolezensko stanje pri otroku, imenovano persistentna pljučna hipertenzija pri novorojenčku (PPHN), zaradi katerega otrok diha hitreje in ima modrikast videz. Ti simptomi se običajno pojavijo v prvih 24 urah po rojstvu otroka. Če se to zgodi vašemu otroku, morate takoj stopiti v stik z babico oziroma zdravnikom.

Če jemljete to zdravilo proti koncu nosečnosti, se lahko poveča tveganje za močno vaginalno krvavitev takoj po porodu, še zlasti če imate zdravstveno zgodovino motenj strjevanja krvi. Zdravnik ali babica morata vedeti, da jemljete to zdravilo, da vam lahko svetujeta.

Dojenje

Pričakovati je, da bodo sestavine tega zdravila prehajale v materino mleko. Zdravilo Banavin se ne sme uporabljati med dojenjem. Zdravnik se bo odločil, ali morate prenehati z dojenjem ali z jemanjem tega zdravila, pri čemer bo pretehtal prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za vas.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

To zdravilo nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Vseeno svetujemo previdnost med takimi aktivnostmi, ko začnete z zdravljenjem z zdravilom Banavin ali spremenite odmere, saj so poročali o neželenih učinkih, kot je omotica.

Zdravilo Banavin vsebuje natrij

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

3. Kako jemati zdravilo Banavin

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pri odraslih, starih manj kot 65 let, je priporočeni odmerek zdravila Banavin 10 mg vortioksetina v enkratnem dnevnem odmerku. Zdravnik lahko poveča odmerek do največ 20 mg vortioksetina na dan ali zmanjša na najmanj 5 mg vortioksetina na dan, odvisno od tega, kako se odzivate na zdravilo.

Uporaba pri starejših bolnikih

Za starejše bolnike, stare 65 let ali več, je začetni odmerek 5 mg vortioksetina v enkratnem dnevnem odmerku.

Način uporabe

Vzemite eno tableto s kozarcem vode.

Tableto lahko zaužijete s hrano ali brez nje.

Če ne morete pogoltniti cele tablete, so lahko na trgu druga zdravila, ki vsebujejo vortioksetin v drugih farmacevtskih oblikah.

Trajanje zdravljenja

Zdravilo Banavin morate jemati tako dolgo, kot vam to predpiše zdravnik.

Nadaljujte z jemanjem tega zdravila, četudi bo trajalo nekaj časa, preden boste občutili izboljšanje stanja.

Zdravljenje je potrebno nadaljevati vsaj še 6 mesecev po tem, ko se spet dobro počutite.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Banavin, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek od predpisanega odmerka zdravila Banavin, takoj obvestite zdravnika ali se obrnite na oddelk za nujno pomoč najbližje bolnišnice. Imejte škatlo in preostale tablete pri sebi. To storite tudi, če ni znakov nelagodja. Znaki prekomernega odmerka so omotica, slabost, driska, neprijeten občutek v želodcu, srbenje po celem telesu, zaspanost in zardevanje.

Po zaužitju odmerka, večkrat višjega, kot je predpisani odmerek, so poročali o napadih krčev (epileptičnih napadih) in o redkem stanju, ki se imenuje serotoniniski sindrom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Banavin

Naslednji odmerek vzemite ob običajnem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali jemati zdravilo Banavin

Ne prenehajte jemati zdravila Banavin, ne da bi se posvetovali z zdravnikom.

Zdravnik se lahko odloči, da bo zmanjšal odmerek, preden boste dokončno prenehali jemati to zdravilo.

Pri nekaterih bolnikih, ki so prenehali jemati vortiooksetin, so se pojavili simptomi, kot so omotica, glavobol, občutki ščemenja, kot so mravljinčenje ali občutki električnih tresljajev (zlasti v glavi), nespečnost, občutek siljenja na bruhanje ali bruhanje, občutek tesnobe, razdražljivost ali vznemirjenost, utrujenost ali tresenje. Ti simptomi se lahko pojavijo prvi teden po prenehanju jemanja tega zdravila.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Na splošno so bili opaženi neželeni učinki blagi do zmerni in so se pojavili v prvih dveh tednih zdravljenja. Neželeni učinki so bili običajno začasni in niso povzročali prekinitve zdravljenja.

Spodaj našteje neželene učinke so poročali po naslednji pogostnosti:

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov

- slabost

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov

- driska, zaprtje, bruhanje
- omotica
- srbenje po celem telesu
- nenormalne sanje
- povečano potenje
- prebavne motnje

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

- zardevanje
- nočno potenje
- zamegljen vid
- nehoteno tresenje (tremor)
- halucinacije (bolnik vidi, sliši ali čuti stvari, ki jih ni)

Redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 1000 bolnikov

- razširjene zenice (midriaza), kar lahko poveča tveganje za glavkom (glejte poglavje 2)

Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

- nizke vrednosti natrija v krvi (simptomi lahko vključujejo občutek omotičnosti, šibkosti, zmedenosti, zaspanosti ali hude utrujenosti ali pa siljenje na bruhanje oziroma bruhanje; resnejši simptomi so omedlevica, krči ali padci)
- serotoniniski sindrom (glejte poglavje 2)
- alergijske reakcije, ki so lahko resne in povzročajo oteklost obraza, ustnic, jezika ali žrela, težave z dihanjem ali požiranjem in/ali nenadeno znižanje krvnega tlaka (zaradi česar ste lahko omotični ali imate vrtoglavico)
- koprivnica
- pretirana ali nepojasnjena krvavitve (vključno z modricami, krvavitvijo iz nosu, krvavitvijo iz prebavil in nožnice)
- izpuščaj
- motnje spanja (nespečnost)
- vznemirjenost in napadalnost. Če se pojavita ta neželena učinka, se posvetujte z zdravnikom (glejte poglavje 2).
- glavobol
- povečanje ravni hormona, imenovanega prolaktin v krvi
- nenehna potreba po premikanju (akatzija)
- škrtanje z zobmi (bruksizem)
- nezmožnost odpiranja ust (čeljustni krč/trizmus)
- sindrom nemirnih nog (potreba po premikanju nog za odpravo bolečih ali nenavadnih občutkov, ki se pogosto pojavi ponoči)
- nenormalen mlečni izcedek iz dojke (galaktoreja)

Pri bolnikih, ki jemljejo tovrstna zdravila, je bilo opaženo povečano tveganje za zlome kosti.

Pri odmerku 20 mg so poročali o povečanem tveganju za spolno disfunkcijo, pri nekaterih bolnikih pa so ta neželeni učinek opazili tudi pri nižjih odmerkih.

Dodatni neželeni učinki pri otrocih in mladostnikih

Neželeni učinki, ki so jih opazili pri uporabi vortiooksetina pri otrocih in mladostnikih, so bili podobni tistim, ki so jih opazili pri odraslih, razen dogodkov, povezanih z bolečinami v trebuhu, ki so jih opažali pogostejše kot pri odraslih, in samomorilnih misli, ki so jih pri mladostnikih opažali pogostejše kot pri odraslih.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510 ali

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Banavin

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli ali pretisnem omotu poleg oznake "EXP". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Banavin

Banavin 5 mg filmsko obložene tablete

- Učinkovina je vortioksetin. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg vortioksetina (kot vortioksetinijev bromid).
- Druge sestavine zdravila so manitol (E421), mikrokristalna celuloza, hidroksipropilceluloza, natrijev karboksimetilškrob in magnezijev stearat v jedru tablete ter hipromeloza, makrogol, titanov dioksid (E171) in železov oksid, rdeči (E172) v oblogi tablete.

Banavin 10 mg filmsko obložene tablete

- Učinkovina je vortioksetin. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg vortioksetina (kot vortioksetinijev bromid).
- Druge sestavine zdravila so manitol (E421), mikrokristalna celuloza, hidroksipropilceluloza, natrijev karboksimetilškrob in magnezijev stearat v jedru tablete ter hipromeloza, makrogol, titanov dioksid (E171) in železov oksid, rumeni (E172) v oblogi tablete.

Banavin 15 mg filmsko obložene tablete

- Učinkovina je vortioksetin. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 15 mg vortioksetina (kot vortioksetinijev bromid).
- Druge sestavine zdravila so manitol (E421), mikrokristalna celuloza, hidroksipropilceluloza, natrijev karboksimetilškrob in magnezijev stearat v jedru tablete ter hipromeloza, makrogol, titanov dioksid (E171), železov oksid, rdeči (E172) in železov oksid, rumeni (E172) v oblogi tablete.

Banavin 20 mg filmsko obložene tablete

- Učinkovina je vortioksetin. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg vortioksetina (kot vortioksetinijev bromid).
- Druge sestavine zdravila so manitol (E421), mikrokristalna celuloza, hidroksipropilceluloza, natrijev karboksimetilškrob in magnezijev stearat v jedru tablete ter hipromeloza, makrogol, titanov dioksid (E171) in železov oksid, rdeči (E172) v oblogi tablete.

Izgled zdravila Banavin in vsebina pakiranja

Banavin 5 mg filmsko obložene tablete

Roza, ovalna (11 mm x 5 mm), obojestransko izbočena filmsko obložena tableta, z vtisnjeno oznako "5" na eni strani.

Banavin 10 mg filmsko obložene tablete

Rumena, ovalna (13 mm x 6 mm), obojestransko izbočena filmsko obložena tableta, z vtisnjeno oznako "10" na eni strani.

Banavin 15 mg filmsko obložene tablete

Bledo oranžna, ovalna (15 mm x 7 mm), obojestransko izbočena filmsko obložena tableta, z vtisnjeno oznako "15" na eni strani.

Banavin 20 mg filmsko obložene tablete

Temno rdeča, ovalna (17 mm x 8 mm), obojestransko izbočena filmsko obložena tableta, z vtisnjeno oznako "20" na eni strani.

Zdravilo Banavin filmsko obložene tablete je na voljo v kartonastih škatlah, ki vsebujejo prozorne PVC/PVdC//Alu pretisne omote.

Pakiranje z 28, 56 ali 98 filmsko obloženimi tabletami.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Banavin

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec**Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budimpešta

Madžarska

Proizvajalec

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola PLA 3000

Malta

Adalvo Limited

Malta Life Sciences Park

Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings

3000 San Gwann

Malta

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Slovenija	Banavin 5 mg filmsko obložene tablete
	Banavin 10 mg filmsko obložene tablete
	Banavin 15 mg filmsko obložene tablete
	Banavin 20 mg filmsko obložene tablete
Češka	Banavin
Madžarska	Banavin 5 mg filmdobletta
	Banavin 10 mg filmdobletta
	Banavin 15 mg filmdobletta
	Banavin 20 mg filmdobletta
Poljska	Banavin
Slovaška	Banavin 5 mg filmom obalené tablety
	Banavin 10 mg filmom obalené tablety

Banavin 15 mg filmom obalené tablety
Banavin 20 mg filmom obalené tablety

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 29.08.2025.