

Navodilo za uporabo

DICYNONE 250 mg tablete etamsilat

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Dicynone in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Dicynone
3. Kako jemati zdravilo Dicynone
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Dicynone
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Dicynone in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Dicynone vsebuje etamsilat, ki je sredstvo za zaviranje krvavitv. Skrajšuje trajanje krvavitve in zmanjšuje izgubljanje krvi.

Indicirano je za preprečevanje in zdravljenje kapilarnih krvavitv (krvavitve iz majhnih krvnih žil), ne glede na vzrok ali mesto krvavitve.

Zdravilo Dicynone se predpisuje tudi bolnicam s premočnimi ali predolgo trajajočimi menstrualnimi krvavitvami, do katerih prihaja zaradi materničnega vložka ali iz drugih vzrokov.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Dicynone

Ne jemljite zdravila Dicynone

- če ste alergični na etamsilat ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če imate redko dedno krvno bolezen, imenovano porfirija.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Dicynone se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če:

- če imate zmanjšano delovanje ledvic.
- če imate zmanjšano delovanje jeter.
- če vam bodo naredili test za oceno ledvične funkcije (test določanja kreatinina).

- če vam bodo naredili laboratorijske teste (npr. krvne teste): med zdravljenjem z zdravilom Dicynone, je potrebno vzorec (npr. vzorec krvi) za laboratorijske teste odvzeti pred prvim dnevnim odmerkom zdravila, da zmanjšamo možnost vpliva zdravila Dicynone na rezultate laboratorijskih testov.

Pred začetkom zdravljenja zaradi premočnih in/ali predolgo trajajočih menstrualnih krvavitev vas bo zdravnik poslal na natančen ginekološki pregled in nujno potrebno je, da se držite njegovih navodil.

Če se vaše stanje, kljub jemanju zdravila Dicynone, ne izboljša, morate o tem obvestiti zdravnika, da bo lahko izključil kakršen koli organski vzrok.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta tudi

- če imate druga obolenja,
- imate alergije.

Druga zdravila in zdravilo Dicynone

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali, ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

O medsebojnih delovanjih zdravila ni nobenih podatkov.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Kot previdnostni ukrep se uporaba zdravila Dicynone med nosečnostjo odsvetuje.

Ker ni znano, ali etamsilat prehaja v materino mleko, doječe matere iz previdnostnih razlogov tega zdravila ne smejo jemati.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli.

Zdravilo Dicynone vsebuje laktozo in natrij

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na tableto, kar v bistvu pomeni 'brez natrija'.

3. Kako jemati zdravilo Dicynone

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Uporaba pri odraslih in mladostnikih

Na splošno je treba vzeti po dve tableti zdravila Dicynone dva- do trikrat na dan med obrokom z nekaj vode. Zdravnik bo določil velikost odmerkov in trajanje zdravljenja glede na izraženost in potek vašega obolenja.

Pri premočnih menstrualnih krvavitvah odmerek znaša dve tableti zdravila Dicynone trikrat na dan med obrokom z nekaj vode. Zdravljenje se začne pet dni pred pričakovano menstruacijo, traja pa deset dni.

Uporaba pri otrocih

Priporočeni odmerek za otroke je polovica odmerka za odrasle, to je ena tableta dvado trikrat na dan.

Predpisanega odmerjanja ne smete sami spreminjati. Če menite, da je učinek zdravila prešibek ali premočan, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Dicynone, kot bi smeli

Če menite, da ste vzeli prevelik odmerek tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Dicynone

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali jemati zdravilo Dicynone

Zdravilo jemljite tako dolgo kot vam je priporočil zdravnik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od naslednjih redkih vendar resnih neželenih učinkov, **prenehajte z jemanjem** tega zdravila in se **tako**j posvetujte z zdravnikom:

- nenadno sopenje, otekanje ustnic, jezika in grla ali telesa, izpuščaj, omedlevica ali težave pri požiranju (huda alergijska reakcija).

Pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- glavobol,
- kožni izpuščaj,
- slabost s siljenjem na bruhanje,
- driska,
- nelagodje v trebuhu,
- občutek oslabelosti.

Redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1000 bolnikov)

- bolečine v sklepih.

Zelo redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 000 bolnikov)

- vročina,
- nepravilnosti pri strjevanju krvi z nastankom krvnega strdka v žilah,

- močno zmanjšanje števila belih krvnih celic, kar lahko poveča verjetnost okužb,
- zmanjšanje števila krvnih ploščic, kar lahko poveča tveganje za krvavitve ali modrice,
- alergijska reakcija.

V večini primerov ti neželeni učinki izginejo sami od sebe. Če vztrajajo ali se pojavijo drugi neželeni učinki, morate o tem obvestiti svojega zdravnika ali farmacevta.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželeni učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Dicynone

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Dicynone

- Učinkovina je etamsilat. Ena tableta zdravila Dicynone vsebuje 250 mg etamsilata.
- Pomožne snovi so brezvodna citronska kislina, koruzni škrob, povidon, magnezijev stearat (E 572), laktoza monohidrat.

Izgled zdravila Dicynone in vsebina pakiranja

Tableta je bela do sivkasto bela, okrogla in bikonveksna.

Zdravilo je na voljo v škatli s tremi pretisnimi omoti po 10 tablet.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Dicynone

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Lek farmacevtska družba, d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Proizvajalca

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija,
Lek farmacevtska družba d.d., Trimlini 2 D, Lendava, Slovenija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 9. 7. 2024.

V sodelovanju z OM PHARMA, Ženeva, Švica