



# Klindamicin

## MariDERM

 LEKARNE MARIBOR

## NAVODILO ZA UPORABO

### 10 mg/ml dermalna raztopina klindamicin

#### Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

#### Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina
3. Kako uporabljati zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina
6. Dodatne informacije

#### 1. KAJ JE ZDRAVILO KLINDAMICIN MARIDERM 10 mg/ml DERMALNA RAZTOPINA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina vsebuje antibiotik klindamicin. Klindamicin spada v skupino antibiotikov, ki se imenujejo piranozidni antibiotiki (linkozamidi). Deluje tako, da zavira rast in razmnoževanje občutljivih bakterij. Med številnimi vrstami bakterij, na katere deluje klindamicin, je tudi *Propionibacterium acnes*, ki je pomemben dejavnik pri nastanku navadnih aken.

Zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina uporabljamo za zdravljenje blage do zmerno oblike navadnih aken (*acne vulgaris*).

Zdravilo je namenjeno samo zunanji uporabi na koži.

#### 2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO KLINDAMICIN MARIDERM 10 mg/ml DERMALNA RAZTOPINA

##### Ne uporabljajte zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) klindamicin, linkomicin ali katerokoli sestavino zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina.

##### Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina:

- če imate Crohnovo bolezen,
- če imate ulcerozni kolitis,
- če imate dedno nagnjenost k preobčutljivosti, posebno za alergene, ki običajno ne povzročajo imunskih reakcij.

Obvestite zdravnika, če imate katero od zgoraj naštetih bolezni.

#### Zdravnika tudi obvestite:

- če jemljete druga zdravila, zlasti antibiotike,
- če uporabljate zdravila ali druge izdelke za lokalno zdravljenje ali nego kože,
- če ste noseči ali nameravate zanositi,
- če dojite,
- če je koža, na katero bi morali nanesti zdravilo, poškodovana.

Zdravljenje z večino antibiotikov, tudi s klindamicinom, je lahko povezano s hudo drisko in gnojnim vnetjem debelega črevesa z lokalnim odmiranjem tkiva. Pri lokalni uporabi klindamicina se to pojavi izjemno redko. Kljub temu je potrebna previdnost. **Če se pri vas pojavi daljša ali hujša driska, takoj prenehajte z uporabo zdravila in obiščite zdravnika.** Zdravnik bo presodil, ali je drisko potrebno zdraviti.

Pri dalj časa trajajočem zdravljenju z velikimi odmerki na velikih površinah kože je potrebna previdnost. Zdravljenje mora potekati pod zdravniškim nadzorom.

#### Uporaba drugih zdravil

Zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina lahko uporabljate skupaj z drugimi zdravili ali izdelki le, če je bila ugotovljena njihova združljivost (kompatibilnost).

Sočasna uporaba zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina s pripravki, ki vsebujejo benzoilperoksid, ni priporočljiva. Previdnost je potrebna tudi pri uporabi zdravil, kozmetičnih proizvodov ali drugih izdelkov, ki povzročijo luščenje ali draženje kože.

*Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.*

#### Nosečnost in dojenje

Varnost uporabe raztopine klindamicina na koži med nosečnostjo še ni potrjena, zato uporabo v tem obdobju odsvetujemo. Zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina med nosečnostjo uporabljajte le, če je zdravnik presodil, da pričakovana korist za vas upravičuje tveganje za otroka.

Prav tako ni podatkov, ali se klindamicin po uporabi na koži izloča v materino mleko, zato uporabe zdravila v obdobju dojenja ne priporočamo.

Med uporabo zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina naj mati prekine z dojenjem.

*Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.*

#### Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

## **Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina**

Zdravilo vsebuje propilenglikol, ki lahko povzroči draženje kože. Vsebuje tudi etanol (alkohol), ki lahko povzroči pekoč občutek in izsušitev kože.

### **3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO KLINDAMICIN MARIDERM 10 mg/ml DERMALNA RAZTOPINA**

Pri uporabi zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Običajno se zdravilo uporablja dvakrat dnevno. Trajanje zdravljenja določi zdravnik. Ne prekinite zdravljenja in ne spreminjajte odmerjanja, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

Če zdravnik ali farmacevt ne svetuje drugače, upoštevajte naslednja navodila:

Pred uporabo kožo temeljito očistite in osušite. S pomočjo bombažne blazinice ali kosma vate nanesite tanko plast dermalne raztopine na prizadeto kožo (akne) dvakrat na dan. Obolelega dela kože, kamor ste nanesli zdravilo, ne povijajte.

Zdravilo ni namenjeno uporabi pri otrocih.

Zdravilo je namenjeno samo za uporabo na koži. **Zdravila ne smete zaužiti!** Če pride zdravilo po nesreči v stik z očmi, nosno ali ustno sluznico ali poškodovano kožo, zdravilo temeljito sperite s hladno vodo.

Po uporabi plastenko vedno dobro zaprite.

**Če ste uporabili večji odmerek zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina, kot bi smeli**

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina, kot bi smeli, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Pri dolgotrajni uporabi zdravila na veliki površini kože lahko pride do sistemske absorpcije, to je, do prehoda klindamicina skozi kožo v sistemski krvni obtok.

**Če ste pozabili uporabiti zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina**

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina, ga uporabite takoj, ko se spomnite, razen če je že skoraj čas za naslednji odmerek. V tem primeru zdravila ne uporabite in nadaljujte z uporabo po predpisani shemi.

Ne nanesite večje količine zdravila, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

*Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.*

### **4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI**

*Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.*

Pri uporabi zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki:

- gramnegativni folikulitis (bakterijska okužba lasnega mešička),
- bolečine v trebuhu, prebavne motnje, driska,
- pekoče oči,
- suha koža, draženje kože, kontaktni dermatitis (vnetje kože), mastna koža.

Pogostnost neželenih učinkov iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti.

*Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželen učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.*

### **5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA KLINDAMICIN MARIDERM 10 mg/ml DERMALNA RAZTOPINA**

**Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!**

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C v originalni ovojni. Zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in plastenki poleg oznake »Uporabno do:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

*Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.*

### **6. DODATNE INFORMACIJE**

**Kaj vsebuje zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina**

Zdravilna učinkovina je klindamicin. 1 ml dermalne raztopine vsebuje 10 mg klindamicinijevega klorida v obliki 10,86 mg klindamicinijevega klorida.

Pomožne snovi so 90 % (V/V) etanol, propilenglikol in prečiščena voda.

**Izgled zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina in vsebina pakiranja**

Zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina je bistra, brezbarvna raztopina z značilnim vonjem po alkoholu.

V škatli je plastenka iz polietilena z navojem, kapalnim nastavkom ter zaščitno zaporko iz polipropilena. Plastenka vsebuje 30 ml dermalne raztopine.

**Način izdaje zdravila Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina**

Izdaja zdravila je le na recept.

**Proizvajalec:**

Mariborske lekarne Maribor,  
Minařikova ulica 6, 2000 Maribor

Zdravilo Klindamicin MariDERM 10 mg/ml dermalna raztopina je galenski izdelek.

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na Službo za raziskave in razvoj proizvajalca, telefon 02 450 28 00, e-pošta: info@mb-lekarne.si.

**Datum zadnje revizije navodila**

25. november 2011