

NAVODILO ZA UPORABO

TAXOL 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje paklitaksel

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo TAXOL in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo TAXOL
3. Kako boste prejeli zdravilo TAXOL
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila TAXOL
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO TAXOL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Paklitaksel spada v skupino protitumorskih zdravil, ki jo imenujemo taksani. Ta zdravila zavirajo rast rakavih celic.

Zdravilo TAXOL uporabljamo za zdravljenje:

Raka jajčnika:

- kot zdravilo prve izbire (po uvodnem kirurškem posegu, v kombinaciji z zdravilom, ki vsebuje platino, cisplatinom).
- po neuspešnem zdravljenju s standardnimi zdravili, ki vsebujejo platino.

Raka dojke:

- kot zdravilo prve izbire pri napredovali bolezni ali bolezni, ki se je razširila v druge dele telesa (metastatska bolezen). Zdravilo TAXOL se uporablja v kombinaciji z *antraciklinom* (npr. doksorubicin) ali s *trastuzumabom* (za bolnice, pri katerih zdravljenje z antraciklinom ni primerno in pri katerih imajo rakave celice na svoji površini protein, ki se imenuje HER 2; glejte navodilo za uporabo trastuzumaba).
- kot dodatno zdravljenje po uvodnem kirurškem posegu, ki mu je sledilo zdravljenje z antraciklinom in ciklofosfamidom (AC).
- kot zdravilo druge izbire pri bolnicah, ki se niso odzvale na standardno zdravljenje z antraciklini ali pri katerih takšno zdravljenje ni primerno.

Napredovalega nedrobnoceličnega raka pljuč:

- v kombinaciji s cisplatinom, če kirurški poseg in/ali obsevanje ne prideta v poštev.

Z AIDS-om povezanega Kaposijevega sarkoma:

- če predhodno zdravljenje (npr. liposomalni antraciklini) ni bilo uspešno.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE PREJELI ZDRAVILO TAXOL

Zdravila TAXOL ne smete prejeti

- če ste **alergični** (preobčutljivi) na paklitaksel ali katerikoli sestavino zdravila TAXOL, še posebej makrogolglicerol ricinolat.
- če imate **prenizko število belih krvnih celic**. Zdravnik bo v ta namen opravil krvne preiskave.
- če **dojite**.
- če imate **hudo in nenadzorovano okužbo in se zdravilo TAXOL uporablja za zdravljenje Kaposijevega sarkoma**.

Če se karkoli od navedenega nanaša na vas, **o tem pred začetkom zdravljenja z zdravilom TAXOL obvestite svojega zdravnika.**

Pri otrocih in mladostnikih (mlajših od 18 let) uporaba zdravila TAXOL ni priporočljiva.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila TAXOL

Da bi se tveganje za pojav alergijske reakcije kar najbolj zmanjšalo, boste pred zdravilom TAXOL prejeli še nekatera druga zdravila.

- Če se pojavi **huda alergijska reakcija** (na primer težko dihanje, zasoplost, stiskanje v prsnem košu, znižanje krvnega tlaka, omotica, vrtoglavica, kožne reakcije, kot sta izpuščaj ali oteklina).
- Če imate **zvišano telesno temperaturo, hudo mrzlico, vnetje žrela ali razjede ustne sluznice** (znaki supresije kostnega mozga).
- Če čutite **odrevenelost ali oslabelost v rokah ali nogah** (znaki periferne nevropatije). Odmerek zdravila TAXOL bo morda treba zmanjšati.
- Če imate **hudo okvaro jeter**. V tem primeru uporaba zdravila TAXOL ni priporočljiva.
- Če imate **motnje srčnega prevajanja**.
- Če se med zdravljenjem ali kmalu po zdravljenju z zdravilom TAXOL pojavi **huda ali trdovratna driska** z zvišano telesno temperaturo in bolečino v trebuhu. To bi lahko bil znak vnetja kolona (psevdomembranski kolitis).
- Če ste se **predhodno zdravili z obsevanjem prsnega koša** (lahko se poveča tveganje za vnetje pljuč).
- Če se zdravite zaradi Kaposijevega sarkoma in imate **rane ali rdečino na ustni sluznici** (znaki vnetja sluznice). Odmerek zdravila bo morda treba zmanjšati.

Če se karkoli od navedenega nanaša na vas, o tem nemudoma obvestite svojega zdravnika.

Zdravilo TAXOL je treba vedno aplicirati v veno. Če se zdravilo TAXOL aplicira v arterijo, se lahko pojavi vnetje arterije, ki ga spremlja bolečina, oteklina, rdečina in vročina.

Uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. V primeru sočasnega zdravljenja se lahko učinek zdravila TAXOL ali drugega sočasno uporabljenega zdravila spremeni in poveča tveganje za pojav neželenih učinkov.

Interakcija pomeni, da lahko različna zdravila medsebojno vplivajo na svoje delovanje. Zaradi možnih interakcij mora zdravnik vedeti, če se zdravilo TAXOL uporablja skupaj s/z:

- **cisplatinom** (zdravilo za zdravljenje raka): zdravilo TAXOL morate prejeti pred cisplatinom. Morda bo treba pogosteje nadzirati delovanje ledvic.
- **doksorubicinom** (zdravilo za zdravljenje raka): zdravilo TAXOL morate prejeti 24 ur po doksorubicinu. Tako se prepreči kopičenje visokih koncentracij doksorubicina v telesu.
- efavirenzom, nevirapinom, ritonavirjem, nelfinavirjem ali drugimi zaviralci proteaze, ki jih uporabljamo za **zdravljenje okužbe z virusom HIV**. Odmerek zdravila TAXOL bo morda treba prilagoditi.
- eritromicinom (**antibiotik**), fluoksetinom (**antidepresiv**) ali gemfibrozilom, ki ga uporabljamo za **zniževanje vrednosti holesterola**. Odmerek zdravila TAXOL bo morda treba zmanjšati.
- rifampicinom, **antibiotikom za zdravljenje tuberkuloze**. Odmerek zdravila TAXOL bo morda treba povečati.
- karbamazepinom, fenitoinom ali fenobarbitalom, ki jih uporabljamo za zdravljenje **epilepsije**.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali mislite, da ste noseči, o tem pred začetkom zdravljenja z zdravilom TAXOL **obvestite svojega zdravnika**. Če obstaja možnost, da bi lahko zanosili, **morate med zdravljenjem uporabljati učinkovito in varno metodo kontracepcije**. Med nosečnostjo se zdravila TAXOL ne sme uporabljati, razen če je nujno potrebno. Bolnice in bolniki v rodni dobi in/ali njihovi partnerji morajo uporabljati kontracepcijo še najmanj 6 mesecev po zaključku zdravljenja s paklitakselom.

Zaradi možne neplodnosti se morajo bolniki moškega spola pred začetkom zdravljenja s paklitakselom posvetovati o možnosti zamrznitve semena.

Če dojdete, o tem obvestite svojega zdravnika. Med zdravljenjem z zdravilom TAXOL morate prenehati dojit. Dojiti lahko začnete šele, ko vam tako svetuje zdravnik.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

To zdravilo vsebuje alkohol. Takoj po prejemu odmerka zdravila je vožnja vozil lahko nevarna. V nobenem primeru pa ne smete voziti, če ste omotični ali kakorkoli drugače dvomite, da ste sposobni za varno vožnjo.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila TAXOL

- **Zdravilo TAXOL vsebuje ricinusovo olje** (50 % makroglicerol ricinolat), ki lahko povzroči resne alergijske reakcije. Če ste alergični na ricinusovo olje, **to povejte svojemu zdravniku še preden prvič prejmete zdravilo TAXOL.**
- **Zdravilo TAXOL vsebuje alkohol** (približno 50 % etanol) – en mililiter zdravila TAXOL vsebuje 0,396 g alkohola. Odmerek zdravila TAXOL 300 mg/50 ml vsebuje 20 g alkohola, kar ustreza 450 ml piva ali 175 ml vina.

3. KAKO BOSTE PREJELI ZDRAVILO TAXOL

- **Da bi se tveganje za pojav alergijske reakcije kar najbolj zmanjšalo,** boste pred zdravilom TAXOL prejeli še nekatera druga zdravila. Ta zdravila lahko dobite v obliki tablet, v obliki infuzije v žilo ali kombinacije obojega.
- **Zdravilo TAXOL boste prejeli v obliki kapljične infuzije** v veno (intravenska infuzija) preko filtra v infuzijskem sistemu. Zdravilo TAXOL vam bo apliciral zdravstveni delavec, ki bo pred aplikacijo zdravila pripravil ustrezno raztopino za infundiranje. Odmerek, ki ga boste prejeli, je odvisen tudi od rezultatov krvnih preiskav. Glede na vrsto in resnost rakave bolezni boste zdravilo TAXOL prejeli samo ali v kombinaciji z drugim zdravilom za zdravljenje raka.
- Zdravilo TAXOL je treba vedno aplicirati v veno v obliki 3-urne ali 24-urne intravenske infuzije. Če se zdravnik ne odloči drugače, se zdravilo običajno aplicira vsaka 2 ali 3 tedne. Zdravnik vam bo pojasnil koliko ciklov zdravljenja z zdravilom TAXOL bo potrebnih.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste prejeli večji odmerek zdravila TAXOL, kot bi smeli

Antidot za primere prevelikega odmerjanja zdravila TAXOL ni znan. V primeru prevelikega odmerjanja bo zdravnik uvedel simptomatsko zdravljenje.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo TAXOL neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Nemudoma obvestite svojega zdravnika, če opazite katerikoli znak alergijske reakcije. Ti lahko obsegajo enega ali več naslednjih znakov:

- **zardevanje,**
- **kožne reakcije,**
- **srbenje,**
- **stiskanje v prsnem košu,**
- **zasoplost ali težko dihanje,**
- **otekanje.**

To so lahko znaki hudih neželenih učinkov.

Nemudoma obvestite svojega zdravnika:

- če imate **zvišano telesno temperaturo, hudo mrzlico, vnetje žrela ali razjede ustne sluznice** (znaki supresije kostnega mozga),
- če čutite **odrevenelost ali oslabeledost v rokah ali nogah** (znaki periferne nevropatije),
- če se pojavi **huda ali trdovratna driska** z zvišano telesno temperaturo in bolečino v trebuhu.

Zelo pogosti neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri več kot 10 od 100 bolnikov.

- blažje preobčutljivostne reakcije, kot so zardevanje, kožni izpuščaj, srbenje;
- okužbe: predvsem okužba zgornjih dihal, okužba sečil;
- vnetje in rdečina ustne sluznice, driska, siljenje na bruhanje, bruhanje;
- izpadanje las in dlak;
- bolečina v mišicah, bolečina v sklepih;
- krvavitev;
- odrevenelost, mravljinčenje ali oslabeledost v rokah in nogah (vse simptomi periferne nevropatije);
- preiskave lahko pokažejo: zmanjšanje števila trombocitov, belih ali rdečih krvnih celic, nizek krvni tlak.

Pogosti neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri manj kot 10 od 100 bolnikov.

- prehodne in blage spremembe nohtov in kože, reakcije na mestu injiciranja (lokalizirana oteklina, bolečina, rdečina kože ali zatrdlina);
- preiskave lahko pokažejo: počasnejše bitje srca, močno zvišanje vrednosti jetrnih encimov (alkalne fosfataze in AST – SGOT).

Občasni neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri manj kot 10 od 1.000 bolnikov.

- šok zaradi okužbe (znan kot septični šok);
- motnje v delovanju srca (AV blok), hitro utripanje srca, srčni infarkt, dihalna stiska;
- čezmerno znojenje, omedlevica (sinkopa), hude alergijske reakcije, vnetje ven, ki povzroči nastanek krvnih strdkov (tromboflebitis), oteklina obraza, ustnic, ust, jezika ali žrela, koprivnica, ki lahko zajame celo telo;
- bolečina v hrbtu, bolečina v prsih, bolečina v rokah ali nogah, mrzlica, bolečina v trebuhu;
- preiskave lahko pokažejo: močno zvišanje vrednosti bilirubina (zlatenica), visok krvni tlak, krvne strdke.

Redki neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri manj kot 10 od 10.000 bolnikov.

- zmanjšanje števila belih krvnih celic z zvišano telesno temperaturo in večjim tveganjem za pojav okužbe (febrilna nevtropenija);
- prizadetost živcev z občutkom šibkosti v mišicah rok in nog (motorična nevropatija);
- srčno popuščanje;
- težko dihanje, pljučna embolija, pljučna fibroza, intersticijska pljučnica, občutek oteženega dihanja, pljučni izliv;
- zapora črevesa, predrtje črevesa, vnetje kolona (ishemični kolitis), vnetje trebušne slinavke;
- srbenje, izpuščaj, rdečina kože (eritem);
- zastupitev krvi (sepsa), vnetje trebušne mrene;
- vročina, dehidracija, šibkost, edem, splošno slabo počutje;
- hude preobčutljivostne reakcije, ki so lahko smrtno nevarne (anafilaktične reakcije);
- preiskave lahko pokažejo: zvišanje vrednosti kreatinina v krvi, kar kaže na okvaro v delovanju ledvic.

Zelo redki neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri manj kot 10 od 100.000 bolnikov.

- nepravilen, hiter srčni ritem (atrijska fibrilacija, supraventrikularna tahikardija);
- nenadna motnja v tvorbi krvnih celic (akutna mieloična levkemija, mielodisplastični sindrom);
- motnje vidnega živca in/ali vida (skotomi z bleščanjem);
- izguba sluha ali naglušnost (ototoksičnost), zvenenje v ušesih (tinitus), vrtoглаvica;
- kašelj;
- nastanek krvnih strdkov v žilah trebuha in črevesa (mezenterična tromboza), vnetje kolona, ki ga lahko spremlja trdovratna in huda driska (pseudomembranski kolitis, nevtropenični kolitis), trebušna vodenica (ascites), vnetje požiralnika, zaprtost;
- hude preobčutljivostne reakcije, vključno z zvišano telesno temperaturo, rdečino kože, bolečino v sklepih in/ali vnetjem oči (Stevens-Johnsonov sindrom), lokalno luščenje kože (epidermalna nekroliza), rdečina z nepravilnimi rdečimi (eksudativnimi) spremembami (multiformni eritem), vnetje kože z mehurji in luščenjem (eksfoliativni dermatitis), koprivnica, odstopanje nohtov (med zdravljenjem morajo bolniki dlani in stopala zaščititi pred soncem);
- izguba apetita (anoreksija);
- huda preobčutljivostna reakcija s šokom, ki se lahko konča usodno (anafilaktični šok);
- epileptični napadi, prizadetost vegetativnega živčevja (lahko s posledično črevesno zaporo ali padcem krvnega pritiska ob vstajanju), možganske okvare, krči, omotica, motnje koordinacije gibov, glavobol;
- motnje delovanja jeter (nekroza jeter, jetrna encefalopatija (v obeh primerih so poročali o smrtnih izidih));
- zmedenost.

Neželeni učinki neznane pogostnosti

- pojav zatrdlin v koži (sklerodermija);
- sindrom tumorske lize;
- oteklina rumene pege, prividi, motnjave v očesni steklovini;
- vnetje ven;
- bolezen vezivnega tkiva (sistemski eritematozni lupus).

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA TAXOL

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila TAXOL ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in viali. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Pred redčenjem zdravila TAXOL:

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zamrzovanje nima škodljivih učinkov na neodprte vial.

Z mikrobiološkega stališča se lahko zdravilo po odprtju shranjuje največ 28 dni pri temperaturi 25 °C. Za druge čase in pogoje shranjevanja med uporabo je odgovoren uporabnik.

Po redčenju zdravila TAXOL:

Z mikrobiološkega stališča je treba zdravilo uporabiti takoj po redčenju. Če se zdravilo ne uporabi takoj, se ga lahko shranjuje v hladilniku (2 °C do 8 °C) največ 24 ur, razen če je redčenje zdravila opravljeno v nadzorovanih in validiranih aseptičnih pogojih. Za več podrobnosti o stabilnosti po redčenju, glejte poglavje, namenjeno zdravstvenim delavcem.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo TAXOL

Zdravilna učinkovina je paklitaksel.

En ml koncentrata vsebuje 6 mg paklitaksela.

Ena viala vsebuje 5 ml (30 mg paklitaksela), 16,7 ml (100 mg paklitaksela) ali 50 ml (300 mg paklitaksela).

Pomožni snovi sta makrogolglicerol ricinolat in brezvodni etanol.

Izgled zdravila TAXOL in vsebina pakiranja

TAXOL 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje je bistra, brezbarvna do rahlo rumena viskozna raztopina. Na voljo je v vialah, ki vsebujejo 5 ml, 16,7 ml ali 50 ml koncentrata, ki ga je treba pred uporabo razredčiti.

Viale so posamezno pakirane v škatlo.

Način in režim izdaje zdravila

H – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Olivova 4

110 00 Praga 1

Češka

Izdelovalec:

Corden Pharma Latina S.p.A.

Via del Murillo Km 2.800

04013 Sermoneta

Latina, Italija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na podjetje PharmaSwiss d.o.o., Ljubljana, ki je odgovorno za trženje zdravila v Sloveniji.

Navodilo je bilo odobreno 07. 08. 2012.

NASLEDNJE INFORMACIJE SO NAMENJENE SAMO ZDRAVSTVENEMU OSEBJU

Priprava raztopine za infundiranje:

- Pri pripravi zdravila TAXOL morate uporabljati vsebnike in infuzijske sete, ki **ne vsebujejo DEHP-ja**. Na ta način se zmanjša izpostavljenost bolnika DEHP-ju [di-(2-etilheksil)ftalat], ki se lahko izluži iz plastičnih vsebnikov ali infuzijskih setov iz PVC-ja. Pri uporabi filtrov (npr. IVEX-2) s kratkimi dovodnimi in/ali odvodnimi cevkami iz PVC-ja, luženje DEHP-ja ni bilo pomembno.
- **Z zdravilom TAXOL morate ravnati previdno**, tako kot z vsemi antineoplastičnimi zdravili. Pri rokovanju z vialami, ki vsebujejo paklitaksel, morate vedno uporabljati ustrezne zaščitne rokavice. Redčenje mora opraviti ustrezno usposobljena oseba v aseptičnih pogojih na zato namenjenem mestu. Če pride zdravilo v stik s kožo, morate izpostavljeni predel umiti z milom in vodo. Če pride zdravilo v stik s sluznico, morate sluznico temeljito izprati z vodo.
- Pripomočka "*Chemo-Dispensing Pin*" ali podobnih pripomočkov s konico ne smete uporabljati, ker lahko povzročijo sesedanje zamaška viala in izgubo sterilnosti.

Korak 1: Redčenje koncentrata

Pred aplikacijo morate zdravilo TAXOL dodatno razredčiti s/z:

- 0,9 % raztopino natrijevega klorida,
- 5 % raztopino glukoze,
- 5 % raztopino glukoze in 0,9 % raztopino natrijevega klorida za injiciranje, ali
- 5 % raztopino glukoze za injiciranje v Ringerjevi raztopini.

Raztopina, pripravljena za infundiranje, mora vsebovati koncentracijo paklitaksela v razponu od 0,3 mg/ml do 1,2 mg/ml. Uporabiti morate vsebnike in infuzijske sete, ki ne vsebujejo DEHP-ja.

Po pripravi je razredčena raztopina lahko nekoliko motna, kar je posledica vehikla, ki ga vsebuje ta farmacevtska oblika. Motnosti ni mogoče odstraniti s filtracijo. Pri simulaciji aplikacije raztopine po intravenskem sistemu s filtrom v infuzijski liniji niso ugotovili pomembnega zmanjšanja jakosti zdravila.

Korak 2: Infundiranje zdravila

Pred začetkom infundiranja zdravila mora vsak bolnik prejeti **premedikacijo** s kortikosteroidi, antihistaminiki in antagonisti histaminskih receptorjev H₂.

Bolnik zdravila TAXOL ne sme prejeti znova, dokler ni število nevtrofilcev $\geq 1.500/\text{mm}^3$ ($\geq 1.000/\text{mm}^3$ pri bolnikih s Kaposijevim sarkomom) in število trombocitov $\geq 100.000/\text{mm}^3$ ($\geq 75.000/\text{mm}^3$ pri bolnikih s Kaposijevim sarkomom).

Preprečite precipitacijo raztopine za infundiranje:

- Zdravilo aplicirajte čimprej po redčenju raztopine.
- Izogibajte se čezmernemu stresanju, vibracijam ali tresenju.
- Pred aplikacijo infuzijske sete temeljito izperite.
- Med infundiranjem redno preverjajte videz raztopine. Če se pojavi oborina, infundiranje zdravila prekinite.

Kemijsko in fizikalno stabilnost razredčene raztopine, pripravljene za infundiranje, so dokazali pri 5 °C in pri 25 °C. Pri redčenju s 5 % raztopino glukoze je raztopina stabilna 7 dni, pri redčenju z 0,9 % raztopino natrijevega klorida pa 14 dni. Z mikrobiološkega stališča je treba zdravilo uporabiti takoj po redčenju ali pa ga shraniti pri temperaturi od 2 °C do 8 °C za največ 24 ur.

Zdravilo TAXOL morate aplicirati intravensko preko infuzijske linije z membranskim filtrom z velikostjo mikropor $\leq 0,2$ mikrometra. **Pri aplikaciji zdravila morate uporabiti infuzijske vsebnike in druge pripomočke za aplikacijo, ki ne vsebujejo DEHP-ja.** Pri uporabi filtrov s kratkimi dovodnimi in/ali odvodnimi plastičnimi cevkami luženje DEHP-ja ni bilo pomembno.

Korak 3: Odstranjevanje

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavržite v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje citotoksičnih spojin.

Odmerek:

Priporočeni odmerki zdravila TAXOL za intravensko infundiranje so:

Indikacija	Odmerek	Interval med posameznimi cikli zdravljenja z zdravilom TAXOL
Zdravljenje prve izbire karcinoma jajčnika	135 mg/m ² v obliki 24-urne intravenske infuzije, ki mu sledi cisplatin v odmerku 75 mg/m ² <u>ali</u> 175 mg/m ² v obliki 3-urne intravenske infuzije, ki mu sledi cisplatin v odmerku 75 mg/m ²	3 tedni
Zdravljenje druge izbire karcinoma jajčnika	175 mg/m ² v obliki 3-urne intravenske infuzije	3 tedni
Adjuvantno zdravljenje karcinoma dojke	175 mg/m ² v obliki 3-urne intravenske infuzije, po zdravljenju z antraciklinom in ciklofosfamidom (AC)	3 tedni
Zdravljenje prve izbire karcinoma dojke (z doksorubicinom)	220 mg/m ² v obliki 3-urne intravenske infuzije, 24 ur po aplikaciji doksorubicina (50 mg/m ²)	3 tedni
Zdravljenje prve izbire karcinoma dojke (s trastuzumabom)	175 mg/m ² v obliki 3-urne intravenske infuzije, po trastuzumabu (glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila trastuzumab)	3 tedni
Zdravljenje druge izbire karcinoma dojke	175 mg/m ² v obliki 3-urne intravenske infuzije	3 tedni
Napredovali nedrobnocelični karcinom pljuč	175 mg/m ² v obliki 3-urne intravenske infuzije, ki mu sledi cisplatin v odmerku 80 mg/m ²	3 tedni
Z AIDS-om povezani Kaposijev sarkom	100 mg/m ² v obliki 3-urne intravenske infuzije	2 tedna

Bolnik zdravila TAXOL ne sme prejeti znova, dokler ni število nevtrofilcev $\geq 1.500/\text{mm}^3$ ($\geq 1.000/\text{mm}^3$ pri bolnikih s Kaposijevim sarkomom) in število trombocitov $\geq 100.000/\text{mm}^3$ ($\geq 75.000/\text{mm}^3$ pri bolnikih s Kaposijevim sarkomom).

Pri bolnikih s hudo nevtropenijo (število nevtrofilcev $< 500/\text{mm}^3$, ki traja teden dni ali dlje) ali hudo periferno nevropatijo po predhodnem odmerku, je treba pri naslednjih ciklih odmerkov zmanjšati za 20 % (pri bolnikih s Kaposijevim sarkomom za 25 %) (glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila).

Zaradi nezadostnih podatkov pri bolnikih z blago do zmerno okvaro jeter ne moremo podati priporočil za spremembo odmerka. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter se zdravilo TAXOL ne sme uporabljati (glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila).

Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in učinkovitosti uporaba zdravila TAXOL pri otrocih, mlajših od 18 let, ni priporočljiva.