

Navodilo za uporabo

Lorazepam Macure 4 mg/ml raztopina za injiciranje

lorazepam

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Lorazepam Macure in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Lorazepam Macure
3. Kako uporabljati zdravilo Lorazepam Macure
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Lorazepam Macure
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Lorazepam Macure in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Lorazepam Macure spada v skupino zdravil s pomirjevalno-uspavalnim učinkom, ki jim pravimo benzodiazepini.

Zdravilo Lorazepam Macure se lahko uporablja pri odraslih in mladostnikih, starejših od 12 let:

- kot pomirjevalo pred določenimi posegi (predzdravljenje), na primer manjšimi ali večjimi kirurškimi posegi ali določenimi obsežnimi telesnimi pregledi;
- pri ljudeh, pri katerih se pojavljajo hudi strahovi ali napetost in iz katerega koli razloga ne morejo jemati tablet.

Zdravilo Lorazepam Macure se lahko uporablja tudi pri odraslih, mladostnikih, otrocih in novorojenčkih, starih 1 mesec in več:

- za nadzor epileptičnega statusa (status epilepticus).

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Lorazepam Macure

Zdravila Lorazepam Macure ne smete prejeti:

- če ste alergični na učinkovino, druge benzodiazepine, benzodiazepinom podobne snovi ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če imate miastenijo gravis (bolezen, pri kateri se pojavi šibkost mišic ali prekomerna utrujenost);
- če imate hude motnje dihanja;
- če imate sindrom apneje med spanjem (težave z dihanjem med spanjem);
- če imate hude težave z jetri.

Zdravilo Lorazepam Macure se ne sme injicirati v arterijo.

Otroci

Otroci, mlajši od 12 let, ne smejo uporabljati zdravila Lorazepam Macure, razen za nadzor epileptičnega statusa (status epilepticus). Pri novorojenčkih se zdravila Lorazepam Macure za nadzor epileptičnega statusa ne sme uporabljati.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Lorazepam Macure se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro:

- če imate kronično bolezen dihal;
- če imate zmanjšano delovanje jeter ali ledvic;
- če ste starejši ali oslabei;
- če imate epilepsijo;
- če imate »zeleno mreno« (akutni glavkom ozkega zakotja);
- če načrtujete nosečnost ali ste že noseči;
- če dojite, saj zdravilo lahko prehaja v materino mleko.

Opazovati vas bo treba 24 ur po dajanju zdravila Lorazepam Macure. Poskus zgodnje hoje (manj kot 8 ur po uporabi zdravila Lorazepam Macure) se lahko konča s padcem in poškodbo.

Zmanjšana pozornost je lahko prisotna tudi več kot 24 ur, zlasti če ste starejši ali uporabljate tudi druga zdravila.

Če se zdravite ambulantno in se zdravilo Lorazepam Macure uporabi pri kratkem posegu, vas mora ob odpustu spremljati odgovorna odrasla oseba.

Še 24 - 48 ur po dajanju zdravila ne smete voziti ali opravljati dejavnosti, pri katerih je potrebna pozornost.

Morda se ne boste spominjali dogajanja v določenem času po dajanju zdravila Lorazepam Macure.

Po zdravljenju se morda ne boste spominjali dogajanja v določenem času po prejemu zdravila Lorazepam Macure.

Bolniki z duševnimi motnjami

Zdravilo Lorazepam Macure ni prva izbira za zdravljenje duševnih motenj. Pri depresivnih bolnikih se zdravila Lorazepam Macure ne sme uporabljati brez ustreznega zdravljenja z antidepresivi.

Benzodiazepini lahko zmanjšajo delovanje zaviralnih mehanizmov in tako povzročijo samomorilna nagnjenja.

Z zdravljenjem z zdravilom Lorazepam Macure je treba prenehati postopno.

Uporaba zdravila Lorazepam Macure lahko povzroči odvisnost

Uporaba benzodiazepinov lahko povzroči telesno ali duševno odvisnost. Zaradi zmanjšanja tveganja za odvisnost je treba uporabiti najmanjši še učinkovit odmerek zdravila Lorazepam Macure, čas zdravljenja pa mora biti čim krajši.

Če nenadoma prenehate z zdravljenjem, se lahko pri vas pojavijo odtegnitveni simptomi: glavobol, bolečine v mišicah, izredno hud strah, napetost, nemir, zmedenost, razdražljivost, nihanje razpoloženja, depresija in nespečnost.

Poleg tega se lahko začasno vrnejo simptomi, zaradi katerih ste dobili zdravilo Lorazepam Macure (glejte tudi »Če ste prenehali uporabljati zdravilo Lorazepam Macure« v poglavju 3).

Toleranca

Po ponavljajoči se uporabi v obdobju več tednov lahko pride do izgube učinka.

Starejši ali oslabei bolniki in otroci

Pri starejših in otrocih se lahko pojavijo odzivi, ki so popolnoma nasprotni temu, kar bi pričakovali od zdravljenja z zdravilom Lorazepam Macure, kot so nemir, vznemirjenje, napadalnost, blodnje, napadi besa, nočne more, določene duševne motnje (psihoze), neprimerno in drugo ključevalno vedenje. Če se pojavijo ti odzivi, bo zdravnik takoj ustavil zdravljenje.

Otroci so lahko alergični na nekatere pomožne snovi v zdravilu Lorazepam Macure (glejte poglavje »Zdravilo Lorazepam Macure vsebuje benzilalkohol, polietilenglikol in propilenglikol«).

Druga zdravila in zdravilo Lorazepam Macure

Obvestite zdravnika, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Sočasna uporaba z naslednjimi zdravili lahko okrepi pomirjevalni/blažilni učinek zdravila Lorazepam Macure:

- skopolamin (zdravilo za potovalno bolezen in črevesne težave),
- antipsihotiki,
- uspavalne tablete,
- pomirjevala,
- antidepressivi,
- mišični relaksanti,
- določena močno aktivna zdravila proti bolečini na recept (protibolečinski narkotiki),
- zdravila za zdravljenje epilepsije,
- zdravila, ki se uporabljajo za težave z dihanjem (teofilin/aminofilin),
- zdravila, ki povzročajo splošno ali lokalno anestezijo (anestetiki),
- zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje alergij ali potovalne bolezni (antihistaminiki),
- zdravila za zdravljenje protina (putike) in visoke vrednosti sečne kisline v krvi (npr. probenecid),
- disulfiram (zdravilo za zdravljenje kroničnega alkoholizma),
- metronidazol (antibiotik).

Sočasna uporaba lorazepama in opioidov (močnih protibolečinskih zdravil, zdravil za nadomestno opioidno zdravljenje in določenih zdravil za zdravljenje kašlja) zveča tveganje za zaspanost, težave z dihanjem (dihhalno depresijo) in komo ter je lahko smrtno nevarna. Zaradi tega pride sočasna uporaba v poštev samo takrat, ko ni drugih možnosti zdravljenja.

Če vam zdravnik predpiše zdravilo Lorazepam Macure sočasno z opiodi, mora omejiti velikost odmerka in trajanje zdravljenja.

Obvestite zdravnika o vseh opioidnih zdravilih, ki jih jemljete, in se natančno držite priporočil za odmerjanje, ki jih je dal zdravnik. Lahko je koristno, da prijatelje in sorodnike opozorite, naj bodo pozorni na navedene znake in simptome. Posvetujte se z zdravnikom, če se pri vas pojavijo taki simptomi.

Zdravilo Lorazepam Macure skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Sočasno pitje alkoholnih pijač lahko okrepi pomirjujoči/blažilni učinek zdravila Lorazepam Macure.

Ta učinek lahko vztraja do 48 ur po dajanju zdravila Lorazepam Macure.

Ne uživajte alkohola do 48 ur po prejemu zdravila Lorazepam Macure.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo.

Zdravilo Lorazepam Macure smete med nosečnostjo uporabljati le, če je to nujno potrebno, in sicer za najkrajši možen čas in v najmanjšem možnem odmerku.

Lorazepam se v majhnih količinah izloča v materino mleko. Dojenje med jemanjem zdravila Lorazepam Macure ni priporočljivo.

Ni podatkov o morebitnih učinkih lorazepama, danega z injekcijo ali infuzijo, na plodnost pri ženskah. Poleg tega zdravilo Lorazepam Macure vsebuje benzilalkohol, konzervans, ki lahko prehaja skozi posteljico in se izloča v materino mleko. Zdravilo Lorazepam Macure vsebuje tudi propilenglikol (glejte »Zdravilo Lorazepam Macure vsebuje benzilalkohol, propilenglikol in polietilenglikol«).

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Pri upravljanju vozil in strojev se morate biti sposobni pravilno in hitro odzivati in odločati. Poleg tega je potrebno hitro in natančno premikanje.

Če prejmete zdravilo Lorazepam Macure, se lahko zmanjša nadzor, ki ga imate nad temi funkcijami, saj lahko zdravilo Lorazepam Macure negativno vpliva na budnost, odzivnost, spomin in natančnost mišičnih gibov.

Zato še 24 - 48 ur po prejemu zdravila ne smete voziti ali opravljati dejavnosti, pri katerih je potrebna pozornost.

Zdravilo Lorazepam Macure vsebuje benzilalkohol, propilenglikol in polietilenglikol

Zdravilo Lorazepam Macure vsebuje 21 mg benzilalkohola, 840 mg propilenglikola in 189 mg polietilenglikola v enem ml.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če je vaš otrok star manj kot 5 let, če imate bolezen jeter ali ledvic oziroma če ste noseči ali dojite. Pomožne snovi lahko namreč povzročijo neželene učinke. Zdravnik bo morda moral prilagoditi odmerke, če vi ali vaš otrok uporabljate druga zdravila, ki vsebujejo benzilalkohol, propilenglikol ali alkohol.

Benzilalkohol lahko povzroči alergijske reakcije.

Benzilalkohol je povezan s tveganjem za resne neželene učinke, vključno s težavami z dihanjem (imenovanimi »sindrom sopenja«) pri majhnih otrocih. Zdravil, ki vsebujejo benzilalkohol, ni dovoljeno dajati novorojenčkom (starim do 4 tedne) in jih ni dovoljeno uporabljati dlje kot en teden pri majhnih otrocih (starih manj kot 3 leta), razen če tako svetuje zdravnik ali farmacevt.

Če ste noseči ali dojite, ne vzemite tega zdravila, če vam ga ne priporoči vaš zdravnik. Vaš zdravnik bo morda opravil dodatne preiskave med jemanjem tega zdravila.

Če imate bolezen jeter ali ledvic, ne vzemite tega zdravila, če vam ga ne priporoči vaš zdravnik. Vaš zdravnik bo morda opravil dodatne preiskave med jemanjem tega zdravila.

Med dajanjem lorazepama so poročali o toksičnosti polietilenglikola (npr. akutna tubularna nekroza). To vključuje primere dajanja večjih odmerkov lorazepama od priporočenih.

3. Kako uporabljati zdravilo Lorazepam Macure

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.

1. Predzdravljenje

Priporočeni odmerek, ki se običajno daje v žilo (intravensko), temelji na telesni masi (0,044 mg na kg telesne mase), skupno do 2 mg, 15 do 20 minut pred načrtovanim posegom. Včasih je mogoče dati večje odmerke, do 4 mg.

Priporočeni odmerek, ki se običajno daje v mišico (intramuskularno), je 0,05 mg na kg telesne mase, do največ 4 mg, najmanj 2 uri pred načrtovanim posegom.

2. Zdravljenje simptomov resne anksioznosti in napetosti pri posameznikih, ki ne morejo vzeti tablet.

Priporočeni odmerek je 2 do 4 mg, tj. 0,05 mg na kg telesne mase. Po potrebi je odmerek mogoče ponoviti po 2 urah. Injekcija se daje v žilo (intravensko) ali v mišico (intramuskularno).

3. Epileptični status

Odmerek pri odraslih: 4 mg intravensko.

Starejši (stari več kot 65 let): Starejši se lahko odzivajo že na manjši odmerek; zato lahko zadostuje že polovica običajnega odmerka za odraslo osebo.

Odmerjanje pri mladostnikih, otrocih in novorojenčkih od 1 meseca starosti: 0,1 mg/kg telesne mase intravensko, in sicer največ 4 mg/odmerek.

Če epileptični napad traja več kot 10–15 minut, se lahko zdravnik odloči za dajanje dodatnega odmerka. Dovoljeno je dati največ 2 odmerka.

Vaš otrok ne sme prejeti več kot dveh zaporednih odmerkov v enem dnevu, če je star manj kot 5 let.

Uporaba pri otrocih

Zdravilo Lorazepam Macure se ne sme uporabljati pri otrocih, mlajših od 12 let, razen za nadzor epileptičnega statusa (glejte tudi poglavje 2). Pri novorojenčkih se ga ne sme uporabljati niti za nadzor epileptičnega statusa (glejte poglavje 2).

Uporaba pri starejših in oslabeledih bolnikih

Zdravnik vam bo predpisal manjši odmerek. Poleg tega bo zdravnik redno preverjal vaše stanje in prilagajal odmerek na podlagi vašega odziva.

Bolniki z boleznimi ledvic ali jeter

Zdravilo Lorazepam Macure se ne sme uporabljati pri bolnikih s hudo boleznijo jeter. Če se zdravilo Lorazepam Macure uporablja pri bolnikih z blago do zmerno boleznijo jeter ali ledvic, vam bo zdravnik morda predpisal manjši odmerek.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Lorazepam Macure, kot bi smeli

Če dobite več zdravila, kot bi smeli, se pri vas lahko pojavijo simptomi, kot so zaspanost, umska zmedenost in otopelost pri blagem prevelikem odmerjanju, v hudih primerih pa nizek krvni tlak, težave s kontrolo gibov, težave z dihanjem in koma.

Zdravljenje prevelikega odmerjanja večinoma vključuje podporne ukrepe, vključno z vzdrževanjem dihanja in spremljanjem ravnovesja tekočine (koliko tekočine zaužijete in izločite).

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Lorazepam Macure

Zdravljenje z zdravilom smete začasno ali trajno prekiniti le v skladu z zdravnikovimi navodili.

Če se zdravite zaradi simptomov hude anksioznosti in se zdravljenje nenadoma preneha, morate upoštevati možnost pojava enega ali več od naslednjih odtegnitvenih simptomov: glavobol, bolečine v mišicah, izredno hud strah, anksioznost, napetost, vznemirjenje, nemir, zmedenost, razdražljivost, nihanja razpoloženja, potenje, depresija in nespečnost.

V resnejših primerih lahko odtegnitveni simptomi vključujejo: izgubo občutkov, izgubo stika z realnostjo, kjer se (znano) okolje zdi neresnično, odtujenost samega sebe in samopodobe (depersonalizacija), omrtvičenost in ščemenje v rokah in nogah, močno zvečano občutljivost na svetlobo, hrup in dotik, ojačan sluh, bolečine v ušesih, nehotene gibe, bruhanje, blodnje (halucinacije) ali epileptične napade (božjast).

Poleg tega se lahko začasno v ojačani obliki vrnejo simptomi, zaradi katerih ste dobili zdravilo Lorazepam Macure.

Za zmanjšanje tveganja za pojav teh simptomov se priporoča postopna ukinitvev zdravljenja, s postopnim zmanjševanjem odmerka.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Neželeni učinki se ponavadi pojavijo na začetku zdravljenja in postopno izzvenijo med zdravljenjem ali po zmanjšanju odmerka.

Po uporabi lorazepama so poročali o naslednjih neželenih učinkih:

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- utrujenost.

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- zaspanost podnevi,
- zaspanost,

- omotica,
- težave s koordinacijo,
- bruhanje,
- šibkost mišic.

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- zmedenost,
- depresija,
- čustvena plitkost,
- moten spanec,
- glavobol,
- zmanjšana pozornost,
- motnje vida,
- dvojni vid (diplopija),
- slabost s siljenjem na bruhanje,
- prebavne motnje,
- kožne reakcije, izguba las,
- sprememba libida.

Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- nenormalni izvidi krvi (diskrazija),
- začasna izguba spomina,
- nasprotujoče si reakcije,
- znižan krvni tlak (hipotenzija),
- zvišan krvni tlak (hipertenzija),
- odstopanja, povezana z boleznijo jeter,
- psihiatrične motnje: vznemirjenost (agitiranost), živčnost, razdražljivost, napadalnost, sumničavost, napadi besa, nočne more, zaznava neobstojećih stvari (halucinacije), huda duševna bolezen, pri kateri sta motena vedenje in nadzor nad vedenjem (psihoza), neprimerno vedenje. Ti neželeni učinki se večinoma pojavljajo pri otrocih in starejših osebah.

Drugi neželeni učinki:

- nenadne preobčutljivostne reakcije (v nekaj minutah ali urah), vključno s težavami z dihanjem, kožnim izpuščajem in omedlevico (anafilaktične/anafilaktoidne reakcije); lahko so smrtno nevarne;
- nenormalni izvidi krvi (trombocitopenija, agranulocitoza, pancitopenija);
- poročali so o bolečini, pekočem občutku, rdečini in vnetju na mestu injiciranja;
- pri ponavljanju se uporabi v obdobju več tednov se lahko pojavi odvisnost (glejte poglavje 2);
- lahko se pojavijo težave z dihanjem pri močni anesteziji;
- po ukinitvi zdravljenja se lahko pojavijo odtegnitveni simptomi (glejte poglavje »Če ste prenehali uporabljati zdravilo Lorazepam Macure«);
- otekanje;
- samomorilne misli in poskusi samomora;
- težave z govorom;
- epileptični napadi;
- koma;
- znižana telesna temperatura.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Lorazepam Macure

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C - 8 °C).
Shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Kemična in fizikalna stabilnost med uporabo je bila dokazana za 1 uro pri temperaturi 2 - 8 °C. Z mikrobiološkega vidika je treba zdravilo uporabiti takoj, razen če metoda odprtja/redčenja preprečuje tveganje za kontaminacijo z mikrobi. Če se zdravilo ne uporabi takoj, je za čas in pogoje shranjevanja med uporabo odgovoren uporabnik.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatli poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte tega zdravila, če opazite vidne delce v raztopini.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Lorazepam Macure

- Učinkovina je lorazepam. 1 ml raztopine vsebuje 4 mg lorazepama.
- Druge sestavine zdravila so propilenglikol (E1520), polietilenglikol 400 (makrogol 400) in benzilalkohol.

Izgled zdravila Lorazepam Macure in vsebina pakiranja

Bistra, brezbarvna ali skoraj brezbarvna hipertonična raztopina, brez vidnih delcev.

Zdravilo Lorazepam Macure je pakirano v ampulo iz brezbarvnega stekla tipa I (Ph. Eur.) s kapaciteto polnjenja 2 ml.

Ena ampula vsebuje 1 ml raztopine.

Ampule so vložene v po meri oblikovane pladnje iz polivinilklorida, ki so zatesnjeni z zaščitno prozorno PE folijo. Pladnji iz polivinilklorida so pakirani v kartonske škatle, skupaj z navodilom za uporabo.

Zdravilo Lorazepam Macure je na voljo v pakiranju s 5 ali 10 ampulami, ki vsebujejo po 1 ml raztopine.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način predpisovanja in izdaje zdravila Lorazepam Macure

ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Macure Pharma ApS
Hejrevej 39
2400 Copenhagen NV
Danska

Proizvajalec

Medochemie Ltd
48 Iapetou Street, Agios Athanassios Industrial Area
4101 Agios Athanassios, Limasol
Ciper

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Nizozemska	Lorazepam Macure 4 mg/ml oplossing voor injectie
Danska	Lorazepam Macure
Švedska	Lorazepam Macure 4 mg/ml injektionsvätska, lösning
Finska	Lorazepam Macure 4 mg/ml injektioneste, liuos
Avstrija	Lorazepam Macure 4 mg/ml Injektionslösung
Nemčija	Lorazepam Macure 4 mg/ml Injektionslösung
Norveška	Lorazepam Macure
Belgija	Lorazepam Macure 4 mg/ml solution injectable/ oplossing voor injectie/ Injektionslösung
Irska	Lorazepam Macure 4 mg/ml solution for injection
Italija	Lorazepam Macure
Slovenija	Lorazepam Macure 4 mg/ml raztopina za injiciranje

Navodilo je bilo nazadnje revidirano 29.8.2024.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenim delavcem:

Navodila za uporabo

Zdravilo Lorazepam Macure je rahlo viskozno, ko je hladno.

Intramuskularno dajanje:

Za lažje intramuskularno dajanje se priporoča redčenje z enakim volumnom združljive raztopine, kot so raztopina natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za injiciranje, raztopina glukoze 50 mg/ml (5 %) ter voda za injekcije.

Zdravilo Lorazepam Macure se lahko daje tudi nerazredčeno, če se injicira globoko v veliko mišično maso.

Intravensko dajanje:

V primeru intravenskega dajanja je treba zdravilo Lorazepam Macure vedno razredčiti z enakim volumnom enega od naslednjih topil: raztopina natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za injiciranje, raztopina glukoze 50 mg/ml (5 %) ter voda za injekcije.

Hitrost injiciranja naj ne preseže 2 mg/min. Parenteralna zdravila je treba pred dajanjem vizualno pregledati glede prisotnosti delcev ali sprememb barve. Ne uporabljajte tega zdravila, če opazite, da se je raztopina obarvala ali da je prisotna usedlina.

Navodila za redčenje za intravensko uporabo

Povlecite želeno količino zdravila Lorazepam Macure v injekcijsko brizgo in nato vanjo počasi izvlecite želeno količino topila. Rahlo povlecite bat nazaj, da ustvarite dodaten prostor za mešanje. Takoj zmešajte vsebino, tako da obračate injekcijsko brizgo, dokler ne nastane homogena raztopina. Injekcijske brizge ne smete močno stresati, da ne nastanejo zračni mehurčki.

Zdravilo Lorazepam Macure se ne sme mešati z drugimi zdravili v isti injekcijski brizgi. Ne uporabljajte tega zdravila, če opazite, da se je raztopina obarvala ali da je prisotna usedlina.

Ni posebnih zahtev za odstranjevanje. Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.