

NAVODILO ZA UPORABO

RUPURUT forte 1000 mg žvečljive tablete hidrotalcit

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 14 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete
3. Kako jemati zdravilo Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO RUPURUT FORTE 1000 MG ŽVEČLJIVE TABLETE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete vsebuje zdravilno učinkovino hidrotalcit. Spada v skupino zdravil imenovanih antacidi. To zdravilo deluje tako, da zmanjšuje kislost želodčnega soka in s tem odpravlja ali blaži težave, povezane s prevelikim izločanjem želodčne kisline. Zdravilo Rupurut forte spodbuja dejavnike, ki varujejo želodčno sluznico ter pospešuje celjenje poškodovane želodčne sluznice.

Žvečljive tablete Rupurut forte uporabljamo pri simptomatskem zdravljenju motenj, pri katerih je zaželeno vezava želodčne kisline:

- zgaga in prebavne težave, ki jih povzroča hiperacidnost (povečano izločanje želodčne kisline),
- gastroezofagealni refluks (vračanje vsebine želodca v požiralnik),
- akutni in kronični gastritis (nenadno ali dlje časa trajajoče vnetje želodčne sluznice),
- razjede na želodcu in dvanajstniku.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO RUPURUT FORTE 1000 MG ŽVEČLJIVE TABLETE

Ne jemljite zdravila Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete

- če ste alergični (preobčutljivi) na hidrotalcit ali katerikoli sestavino zdravila Rupurut forte,
 - če imate hudo okvaro ledvic,
 - če imate nenormalno znižano koncentracijo fosfatov v krvi,
- če imate avtoimunsko bolezen, za katero so značilni mišična slabost in utrujenost (miastenijo gravis).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete

- če imate moteno delovanje ledvic (zlasti če ste na hemodializi), Alzheimerjevo bolezen ali drugo obliko demence ali ste na dieti z malo fosfata, se je treba izogibati velikim odmerkom in dolgotrajni izpostavljenosti zdravilu

Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Žvečljive tablete Rupurut forte ne smete jemati hkrati z zdravili, katerih absorpcija bi bila zaradi tega lahko motena (npr. zdravila za srce (glikozidi), antibiotiki (tetraciklini ali derivati kinolonov, kot sta ofloksacin in ciprofloksacin), zdravila za zdravljenje razjede v prebavilih (antagonisti histaminskih H₂-receptorjev), zdravila proti strjevanju krvi (derivati kumarina), natrijev fluorid, henodeoksiholat). Druga zdravila morate vzeti vsaj eno do dve uri pred ali po zaužitju zdravila Rupurut forte.

Jemanje zdravila Rupurut skupaj s hrano in pijačo

Zdravila Rupurut ne smete jemati sočasno s hrano, ki vsebuje kislino (npr. vino, sadni sokovi,...) zaradi povečanega prehajanja aluminijevega hidroksida iz prebavil v kri.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Zdravilo Rupurut forte se lahko med nosečnostjo uporablja le kratek čas, da se tako zmanjša izpostavljenost nerojenega otroka aluminiju.

Snovi, ki vsebujejo aluminij, se običajno izločajo v materino mleko. Podatkov o izločanju zdravila Rupurut forte v materino mleko ni.

Matere, ki dojijo, zdravilo lahko uporabljajo po posvetu z zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev pri zdravilu Rupurut forte niso opazili.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete
Zdravilo vsebuje vir fenilalanina. Lahko škoduje ljudem s fenilketonurijo.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO RUPURUT FORTE 1000 MG ŽVEČLJIVE TABLETE

Pri jemanju zdravila Rupurut forte natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Za simptomatsko zdravljenje

- zgage in prebavnih motenj, ki jih povzroča hiperacidnost (povečano izločanje želodčne kisline): vzemite eno tableto po potrebi (1000 mg hidrotalcita); največji dnevni odmerek je 6000 mg hidrotalcita (6 tablet).

- gastroezofagealnega refluksa (vračanje vsebine želodca v požiralnik) ter akutnega in kroničnega gastritisa (nenadno ali dlje časa trajajoče vnetje želodčne sluznice): vzemite eno tableto (1000 mg

hidrotalcita) eno do dve uri po jedi, pred spanjem ali ob pojavu želodčnih težav; največji dnevni odmerek je 6000 mg hidrotalcita (6 tablet)

- razjede na želodcu in dvanajstniku: vzemite eno tableto (1000 mg hidrotalcita) tri- do štirikrat na dan, eno do dve uri po jedi in pred spanjem; največji dnevni odmerek je 6000 mg hidrotalcita (6 tablet); zdravljenje morate nadaljevati najmanj 4 tedne potem, ko simptomi popolnoma izginejo.

Žvečljive tablete Rupurut forte delujejo najbolje, če jih dobro prežvečite, ne smete pa pogoltniti celih.

Žvečljivih tablet Rupurut forte ne priporočamo otrokom do 12. leta starosti.

Če se stanje po jemanju zdravila v 14 dneh ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete, kot bi smeli
Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Rupurut forte neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Bolezni prebavil

Pri visokih odmerkih: mehko blato, pogostejše odvajanje blata, bruhanje, driska.

Preiskave: zmanjšanje serumske koncentracije fosforja, zvišanje koncentracije magnezija v krvi

Bolezni imunskega sistema

Alergijske reakcije

Dolgotrajno zdravljenje bolnikov z motnjami v delovanju ledvic lahko vodi do zastrupitev z aluminijem, ki prizadene kosti (osteomalacija – mehkost kosti s simptomi kot so bolečine v kosteh in mišicah) in možgane (encefalopatija).

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA RUPURUT FORTE 1000 MG ŽVEČLJIVE TABLETE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete

- Zdravilna učinkovina je hidrotalcit.
- Pomožne snovi so: predgelirani škrob, mikrokristalna celuloza (E460), premreženi natrijev karmelozat (E468), brezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat (E572), ksilitol (E967), aroma poprove mete, aroma janeža, aspartam (E951).

Izgled zdravila Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete in vsebina pakiranja

Zdravilo Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete so bele, okrogle, z vonjem poprove mete. Zdravilo Rupurut forte 1000 mg je na voljo v škatli z 20 tabletami (2 x 10 tablet v PP/Al pretisnem omotu).

Način in režim izdaje zdravila:

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Bayer d. o. o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana

Izdelovalec

Catalent Germany Schorndorf GmbH, Steinbeisstrasse 1-2, 73614 Schorndorf, Nemčija

Navodilo je bilo odobreno:

23.9.2011