Navodilo za uporabo

Pamorelin 22,5 mg prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
triptorelin

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Pamorelin 22,5 mg in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Pamorelin 22,5 mg
3. Kako uporabljati zdravilo Pamorelin 22,5 mg
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Pamorelin 22,5 mg
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Pamorelin 22,5 mg in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Pamorelin 22,5 mg vsebuje triptorelin, ki je podoben hormonu, imenovanemu gonadotropin sproščajoči hormon (analog GnRH). Zdravilo je na voljo v dolgo delujoči obliki in je izdelano tako, da se v 6-mesečnem obdobju (štiriindvajset tednov) počasi sprošča 22,5 mg triptorelina. Triptorelin pri moških zmanjšuje koncentracije hormona testosterona, pri ženskah pa koncentracije estrogena.

Pri odraslih moških zdravilo Pamorelin 22,5 mg uporabljamo za zdravljenje lokalno napredovalega hormonsko odvisnega raka prostate in hormonsko odvisnega raka prostate, ki se je že razširil v druge dele telesa (metastatska oblika raka). Uporabljamo ga tudi za zdravljenje visokorizičnega lokaliziranega in lokalno napredovalega hormonsko odvisnega raka prostate v kombinaciji z obsevanjem.

Pri otrocih, starih 2 leti in starejših, zdravilo Pamorelin 22,5 mg uporabljamo za zdravljenje zelo zgodnjega nastopa pubertete, to je pred dopolnjenim 8. letom pri deklicah in 10. letom pri dečkih (v nadaljevanju »prezgodnja puberteta«).

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Pamorelin 22,5 mg

Ne uporabljajte zdravila Pamorelin 22,5 mg
- če ste alergični na triptorelinijev embonat, gonadotropin sproščajoči hormon (GnRH), druge analoge GnRH ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če ste noseči ali dojite.

Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe zdravila Pamorelin 22,5 mg se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- Če se pri vas pojavi depresivno razpoloženje. Pri bolnikih, ki so uporabljali zdravilo Pamorelin 22,5 mg, so poročali o pojavu depresije, ki je lahko huda. Zdravnik bo morda želel spremljati vašo depresijo med zdravljenjem.
- Če uporabljate zdravila za preprečevanje nastajanja krvnih strdkov, saj se lahko na mestu injiciranja pojavi modrica.

- Če se pojavijo krči, takoj obvestite svojega zdravnika. O krčih so poročali pri bolnikih, ki so prejemali triptorelin ali podobna zdravila. Ti so se pojavili pri bolnikih z epilepsijo ali brez nje.

Zdravilo se lahko injicira le v mišico.

Moški
- Pri odraslih lahko zdravilo Pamorelin 22,5 mg povzroči krhkost kosti (osteoporozo), kar poveča možnost zloma kosti. Če že imate katerega od spodaj navedenih dejavnikov tveganja, o tem obvestite zdravnika, saj vam bo morda predpisal bisfosfonate (zdravila za zdravljenje krhkosti kosti) za zdravljenje zmanjšanja izgube kostnine. Dejavniki tveganja lahko vključujejo:
    - Če imate ali ima kdo od vaših bližnjih sorodnikov krhkost kosti.
    - Če popijete prekomerne količine alkohola in/ali veliko kadite in/ali se slabo prehranjujete.
    - Če se že dlje časa zdravite z zdravili, ki povzročajo oslabelost kosti, kot so zdravila za zdravljenje epilepsije ali steroidi (npr. hidrokortizon ali prednizolon).
- Če imate kakršne koli težave s srcem ali krvnimi žilami, vključno s težavami s srčnim ritmom (aritmija), ali se zdravite z zdravili za zdravljenje teh težav. Pri uporabi zdravila Pamorelin 22,5 mg se tveganje za težave s srčnim ritmom lahko poveča.
- Če imate sladkorno bolezen ali kakršne koli težave s srcem ali ožiljem.
- Na začetku zdravljenja se koncentracija testosterona v telesu prehodno poveča. Zaradi tega se simptomi raka lahko poslabšajo. V takem primeru se posvetujte z zdravnikom. Zdravnik vam lahko predpiše zdravljenje z zdravilom (antiandrogenom), ki bo preprečilo, da bi se simptomi bolezni poslabšali.
- Med prvimi tedni zdravljenja boste morda imeli (tako kot pri zdravljenju z drugimi analogi GnRH) simptome zaradi stiska hrbtenjače (npr. bolečina, odrevenelost ali oslabelost nog) ali zaradi zapore sečnice (izvodilo, po katerem odteka urin iz sečnega mehurja). Če opazite katerega izmed teh simptomov, se nemudoma posvetujte z zdravnikom, ki vas bo pregledal in uvedel ustrezno zdravljenje teh stanj.
- Če so vam operacijsko odstranili spolne žleze, triptorelin nima več nobenega vpliva na nadaljnje zmanjševanje koncentracije testosterona v serumu, zato se ga ne sme več uporabljati.
- Če bodo pri vas opravili diagnostično preiskavo delovanja hipofize ali spolnih organov, so rezultati lahko zavajajoči, če se zdravite z zdravilom Pamorelin 22,5 mg ali ste ravnokar prenehali zdravljenje z zdravilom Pamorelin 22,5 mg.
- Med zdravljenjem z zdravilom Pamorelin 22,5 mg se lahko odkrije povečanje hipofize (benigni tumor), ki je bilo brez simptomov prisotno že pred uvedbo zdravljenja s tem zdravilom. Simptomi vključujejo nenaden glavobol, bruhanje, težave z vidom in paralizo očesnih zrkel.
- Zdravila za zniževanje testosterona lahko povzročijo spremembe v EKG, ki so povezane z neobičajnim srčnim ritmom (podaljšanjem intervala QT).
- Zdravljenje z analogi GnRH, vključno z zdravilom Pamorelin 22,5 mg, lahko poveča tveganje za anemijo (opredeljeno kot zmanjšanje števila rdečih krvnih celic).

Otroci
- Če ima otrok napredujoč možganski tumor, o tem obvestite zdravnika. To lahko vpliva na zdravnikovo odločitev o poteku zdravljenja.
- Pri deklicah s prezgodnjo puberteto se v prvem mesecu zdravljenja lahko pojavi blaga krvavitev iz nožnice.
- Če ima vaš otrok hud ali ponavljajoči se glavobol, težave z vidom, zvonjenje ali piskanje v ušesih, o tem nemudoma obvestite zdravnika (glejte poglavje 4).
- Po ukinitvi zdravljenja se bodo razvili značilni znaki pubertete.
  Pri večini deklic se menstruacija začne v povprečju eno leto po prenehanju zdravljenja.
  Zdravnik bo izključil možnost, da se je zgodnja puberteta pojavila zaradi drugih bolezni.
  Mineralna gostota kosti se lahko med zdravljenjem zmanjša, a se po prenehanju zdravljenja povrne na normalno vrednost.
- Po ukinitvi zdravljenja lahko pride do poškodbe kolčnega sklepa (zdrs epifize glavice stegnenice), ki se kaže kot okorelost kolka, šepanje in/ali huda bolečina v dimljah, ki se širi proti stegnu. V tem primeru se posvetujte z zdravnikom.

Če ste o kateri koli od zgornjih navedb v dvomih ali kakor koli zaskrbljeni, se posvetujte z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Pamorelin 22,5 mg
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zdravilo Pamorelin 22,5 mg lahko vpliva na delovanje nekaterih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje težav s srčnim ritmom (npr. kinidin, prokainamid, amjodaron in sotalol), ali pa lahko poveča tveganje za težave s srčnim ritmom pri sočasni uporabi z nekaterimi drugimi zdravili (npr. z metadonom (zdravilo, ki se uporablja za lajšanje bolečin in za zdravljenje zasvojenosti z drogami), moksifloksacinom (antibiotik), antipsihotiki (zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje hudih duševnih bolezni)).

Nosečnost, dojenje in plodnost
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo.

Če ste noseči, zdravila Pamorelin 22,5 mg ne smete jemati.

Če dojite, zdravila Pamorelin 22,5 mg ne smete jemati.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Zdravilo Pamorelin 22,5 mg lahko kljub uporabi po navodilih vpliva na odzivnost v takšnem obsegu, da zmanjša sposobnost upravljanja vozil in strojev. To je še posebej verjetno ob sočasnem uživanju alkohola. Pojavijo se lahko omotica, utrujenost ali težave z vidom, kot je zamegljen vid. To so lahko neželeni učinki zdravljenja ali pa posledica osnovne bolezni. Če se pri vas pojavi kateri koli od teh neželenih učinkov, ne smete voziti vozil ali upravljati strojev.

Zdravilo Pamorelin 22,5 mg vsebuje natrij
To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na vialo, kar v bistvu pomeni “brez natrija” in ga lahko uporabljajo bolniki, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

3. Kako uporabljati zdravilo Pamorelin 22,5 mg

Zdravilo Pamorelin 22,5 mg boste prejeli pod nadzorom zdravnika.

Moški
Zdravljenje raka prostate z zdravilom Pamorelin 22,5 mg je dolgotrajno.

Priporočeno trajanje zdravljenja visokoriziničnega lokaliziranega in lokalno napredovalega hormonsko odvisnega raka prostate v kombinaciji z obsevanjem je 2 do 3 leta.

Običajni odmerek je 1 viala zdravila Pamorelin 22,5 mg, ki ga boste prejeli v obliki injekcije v mišico vsakih šest mesecev (24 tednov). Zdravilo Pamorelin 22,5 mg se lahko injicira le v mišico.

Zdravnik lahko s krvnimi preiskavami spremlja učinkovitost zdravljenja.

Otroci
Običajni odmerek je ena injekcija vsakih 6 mesecev (24 tednov). Zdravilo Pamorelin 22,5 mg se lahko injicira le v mišico. Zdravnik bo odločil, kdaj je treba prenehati z zdravljenjem (pri deklicah običajno pri starosti od 12 do 13 let, pri dečkih pa pri starosti od 13 do 14 let).

Če menite, da je učinek zdravila Pamorelin 22,5 mg premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od naslednjih simptomov, nemudoma poiščite zdravniško pomoč:

Težave s požiranjem ali dihanjem, otekanje ustnic, obraza, žrela ali jezika ali pojav koprivnice. To so lahko znaki hude alergijske reakcije ali angioedema, o katerih so poročali v redkih primerih (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov).

Drugi neželeni učinki, ki se lahko pojavijo:

Moški

Kot pri zdravljenju z drugimi agonisti GnRH ali po opravljeni kirurški odstranitvi spolnih žlez je bila pri zdravljenju s triptorelinom večina pogosto opaženih neželenih učinkov posledica njegovih pričakovanih farmakoloških učinkov. Ti učinki vključujejo vročinske oblive in zmanjšanje želje po spolnosti.

Pri bolnikih, ki so se zdravili z analogi GnRH, so poročali o povečanju števila limfocitov. Z izjemo imuno-alergijskih reakcij in reakcij na mestu injiciranja, je za vse neželene učinke znano, da so povezani s spremenjenimi koncentracijami testosterona.

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov
- vročinski oblivi
- šibkost
- čezmerno znojenje
- bolečina v hrbtu
- občutek mravljinčenja v nogah
- zmanjšanje želje po spolnosti
- impotenca

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov
- slabost s siljenjem na bruhanje, suha usta
- bolečina, modrica, rdečina in oteklina na mestu injiciranja, bolečina v mišicah in kosteh, bolečina v rokah in nogah, edem (kopičenje tekočine v telesnih tkivih), bolečina v spodnjem delu trebuha
- visok krvni tlak
- alergijska reakcija
- povečanje telesne mase
- omotica, glavobol
- izguba želje po spolnosti, depresija, spremembe razpoloženja

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov
- povečanje števila trombocitov
- občutenje srčnega utripa
- zvonjenje v ušesih, vrtoglavica, zamegljen vid
- bolečina v trebuhu, zaprtje, driska, bruhanje
- dremavost, hudo tresenje, povezano z znojenjem in zvišano telesno temperaturo, zaspanost, bolečina
- vpliv na rezultate nekaterih krvnih preiskav (vključno s povečanimi vrednostmi jetrnih testov), zvišan krvni tlak
- zmanjšanje telesne mase

- pomanjkanje ali izguba apetita, povečanje apetita, protin (huda bolečina in otekanje sklepov, običajno palca na nogi), sladkorna bolezen, prekomerne vrednosti lipidov v krvi
- bolečina v sklepih, mišični krči, šibkost mišic, bolečina v mišicah, oteklina in občutljivost, bolečina v kosteh
- mravljinčenje ali odrevenelost
- nespečnost, razdražljivost
- povečanje dojk pri moških, bolečina v dojkah, zmanjšanje velikosti mod, bolečina v modih
- oteženo dihanje
- akne, izguba las, srbenje, izpuščaj, pordelost kože, koprivnica
- pogosto uriniranje ponoči, težko uriniranje
- krvavitev iz nosu

Redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov
- rdeče ali škrlatno obarvanje kože
- nenormalni občutki v očesu, zamegljen vid ali motnje vida
- občutek napihnjenosti v trebuhu, nabiranje plinov v želodcu ali črevesu, motnje čuta za okušanje
- bolečina v prsnem košu
- težave pri stanju na nogah
- simptomi, podobni gripi, zvišana telesna temperatura
- vnetje sluznice nosu in žrela
- zvišana telesna temperatura
- okorelost sklepov, otekanje sklepov, mišično-skeletna okorelost, osteoartritis
- izguba spomina
- zmedenost, zmanjšana aktivnost, občutek vznesenosti
- oteženo dihanje v ležečem položaju
- mehurji na koži
- nizek krvni tlak

Neznana: pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov
- spremembe v EKG (podaljšanje intervala QT)
- splošno slabo počutje
- tesnoba
- nezmožnost zadrževanja urina
- če obstaja tumor hipofize, se poveča tveganje za pojav krvavitev na tem območju
- anemija (zmanjšanje števila rdečih krvnih celic)

Otroci

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov
- pri deklicah se lahko v prvem mesecu zdravljenja pojavi krvavitev iz nožnice

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov
- bolečina v trebuhu
- bolečina, rdečina in oteklina na mestu injiciranja
- glavobol
- vročinski oblivi
- povečanje telesne mase
- akne
- preobčutljivostne reakcije

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov
- zamegljen vid
- bruhanje
- zaprtje
- slabost s siljenjem na bruhanje
- splošno slabo počutje

- prevelika telesna masa
- bolečina v vratu
- spremembe razpoloženja
- bolečina v dojkah
- krvavitve iz nosu
- srbenje
- kožni izpuščaj ali koprivnica

Neznana: pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov
- visok krvni tlak
- motnje vida
- huda alergijska reakcija s težavami pri požiranju in dihanju, otekanjem ustnic, obraza, žrela ali jezika ali pojavom koprivnice
- napadi krčev (konvulzije)
- vpliv na rezultate nekaterih krvnih preiskav, vključno z vrednostmi hormonov
- hiter pojav izpuščajev zaradi otekanja kože ali sluznic
- bolečina v mišicah
- motnje razpoloženja
- depresija
- nervoznost
- idiopatična intrakranialna hipertenzija (povišan intrakranialni tlak okoli možganov, za katerega so značilni glavobol, dvojni vid in drugi simptomi vida ter zvonjenje ali piskanje v ušesih)

Zdravnik bo v primeru pojava neželenih učinkov presodil o potrebnih ukrepih za njihovo ublažitev ali zdravljenje.

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si
S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Pamorelin 22,5 mg

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in nalepki poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

Suspenzijo je treba uporabiti takoj po pripravi.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Pamorelin 22,5 mg
- Učinkovina je triptorelin.
  Ena viala vsebuje 22,5 mg triptorelina v obliki triptorelinijevega embonata.
  Po rekonstituciji z 2 ml vehikla vsebuje 1 ml pripravljene suspenzije 11,25 mg triptorelina.
- Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so:
  Prašek: poli(D,L-laktid-ko-glikolid), manitol, natrijev karmelozat, polisorbat 80.
  Vehikel: voda za injekcije.

Izgled zdravila Pamorelin 22,5 mg in vsebina pakiranja
Zdravilo je v obliki praška in vehikla za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje. Prašek je bele do sivobele barve, vehikel pa je bistra raztopina.

Pakiranje vsebuje 1 vialo, 1 ampulo in 1 pretisni omot, v katerem so 1 injekcijska brizga in 2 injekcijski igli.

Način in režim izdaje zdravila Pamorelin 22,5 mg
ZZ – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
IPSEN PHARMA
70 rue Balard
75015 Pariz
Francija

Proizvajalec
Ipsen Pharma Biotech
Parc d'Activités du Plateau de Signes
Chemin Départemental n° 402
83870 Signes
Francija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija, Nemčija: Pamorelin LA 22.5 mg
Belgija, Luksemburg: Decapeptyl Sustained Release 22.5 mg
Češka, Poljska, Slovaška: Diphereline SR 22.5 mg
Danska, Finska, Nizozemska, Norveška, Švedska: Pamorelin 22.5 mg
Grčija: Arvekap 22.5 mg
Španija: Decapeptyl Semestral 22.5 mg
Francija: Decapeptyl LP 22.5 mg
Latvija: Diphereline 22.5 mg
Slovenija: Pamorelin 22,5 mg prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
Madžarska: Diphereline SR 22,5 mg por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 15. 6. 2026

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju (glejte poglavje 3):

1 – PRIPRAVA BOLNIKA PRED REKONSTITUCIJO ZDRAVILA

Bolnika pripravite tako, da na mestu injiciranja razkužite kožo zadnjične mišice že pred pripravo zdravila, saj je zdravilo treba injicirati takoj po rekonstituciji.

2 – PRIPRAVA INJEKCIJE

V škatli sta dve igli:

- **Igla 1:** igla (40 mm*, 20 G) brez varovala, uporablja se za rekonstitucijo
- **Igla 2:** igla (38 mm*, 20 G) z varovalom, uporablja se za injiciranje



Prisotnost mehurčkov na vrhu praška je normalen izgled zdravila.
Naslednje korake je treba izvesti v neprekinjenem zaporedju.

*Dolžina je lahko izražena bodisi nominalno (40 mm) bodisi metrično (38 mm); obe vrednosti sta enakovredni.

2a

- Iz škatle vzemite ampulo z vehiklom. Vehikel, ki je morda prisoten v vratu ampule, s trkanjem spravite nazaj v telo ampule.
- Na brizgo pritrdite iglo 1 (brez varovala). Zaščitni tulec igle pustite na igli.
- Odlomite vrat ampule, pri čemer se ravnajte po piki, tako da bo le-ta obrnjena proti vam.
- Odstranite zaščitni tulec z igle 1. Vstavite iglo v ampulo in v brizgo izvlecite ves vehikel.
- Brizgo z vehiklom odložite na stran.



2b

- Iz škatle vzemite vialo s praškom. Prašek, ki je morda prisoten na vrhu viale, s trkanjem spravite nazaj na dno viale.
- Z vrha viale odstranite plastični pokrovček.
- Ponovno vzemite brizgo z vehiklom in iglo zabodite v vialo navpično skozi gumijasti zamašek. Vehikel počasi iztisnite, po možnosti tako, da boste pri tem izprali celoten zgornji del viale.



2c

- Iglo 1 izvlecite nad nivo tekočine. Igle ne odstranjujte iz viale. Suspenzijo rekonstituirajte z nežnim vrtenjem viale v obe smeri. Viale ne obračajte na glavo.
- Prepričajte se, da ste stresali dovolj dolgo (vsaj 30 sekund), da je nastala homogena mlečno bela suspenzija.
- **Pomembno: Preverite morebitno prisotnost nesuspendiranega praška v viali (v primeru prisotnih grudic praška nadaljujte z vrtenjem, dokler le-te ne izginejo).**



2d

- Ko dobite homogeno suspenzijo, potisnite iglo do dna in vso suspenzijo izvlecite, ne da bi pri tem preobračali vialo. V viali bo ostala manjša količina suspenzije, ki jo zavrzite. Ta izguba je predvidena in vračunana s prebitkom.
- Injekcijsko iglo primite za obarvani spojni del. Z brizge odstranite iglo 1,



ki ste jo uporabili za rekonstitucijo. Na brizgo namestite iglo 2.

- Varovalo premaknite stran od igle in proti brizgi. Varovalo ostane v položaju, kot ste ga nastavili.
- Z injekcijske igle odstranite zaščitni tulec.
- Iz brizge iztisnite zrak in nemudoma injicirajte.



3 – INJICIRANJE V MIŠICO

- Da se izognete sedimentaciji, nemudoma injicirajte v razkuženo območje čim hitreje (v 1 minuti po rekonstituciji).



4 – PO UPORABI

- Aktiviranje varnostnega sistema s tehniko z eno roko.
- Opomba: Prst ves čas držite za varovalom.

Obstajata dve možnosti za aktiviranje varnostnega sistema.

- Postopek A: S prstom potisnite varovalo naprej.

ali

- Postopek B: Varovalo pritisnite na ravno površino.
- V obeh primerih s krepkim hitrim gibom pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite značilnega klika.
- Poglejte, ali se igla popolnoma prilega v zaporo.



Postopek A



Postopek B

Uporabljene igle, neuporabljeno suspenzijo ali drug odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

