

NAVODILO ZA UPORABO

Panadol 500 mg prašek za peroralno raztopino z okusom mentola in črnega ribeza paracetamol

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 3 dneh (zvišana telesna temperatura) oziroma 7 dneh (bolečina), se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Panadol in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Panadol
3. Kako jemati zdravilo Panadol
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Panadol
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO PANADOL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Panadol vsebuje učinkovino **paracetamol**, ki je analgetik (blaži bolečine) in antipiretik (znižuje povišano telesno temperaturo).

Zdravilo Panadol blaži glavobol, migreno, bolečine v hrbtu, zobobol, revmatske bolečine, bolečine v mišicah, nevralgijo in bolečine ob menstruaciji. Izboljša počutje med prehladom, gripo in vnetjem grla ter znižuje povišano telesno temperaturo.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO PANADOL

Ne uporabljajte zdravila Panadol:

- če ste alergični (preobčutljivi) na paracetamol ali katerokoli sestavino zdravila Panadol.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Panadol,

- če imate hudo ledvično ali jetrno bolezen,
- če že jemljete katerokoli drugo zdravilo, ki vsebuje paracetamol,
- če zaužijete velike količine alkohola.

Posvetujte se s svojim zdravnikom, če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo (glejte tudi poglavje 3 "Trajanje zdravljenja").

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Še posebej pomembno je, da se pred začetkom jemanja zdravila Panadol posvetujete z zdravnikom, če jemljete:

- metoklopramid, domperidon (zdravili za preprečevanje siljenja na bruhanje in bruhanja),
- holestiramin (zdravilo za zmanjševanje velike koncentracije holesterola v krvi),

- antikoagulantna zdravila (zdravila proti strjevanju krvi) in hkrati potrebujete sredstvo za lajšanje bolečin. Občasno lahko vzamete tudi paracetamol. Redna dnevna uporaba paracetamola v daljšem časovnem obdobju pa lahko stopnjuje antikoagulantni učinek in s tem je tveganje za pojav krvavitve večje.

Jemanje zdravila Panadol skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Panadol lahko jemljete skupaj s hrano in pijačo ali brez nje.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Zdravilo Panadol se lahko jemlje med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Panadol nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Panadol

Ena vrečica praška vsebuje 2 g saharoze. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

Vsebuje aspartam, ki je vir fenilalanina. Lahko škoduje ljudem s fenilketonurijo.

To zdravilo vsebuje 118 mg natrija na odmerek. To morajo upoštevati bolniki, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

Zdravilo vsebuje azo barvila, ki lahko povzročijo alergijske reakcije.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO PANADOL

Pri jemanju zdravila Panadol natančno upoštevajte navodila v nadaljevanju. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odrasli (tudi starejši) in mladostniki, starejši od 12 let

Vzemite **1 do 2 vrečici vsakih 4 do 6 ur**. Zdravila ne smete jemati pogosteje kot vsake 4 ure. Posamezni odmerek ne sme biti večji kot 2 vrečici. Največji dnevni odmerek je 8 vrečic (4.000 mg paracetamola).

Otroci, stari od 6 do 12 let

Za doseganje ustreznega odmerjanja so pri tej starostni skupini bolj primerne druge oblike zdravil.

Otroci, mlajši od 6 let

Zdravilo ni primerno za dajanje otrokom, ki so mlajši od 6 let.

Način uporabe

Prašek raztopite v skodelici ali posodici vroče vode in dobro premešajte.

Trajanje zdravljenja

Zdravilo Panadol jemljite za zniževanje povišane telesne temperature največ 3 dni, za lajšanje bolečin pa največ 7 dni. Otrokom lahko dajete zdravilo brez posveta z zdravnikom največ 3 dni. Če se znaki vaše bolezni v tem času ne izboljšajo, morate obiskati zdravnika. Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Panadol, kot bi smeli, takoj poiščite zdravniško pomoč, tudi če se ne počutite slabo, saj lahko prevelik odmerek paracetamola povzroči odpoved jeter.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Panadol

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo Panadol neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zelo redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- zmanjšanje koncentracije trombocitov (krvnih celic, ki so pomembne za strjevanje krvi)
- anafilaktična reakcija (takojšnja preobčutljivostna reakcija)
- alergijske reakcije, npr. kožni izpuščaji, angioedem (otekanje obraza, jezika in/ali žrela, težave pri požiranju ali izpuščaji skupaj s težavami pri dihanju) in Stevens-Johnsonov sindrom (razširjen izpuščaj z mehurji in lupljenjem kože, zlasti okrog ust, nosu, oči in spolovil),
- bronhospazem (zoženje dihalnih poti zaradi skrčenja gladkih mišic sapnic) pri bolnikih občutljivih na acetilsalicilno kislino in druga nesteroidna protivnetna zdravila
- odpoved jeter

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA PANADOL

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Panadol ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninu.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Panadol

Zdravilna učinkovina je paracetamol. Ena vrečica praška za peroralno raztopino vsebuje 500 mg paracetamola.

Pomožne snovi so saharoza, aspartam (E951), vinska kislina, natrijev citrat (brezvodni), aroma črnega ribeza, aroma mentola, rdeče barvilo, ki vsebuje karmoizin (E122), sončno rumeno FCF (E110) in črno PN (E151).

Izgled zdravila Panadol in vsebina pakiranja

Zdravilo Panadol je v obliki praška za peroralno raztopino.

Na voljo je 5, 10, 15 ali 20 vrečic s praškom za peroralno raztopino.

Način in režim izdaje zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

GSK d.o.o., Ljubljana, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

Izdelovalec

SmithKline Beecham S.A. Ctra. De Ajalvir, KM 2,500, Alcala De Henares, Madrid 28806, Španija.

Panadol je blagovna znamka skupine podjetij GlaxoSmithKline.

Navodilo je bilo odobreno 30.10.2014.