

NAVODILO ZA UPORABO

Lamisil 10 mg/g dermalno pršilo, prašek terbinafinijev klorid

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 14 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Lamisil pršilo, prašek in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Lamisil pršilo, prašek
3. Kako uporabljati zdravilo Lamisil pršilo, prašek
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Lamisil pršilo, prašek
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO LAMISIL PRŠILO, PRAŠEK IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Lamisil pršilo, prašek je antimikotik, ki se uporablja na koži. Deluje tako, da uničuje glive, ki povzročajo spremembe na koži.

Zdravilo Lamisil pršilo, prašek se uporablja za zdravljenje:

- atletskega stopala (*tinea pedis*),
- glivične okužbe kože v predelu dimelj (*tinea cruris*).

Če niste prepričani glede vzroka vaše okužbe, se pred uporabo zdravila Lamisil pršilo, prašek posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO LAMISIL PRŠILO, PRAŠEK

Ne uporabljajte zdravila Lamisil pršilo, prašek

- če ste alergični (preobčutljivi) na **terbinafinijev klorid** ali katerokoli sestavino tega zdravila (glejte seznam sestavin v poglavju 6).

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če to velja za vas in **ne uporabljajte zdravila Lamisil pršilo, prašek**.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Lamisil pršilo, prašek

- **Otroci in mladostniki, mlajši od 18 let**, ne smejo uporabljati zdravila Lamisil pršilo, prašek.
- Zdravilo Lamisil pršilo, prašek vsebuje alkohol, ki lahko draži oči in kožo. Zdravila **ne smete uporabljati na obrazu in bodite previdni ko ga uporabljate na razpokani ali poškodovani koži**.
- Ne vdihujte pršila, prašek.
- Zdravilo Lamisil pršilo, prašek vsebuje alkohol, zato ga ne uporabljajte v bližini odprtega

- ognja.
- Samo za zunanjo uporabo.

Uporaba drugih zdravil

- Sočasno z zdravilom Lamisil pršilo, prašek **na prizadeto področje ne nanašajte drugih zdravil** (tudi tistih, ki ste jih dobili brez recepta).
- **Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta**, če jemljete (ali ste pred kratkim jemali) katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Nosečnost in dojenje

- **Če ste noseči ali mislite, da ste noseči, povejte svojemu zdravniku ali farmacevtu.** Zdravila Lamisil pršilo, prašek ne smete uporabljati med nosečnostjo, razen če je to nujno potrebno.
- **Zdravila Lamisil pršilo, prašek med dojenjem ne smete uporabljati.** Dojenčki ne smejo priti v stik z zdravljeno kožo, vključno s prsmi.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Lamisil pršilo, prašek nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO LAMISIL PRŠILO, PRAŠEK

Kako pogosto uporabljati pršilo, prašek

Pršilo, prašek uporabljajte na prizadetem področju enkrat ali dvakrat na dan, en teden, razen, če vam zdravnik naroči drugače:

- **atletsko stopalo:** nanašajte zdravilo **dvakrat na dan** en teden
- **glivična okužba kože v predelu dimelj in kraste, lišaji:** nanašajte zdravilo **enkrat na dan** en teden

Kako uporabljati zdravilo

Natančno sledite navodilom za uporabo:

- Prizadeto mesto in okolico očistite in osušite ter si umijte roke.
- Vsebnik pretresite in odstranite pokrovček z vsebnika.
- Držite vsebnik 10 do 15 cm od kože.
- Razpršite zadostno količino zdravila, tako da z njim temeljito prekrijete prizadeto mesto in okolico. Na koži bo nastala tanka plast praška.
- S pokrovčkom zaprite vsebnik.
- Po uporabi pršila, prašek si umijte roke, saj lahko drugače razširite okužbo tudi na druge dele kože ali na druge ljudi.

Če zdravite okužbe med kožnimi gubami lahko mesto zdravljenja prekrijete s trakom gaze, še posebno ponoči. Kadarkoli boste nanesli pršilo, prašek uporabite svež, čist trak gaze.

Izboljšanje na koži naj bi se pojavilo v nekaj dneh, vendar pa lahko traja tudi do 4 tedne, da se koža popolnoma obnovi.

Če po dveh tednih zdravljenja z zdravilom Lamisil pršilo, prašek ne opazite nobenih znakov izboljšanja, vprašajte za nasvet svojega zdravnika ali farmacevta.

Pomoč pri zdravljenju

- Prizadeto mesto redno umivajte. Osušite ga previdno brez drgnjenja, samo popivajte. Čeprav je prizadeto mesto lahko srbeče, ga ne praskajte, saj lahko s tem povzročite več škode in upočasnite proces zdravljenja ali razširite okužbo.

- Uporabljajte svoje brisače in oblačila in jih ne delite z drugimi, saj se okužbe zlahka prenašajo. Da bi se zaščitili pred ponovno okužbo, oblačila in brisače pogosto perite.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Lamisil pršilo, prašek

Če ste pozabili uporabiti pršilo, prašek, ga nanesite takoj, ko je to mogoče in nato nadaljujte z uporabo kot običajno. Če se spomnite šele ob času naslednjega nanosa, nanesite običajno količino zdravila, in normalno nadaljujte z uporabo.

Uporabljajte pršilo, prašek kot je predpisano. To je pomembno, saj se z izpuščanjem odmerkov, poveča tveganje za ponovitev okužbe.

Če ste pomotoma zaužili nekaj zdravila Lamisil pršilo, prašek

O tem takoj obvestite zdravnika, ki vam bo svetoval, kaj storiti.

Če ste zdravilo Lamisil pršilo, prašek pomotoma zanesli v oči

Temeljito izpirajte oči s tekočo vodo. Če še vedno občutite kakršnokoli nelagodje, obiščite svojega zdravnika.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Lamisil pršilo, prašek neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

- V zelo redkih primerih se lahko pojavi alergija na zdravilo Lamisil pršilo, prašek, kar lahko povzroči **oteklino in bolečino, izpuščaje ali koprivnico**. Če se pojavi kateri od teh simptomov, takoj prenehajte z uporabo pršila in o tem obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
- Po uporabi zdravila se lahko pri nekaterih ljudeh pojavijo **rdečina, srbenje, pekoč občutek ali suha koža**. To so neškodljivi, blagi neželeni učinki, ki jih lahko pričakujemo pri nanašanju pršila, praška.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA LAMISIL PRŠILO, PRAŠEK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo Lamisil pršilo, prašek ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na vsebniku poleg oznake EXP. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Pozor: zelo lahko vnetljivo. To je vsebnik pod tlakom. Zaščitite ga pred svetlobo in ne izpostavljajte temperaturi nad 50 °C. Ne prebadajte ali sežigajte, niti po uporabi. Hranite ga ločeno od virov vžiga. Ne kadite. Ne pršite na odprt ogenj ali žareče (vroče) snovi.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Lamisil pršilo, prašek

- Zdravilna učinkovina je terbinafinijev klorid. En gram zdravila Lamisil pršilo, prašek vsebuje 10 mg terbinafinijevega klorida (1% w/w).
- Pomožne snovi so brezvodni etanol, oktenilsukcinat škrob, aluminijeva sol, izopropilmiristat, sorbitan oleat, stearalkonijev hektorit, propilen karbonat, natrijev hidrogenkarbonat in izobutan kot potisni plin.

Izgled zdravila Lamisil pršilo, prašek in vsebina pakiranja

To zdravilo je dermalno pršilo, prašek.

Zdravilo Lamisil pršilo, prašek je suspenzija tekočega aerosola sivo bele barve, ki po aplikaciji daje prašek sivo bele barve.

Zdravilo Lamisil pršilo, prašek je na voljo v 15 g aluminijemskem vsebniku pod tlakom z narezanim ventilom.

Način in režim izdaje zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 München

Nemčija

Izdelovalec

Novartis Sverige AB, Kemistvägen 1, 183 11 TÄBY, Švedska

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	Lamisil 1 % Pulver-Spray zur Anwendung auf der Haut, Druckbehältnis
Bolgarija	LAMISIL 1% cutaneous spray, powder, pressurized container Ламизил 1% спрей за кожа, прах, опаковка под налягане
Ciper	LAMISIL Powder Spray
Češka	LAMISIL PRÁŠKOVÝ SPREJ 10 MG/G
Estonija	LAMISIL
Finska	LAMISIL 1% sumutepuuteri
Francija	LAMISILSPRAY 1%, poudre pour pulvérisation cutanée en flacon pressurisé
Grčija	LAMISIL Powder Spray
Irska	LAMISIL 1%w/w cutaneous spray, powder, pressurised container
Latvija	LAMISIL 1% uz ādas izsmidzināms aerosols, pulveris
Litva	LAMISIL 1% odos purškalas, milteliai
Malta	LAMISIL 1% cutaneous spray, powder, pressurised container
Norveška	LAMISIL
Poljska	LAMISILATT
Romunija	Lamisil 1% spray cutanat, pulbere
Slovaška	LAMISIL púdrový sprej, 1% dermálna prášková aerodisperzia
Slovenija	Lamisil 10 mg/g dermalno pršilo, prašek
Švedska	Lamisil 1 % kutan spray, pulver, tryckbehållare
Velika Britanija	LAMISIL AT 1% cutaneous spray, powder, pressurised container

Navodilo je bilo odobreno 20. julija 2012.