

Navodilo za uporabo Fucidin 30 mg prepojena tkanina natrijev fusidat

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke !

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
- Zdravilo je bilo predpisano za vas osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Fucidin prepojena tkanina in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Fucidin prepojena tkanina
3. Kako uporabljati zdravilo Fucidin prepojena tkanina
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Fucidin prepojena tkanina
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Fucidin prepojena tkanina in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Fucidin prepojena tkanina je antibiotik ozkega spektra. Spada med tetraciklične antibiotike, ki so po strukturi podobni steroidom. Zdravilo Fucidin prepojena tkanina vsebuje učinkovino, ki zavira rast bakterij in ki je še posebej učinkovita proti bakterijam, ki povzročajo vnetja in razjede na koži.

Zdravilo Fucidin prepojena tkanina učinkuje bakteriostatično, v visokih koncentracijah pa deluje proti bakterijam, ki povzročajo vnetja na koži in v razjedah na koži. Zdravilo Fucidin prepojena tkanina deluje na bakterije tako, da zavira nastajanje bakterijskih beljakovin. Zdravilna učinkovina dobro prodira skozi vrhnje plasti kože ter doseže vnetja in razjede tudi v spodnjih plasteh kože.

Zdravilo Fucidin prepojena tkanina uporabljamo za zdravljenje okužb kože, ki jih povzročajo bakterije (stafilokoki, streptokoki, *Corynebacterium minutissimum*) in drugi organizmi, občutljivi za zdravilo Fucidin prepojena tkanina.

Najpogosteje ga uporabljamo za zdravljenje naslednjih obolenj:

- z bakterijami okužen moker srbeč izpuščaj (ekcem)
- impetigo
- okužbe lasnega folikla

- venske razjede
- turi
- skupek turov
- eritrazma
- vnetje znojnic dišavnic
- okužene rane
- gnojno vnetje kože
- lokalizirano gnojno vnetje kože
- zanohtnica
- gnojna okužba brade
- rane zaradi poškodbe, okužene vrezne rane in opraskanine.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Fucidin prepojena tkanina

Ne uporabljajte zdravila Fucidin prepojena tkanina, če

- ste alergični (preobčutljivi) na natrijev fusidat ali na katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Fucidin prepojena tkanina se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

Zdravila Fucidin prepojena tkanina ne smete uporabljati v neposredni bližini oči, saj lahko natrijev fusidat draži očesno veznico.

Zdravila Fucidin prepojena tkanina ne uporabljajte na hudo poškodovani koži.

Kot za vse lokalne antibiotike tudi za zdravilo Fucidin prepojena tkanina velja, da lahko zelo pogosta uporaba povzroči lokalno draženje ali razvoj odpornosti proti antibiotikom in bakterijam tipa *Staphylococcus aureus*. Običajno je odpornost proti zdravilni učinkovini v zdravilu Fucidin prepojena tkanina nizka, vendar pa se razširjenost odpornosti lahko spreminja geografsko in časovno in je tudi odvisna od bakterij, ki jih zdravimo.

Druga zdravila in zdravilo Fucidin prepojena tkanina

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Po do zdaj znanih podatkih medsebojno delovanje z drugimi zdravili ni znano.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite to zdravilo.

Zdravilo Fucidin prepojena tkanina se lahko uporablja med nosečnostjo.

Zdravilo Fucidin prepojena tkanina se lahko uporablja med dojenjem, izogibati pa se je potrebno uporabi zdravila Fucidin prepojena tkanina na prsih. Če zdravilo uporabljate v neposredni bližini prsnih bradavic, morate pred dojenjem ta del dobro umiti.

Ni podatkov o vplivu zdravila Fucidin prepojena tkanina na plodnost.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Fucidin prepojena tkanina nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Fucidin prepojena tkanina vsebuje lanolin, cetilalkohol in butilhidroksitoluen (E321)

Zdravilo Fucidin prepojena tkanina vsebuje lanolin in cetilalkohol, ki lahko povzročita lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis). Zdravilo Fucidin prepojena tkanina vsebuje butilhidroksitoluen (E321), ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis) ali draženje oči in mukoznih membran.

3. Kako uporabljati zdravilo Fucidin prepojena tkanina

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerjanje in postopek uporabe

Prepojeno tkanino, ki je sterilno pakirana v pretisni omot iz aluminijeve folije, vzemite iz pretisnega omota in jo položite na prizadeto mesto na koži ter pričvrstite z navadno gazo, z lepilnim trakom ali s povojem. Pri tem je treba paziti, da se prepojene tkanine ne dotikate s prsti na tisti strani, ki pride na prizadeto mesto na koži. Prepojeno tkanino lahko položite na kožo tudi v dveh slojih.

Sprva jo zamenjajte enkrat dnevno, nato pa vsak drugi ali tretji dan.

Trajanje zdravljenja

Zdravljenje običajno traja 7 dni. Zdravilo Fucidin prepojena tkanina morate uporabljati še od 2 do 3 dni po ozdravitvi, da se bakterije dejansko uničijo.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Fucidin prepojena tkanina, kot bi smeli

Verjetnost prevelikega odmerjanja je zelo majhna.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Fucidin prepojena tkanina

Ne uporabite dvojnega odmerka zdravila, če ste pozabili uporabiti zdravilo Fucidin prepojena tkanina.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Fucidin prepojena tkanina, ni razloga za skrb. Zdravilo uporabite takoj, ko se spomnite.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Fucidin prepojena tkanina

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden prenehate uporabljati zdravilo Fucidin prepojena tkanina.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsako zdravilo ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavljajo pri vseh bolnikih.

Spodaj navedeni neželeni učinki so razvrščeni po pogostosti.

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- vnetje kože z značilnimi znaki vnetja zaradi vpliva škodljivih dejavnikov, ki delujejo v koži ali pa pridejo v kožo po stiku od zunaj (dermatitis) (dermatitis po stiku s škodljivim dejavnikom (kontaktni dermatitis), ekcem)),
- izpuščaj*,
- srbenje (pruritus),
- rdečina (eritem)

*Različni tipi izpuščajev: eritematozni, pustulozni, vezikularni, makulo-papularni in papularni. Poročali so tudi o pojavu generaliziranega izpuščaja.

Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1000 bolnikov)

- angionevrotični edem
- koprivnica (urtikarija)
- pojav mehurčkov v epidermisu
- draženje očesne veznice
- alergične reakcije
- bolečina na mestu nanosa (vključno s pekočim občutkom na koži)
- draženje na mestu nanosa

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika

Center za zastrupitve

Zaloška cesta 2

SI-1000 Ljubljana

Faks: + 386 (0)1 434 76 46

e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5 Shranjevanje zdravila Fucidin prepojena tkanina

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo Fucidin prepojena tkanina shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake (Uporabno do:). Rok uporabnosti tega zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo

- Zdravilna učinkovina: natrijev fusidat
- Ena prepojena tkanina vsebuje 30 mg natrijevega fusidata
- Pomožne snovi so: cetilalkohol, lanolin, tekoči parafin, beli vazelin, butilhidroksitoluen (E321) in vseracemni- α -tokoferol.

Izgled zdravila Fucidin prepojena tkanina in vsebina pakiranja

Zdravilo Fucidin prepojena tkanina je na voljo v škatli, ki vsebuje 10 prepojenih tkanin v pretisnih omotih iz aluminijeve folije.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Fucidin prepojena tkanina

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Pharmagan, d. o. o.

Vodopivčeva 9, 4000 Kranj

Izdelovalec

Leo Laboratories Ltd. (LEO Pharma)

285 Cashel Road, Dublin 12

Irska

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 03.06.2014