

Pomembno obvestilo

Uporabljaj le pod zdravniškim nadzorom! Ni primerno kot edini vir prehrane! Ni za parenteralno uporabo! Previdno upoštevajte navodila! Samo za dojenčke s fenilketonurijo ali hiperfenilalaninemijo!

Definicija in indikacija: XPhe Infant je formula za dojenčke brez fenilalanina pri prehrani dojenčkov s fenilketonurijo (PKU) in hiperfenilalaninemijo (HPA). XPhe Infant vsebuje aminokisline, maščobe in ogljikove hidrate in je obogaten z vitamini, minerali in elementi v sledovih.

Doziranje: Pravilno doziranje je prepuščeno zdravniku, ki mora redno prilagajati doze glede na rezultate periodičnega monitoringa. Odvisno je od starosti, telesne teže, beljakovinskih zahtev in sprejemljivosti fenilalanina vsakega dojenčka.

Dnevno količino XPhe Infant določimo individualno in jo dajemo dojenčku v kombinaciji s preračunano količino materinega mleka ali formule za dojenčke.

Navodila za uporabo: Plan prehrane za dietno oskrbo s PKU določa dnevno dozo XPhe Infant in ostalo prehrano, ki vsebuje fenilalanin (to je materino mleko, formula za dojenčke ali otroška hrana).

Skupno dnevno količino XPhe Infant moramo vzeti po steklenički ali kot kašo, razdeljeno v 3-5 obrokov, preko dneva.

Ko ga pripravimo samo s pitno vodo, XPhe Infant predstavlja obrok brez fenilalanina in se uporablja za zniževanje nivoja fenilalanina v krvi.

Za pripravo obroka z nižano vsebnostjo fenilalanina, XPhe Infant zmešamo s preračunano količino škroba, nizko proteinskih piškotov in/ali sadja.

XPhe Infant ne smemo dajati brez fenilalanin vsebujoče hrane (kot materino mleko ali mlečne formule) skozi daljše obdobje. Obvezen je zdravniški nadzor!

Shranjevanje: Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Takoj po uporabi pločevinko zaprite s pokrovom.

Odprto pločevinko porabite najkasneje v 4 tednih.

X Priprava obroka po steklenički:



Očistite in prevrte stekleničko in dudo pred uporabo.



Prevrite pitno vodo in jo ohladite na 50° do 60°.



Dodajte zahtevano količino prekuhane vode v stekleničko.



Napolnite žličko in jo poravnajte z konico noža. Uporabite le priloženo žličko.



Previdno zaprite stekleničko s pokrovom in pretresite.



Odprite stekleničko in namestite dudo. Preverite temperaturo tekočine.

Vedno pripravite svež obrok z XPhe Infant. Ostanke zavrzite.

Nasvet za zdravje zob

Ogljikovi hidrati so nujno potrebni pri prehrani vašega otroka. Tako kot materino mleko tudi XPhe Infant vsebuje ogljikove hidrate. Nepravilna uporaba stekleničke (pogosto ali neprekinjeno sesanje) lahko povzroči karies in škodi zdravju. Tako naj hranjenje traja le toliko časa kot je potrebno za vnos hrane. Ne pustite stekleničke vašemu otroku za neprekinjeno sesanje.



4 250174 110210

Distribucija v Sloveniji:
MagPharm, Zdravko Plečnik s.p.
Dunajska cesta 181, 1000 Ljubljana
GSM: 040 457 767
zdravkoplecnik.zdravko@gmail.com



XPhe Mix^{LCP} Infant

Dietetično živilo za posebne zdravstvene namene
Za dietetsko uravnavanje fenilketonurije
in hiperfenilalaninemije za dojenčke

Prehrana za posebne zdravstvene namene

Formula za dojenčke brez fenilalanina za hranjenje dojenčkov s fenilketonurijo (PKU) ali hiperfenilalaninemijo (HPA)

Prehranska vrednost

XPhe Infant vsebuje na 100 g prahu 100 ml napitka*

energija	kcal	511	77	baker	mg	0,36	0,05
	kJ	2135	320	jod	µg	46	7
				mangan	mg	0,4	0,06
beljakovine*	g	10,8	1,6	krom	µg	26	4
aminokisline	g	13,0	1,9	florid	mg	0,13	0,02
(*1g beljakovin = 1,2 g aminokisline)				molibden	µg	26	4
				selen	µg	13	2
aminokisline				vitamini			
glicin	g	0,4	0,06	vitamin A	µg	570	86
L-alanin	g	0,5	0,08	vitamin D ₃	µg	7	1
L-arginin	g	0,5	0,08	vitamin E	mg	5	0,7
L-asparaginska kislina	g	1,1	0,17	vitamin K ₁	µg	24	3,6
L-cistin	g	0,3	0,05	vitamin B ₁	mg	0,5	0,07
L-glutaminska kislina	g	1,8	0,27	vitamin B ₂	mg	0,5	0,08
L-histidin	g	0,4	0,06	vitamin B ₆	mg	0,5	0,08
L-izolevcin	g	0,8	0,12	niacin	mg	6	0,9
L-levcin	g	1,3	0,20	biotin	µg	14	2
L-lizin	g	0,9	0,14	folna kislina	µg	51	8
L-metionin	g	0,2	0,03	vitamin B ₁₂	µg	1,3	0,2
L-prolin	g	1,1	0,17	pantotenska kislina	mg	4	0,6
L-serin	g	0,7	0,11	vitamin C	mg	46	7
L-tirozin	g	1,2	0,18	holin	mg	77	12
L-treonin	g	0,6	0,09	mio-inozitol	mg	51	8
L-triptofan	g	0,3	0,05	tavrin	mg	39	6
L-valin	g	0,8	0,12	L-karnitin	mg	11	1,6

ogljikovi hidrati

od tega laktoza	g	54	8
maltodekstrin	g	31	5
škrob	g	15	2
	g	8	1,2

prehranske vlaknine

	g	0	0
--	---	---	---

maščobe

od tega nasičeni	g	28	4
enkrat nenasičeni	g	10	1,6
večkrat nenasičeni	g	12	1,8
	g	6	0,8

minerali

natrij	mg	260	39
kaliij	mg	500	75
kalcij	mg	500	75
magnezij	mg	52	8
fosfor	mg	335	50
klorid	mg	380	57
železo	mg	6	1

elementi v sledovih

cink	mg	5	0,8
------	----	---	-----

*standardna raztopina

15g XPhe Infant (3 žličke) + 90ml pitne vode = 100ml pripravljene raztopine. Napolnjena, priložena žlička v pločevinki, poravnana s hrbtno stranjo noža, meri približno 5 g.

osmolalnost: 350-360 mosmol/kg vode

sestavine

laktoza, rastlinske in živalske (jajčni lecitin, ribje olje) maščobe in olja, maltodekstrin, modificiran škrob, L-lizin-L-glutamat, L-levcin, kalijev L-glutamat, kalijev fosfat, L-tirozin, L-prolin, L-arginin-L-aspartat, L-valin, L-izolevcin, L-serin, natrijev klorid, magnezijev L-aspartat, L-treonin, L-alanin, L-histidin, glicin, L-triptofan, L-cistin, L-asparaginska kislina, L-metionin, emulgator: E 472c & sončnični lecitin, kalijev citrat, kalijev karbonat, holin, inozitol, Vitamin C, taurin, vanilin, antioksidant: E 304 & E 306 (sojin), železov sulfat, cinkov sulfat, niacin, L-karnitin, Vitamin E, pantotenska kislina, mangonov sulfat, bakrov sulfat, Vitamin A, Vitamin B₂, Vitamin B₆, Vitamin B₁, natrijev fluorid, kromov (III) klorid, natrijev molibdat, kalijev jodid, folna kislina, natrijev selenit, Vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B₁₂.

Lahko vsebuje sledove mlečnih sestavin.

Vsebnost **500 g** e
Uporabno najmanj do:
Datum odtisnjen na dnu pločevinke

