

Sinupret peroralne kapljice, raztopina

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v enem tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina
3. Kako jemati zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina in za kaj ga uporabljamo

Sinupret peroralne kapljice, raztopina je zdravilo rastlinskega izvora za zdravljenje simptomov (izcedek iz nosu, zamašen nos, glavobol, bolečine ali pritisk v predelu obraza) akutnih in kroničnih vnetij nosne sluznice in obnosnih votlin (npr. za redčenje goste sluzi).

Uporabljate ga lahko kot spremljevalno zdravilo pri protivnetnem zdravljenju zgornjih dihalnih poti, tudi ko že jemljete antibiotike.

To zdravilo je indicirano za odrasle, mladostnike in otroke od 2. leta starosti.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v enem tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina

Ne uporabljajte zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina

Če ste alergični na učinkovino (učinkovine) ali katerokoli sestavino zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če se med jemanjem tega zdravila simptomi poslabšajo, se občasno ponovijo ali trajajo dlje kot teden dni.

Posvetujte se z zdravnikom, če se pojavi krvavitev iz nosu, povišana telesna temperatura, težko dihanje, huda bolečina, gnojen izcedek iz nosu, oslavljen vid, asimetričnost obraza ali oči ali otrplost obraza, saj ti simptomi ali ugotovitve lahko veljajo za resna opozorila in zahtevajo pregled pri specialistu in nujno zdravljenje.

Pri bolnikih z gastritisom in bolnikih z občutljivim želodcem je potrebna previdnost. Ti bolniki naj zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina jemljejo po obroku in s kozarcem vode.

Otroci

Uporaba pri otrocih, mlajših od 2 let, zaradi pomanjkanja podatkov ni priporočljiva.

Druga zdravila in zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete/uporabljate, ste pred kratkim jemali/uporabljali ali pa boste morda začeli jemati/uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Študij medsebojnega delovanja z drugimi zdravili niso izvedli. Do danes ni znanih nobenih interakcij.

Zdravilo Sinupret skupaj s hrano in pijačo

Ni znano, da bi hrana in pijača vplivali na zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo. Ni podatkov o uporabi zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina med nosečnostjo. Zaradi previdnosti se je treba med nosečnostjo izogibati uporabi zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina.

Ni znano, ali se učinkovine v zdravilu Sinupret peroralne kapljice, raztopina ali njihovi razgradni produkti izločajo v materino mleko. Tveganja za dojenega dojenčka ni mogoče izključiti. Zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina se zato med dojenjem ne sme uporabljati.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni raziskav o učinkih zdravila na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina vsebuje etanol (alkohol).

To zdravilo vsebuje 456 mg alkohola (etanola) v 50 kapljicah, kar je enako 152 mg/ml (19 % V/V). Količina alkohola v 50 kapljicah zdravila je enaka 12 ml piva ali 5 ml vina. Majhna količina alkohola v tem zdravilu ne bo imela opaznih učinkov.

3. Kako jemati zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeno odmerjanje:

Starost	Enkratni odmerek	Dnevni odmerek
Odrasli in mladostniki od 12. leta	50 kapljic, kar ustreza 3,0 ml	150 kapljic (trikrat po 50), kar ustreza 9,0 ml

Uporaba pri otrocih

Starost	Enkratni odmerek	Dnevni odmerek
Otroci od 6. do 11. leta	25 kapljic, kar ustreza 1,5 ml	75 kapljic (trikrat po 25), kar ustreza 4,5 ml
Otroci od 2. do 5. leta	15 kapljic, kar ustreza 0,9 ml	45 kapljic (trikrat po 15), kar ustreza 2,7 ml

Uporaba pri otrocih

Uporaba pri otrocih, mlajših od 2 let, zaradi pomanjkanja podatkov ni priporočljiva.

Bolniki z okvarjenim delovanjem ledvic/jeter

Ni dovolj podatkov, da bi lahko priporočili posebno odmerjanje za bolnike z okvarjenim delovanjem ledvic/jeter.

Način uporabe:

Vsebnik pred uporabo dobro pretresite. Zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina nakapajte v pol kozarca vode in tekočino popijte neodvisno od obroka hrane. Za izboljšanje grenkega okusa lahko otroci zdravilo jemljejo zmešano s sadnim sokom ali čajem.

Ko odmerjate zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina, držite vsebnik navpično, kot prikazuje slika na desni.



Trajanje zdravljenja

Če vam zdravnik ni predpisal drugače, jemljite zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina 7-14 dni. Če se znaki bolezni poslabšajo ali trajajo dlje kot teden dni ali se ponavljajo občasno, se morate posvetovati z zdravnikom.

Če menite, da je učinek zdravila Sinupret premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina, kot bi smeli

Prevelik odmerek lahko povzroči nelagodje v želodcu, bruhanje ali drisko. Posvetujte se s svojim zdravnikom. Zdravnik se bo odločil o morebitnih potrebnih ukrepih.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste prenehali jemati zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina

Prenehanje jemanja zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina običajno ne povzroča težav.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Občasni (pojavijo se lahko pri 1 osebi izmed 100 oseb):

- Težave v prebavilih (kot so bolečine v želodcu, slabost)
- Preobčutljivostne reakcije kože (izpuščaj, pordelost, srbenje)

Ni znano (pogostosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- Hude alergijske reakcije (otekanje ustnic, jezika in žrela in/ali otekanje grla z zožitvijo dihalnih poti (angioedem), zasoplost in/ali otekanje obraza).

Pri prvih znakih preobčutljivostnih reakcij prenehajte jemati zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina in se posvetujte z zdravnikom.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago in svetlobo. Zdravila ne uporabljajte, če je bil varnostni mehanizem zaporka pred prvim odpiranjem odlomljen.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in steklenem vsebniku po oznaki EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Uporabno po prvem odprtju: 3 mesece.

Med shranjevanjem lahko tekočina postane rahlo motna ali se v njej pojavijo kosmiči, vendar to ne vpliva na učinkovitost zdravila.

Zdravila ne zavržite v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina

Učinkovine:

100 g raztopine vsebuje 29 g tekočega ekstrakta (1 : 11) naslednjih rastlinskih drog:

<i>Gentiana lutea</i> L., <i>radix</i> - korenina rumenega svišča	0,2 g
<i>Primula veris</i> L., <i>Primula elatior</i> L. <i>Hill.</i> , <i>flos cum calycibus</i> - cvet jegliča s čašico	0,6 g
<i>Rumex</i> L. sp.s, <i>herba</i> - zel kislice	0,6 g
<i>Sambucus nigra</i> L., <i>flos</i> - cvet črnega bezga	0,6 g
<i>Verbena officinalis</i> L., <i>herba</i> - zel navadnega sporiša	0,6 g

Ekstrakcijsko topilo: 59-odstotni (V/V) etanol.

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi): prečiščena voda.

Izgled zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina in vsebina pakiranja

Zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina je čista do rahlo motna raztopina rumenorjave barve. Zdravilo Sinupret peroralne kapljice, raztopina je na voljo v steklenem vsebniku iz rjavega stekla s kapalko iz polietilena nizke gostote ter navojno varovalno zaporko iz polipropilena in polietilena visoke gostote v pakiranju po 100 ml.

Način in režim izdaje zdravila Sinupret peroralne kapljice, raztopina

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt

Nemčija
Tel.: +49 9181 231 90
Faks: +49 9181 231 265

E-pošta: info@bionorica.de

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na zastopništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Farmedica d. o. o.
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 524 02 16
Faks: +386 1 524 02 14
E-pošta: nasveti@farmedica.si

Navodilo je bilo nazadnje posodobljeno dne 15. 5. 2025.