

NAVODILO ZA UPORABO

Remifentanil Teva 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za injiciranje ali infundiranje

remifentanil

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Remifentanil Teva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste dobili zdravilo Remifentanil Teva
3. Kako boste dobili zdravilo Remifentanil Teva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Remifentanil Teva
6. Dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Remifentanil Teva in za kaj ga uporabljamo

Remifentanil spada v skupino splošnih anestetikov, imenovanih opioidi. Remifentanil se uporablja za uvedbo in vzdrževanje anestezije, tako da ste med operacijo uspavani in ne čutite bolečin. Če ste stari 18 let ali več, lahko to zdravilo dobite tudi za lajšanje bolečin med zdravljenjem na oddelku za intenzivno nego.

2. Kaj morate vedeti, preden boste dobili zdravilo Remifentanil Teva

Zdravila Remifentanil Teva NE boste dobili:

- če ste preobčutljivi (alergični) na remifentanil, druga podobna zdravila ali katero koli drugo sestavino zdravila Remifentanil Teva;
- v obliki injekcije v hrbtenični kanal;
- kot edino zdravilo za uvedbo anestezije.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Remifentanil Teva

- **Če ste starejši, oslabei ali hipovolemični** (če ste dehidrirani ali če ste izgubili veliko krvi), ste lahko med uporabo remifentanila bolj dovzetni za neželene učinke zdravila na srce.
- **Če imate težave s pljuči ali hude težave z jetri**, ste morda nekoliko bolj dovzetni za težave z dihanjem, ki jih lahko povzroči remifentanil.
- **Če je pričakovati, da boste po kirurškem posegu čutili bolečine**, boste pred prenehanjem uporabe remifentanila dobili drugo zdravilo za lajšanje bolečin. Zdravnik ga bo izbral posebej za vas, pri tem pa bo upošteval kirurški poseg, ki ste ga prestali, in stopnjo pooperativne nege, ki jo boste potrebovali. Če boste dobili še eno opioidno zdravilo, bo zdravnik še bolj pozoren na tveganje za pojav težav z dihanjem. Ko se boste zbudili po operaciji, se boste morda tresli, boste nemirni, vaš srčni utrip bo hiter in/ali boste omočeni. O takem počutju morate nemudoma obvestiti zdravnika.

- **Med operacijo** vam bo zdravnik morda vstavil cevko v sapnik in tako zagotovil, da bodo vaše dihalne poti ostale prehodne. Osebe vas bo natančno spremljalo in zaradi vstavljenе cevke ne boste čutili nobenega nelagodja.

Povejte svojemu zdravniku, če opazite:

hudo otrplost mišic, ko prvič dobite to zdravilo (glejte poglavje 4 »Možni neželeni učinki«).

Remifentanil lahko povzroči odvisnost.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali anesteziista, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katero koli drugo zdravilo, tudi rastlinska zdravila ali zdravila, ki ste jih dobili brez recepta. Kombinacija z drugimi zdravili namreč lahko vpliva na delovanje remifentanila v telesu in povzroči neželene učinke.

Zdravniku ali anesteziistu morate povedati, če jemljete (ali nameravate jemati) druga zdravila, kot so:

- zdravila za zdravljenje bolezni srca, kot so betablokatorji (med njimi so atenolol, metoprolol in bisoprolol); ti lahko povečajo neželene učinke remifentanila, ki vplivajo na srce (vključno z nizkim krvnim tlakom in upočasnjnim srčnim utripom);
- blokatorji kalcijevih kanalčkov (med njimi so amlodipin, diltiazem in nifedipin); ti lahko povečajo neželene učinke remifentanila, ki vplivajo na srce (vključno z nizkim krvnim tlakom in upočasnjnim srčnim utripom);
- vdihavanje ali intravenska uporaba anestetikov in benzodiazepinov (na primer diazepam); ko boste dobili zdravilo Remifentanil Teva, vam bo zdravnik ali farmacevt prilagodil odmerek teh zdravil.

Zdravilo Remifentanil Teva s sedativnimi zdravili, kot so benzodiapini ali sorodna zdravila:

Sočasna uporaba zdravila Remifentanil Teva in sedativnih zdravil, kot so benzodiazepini ali sorodna zdravila, poveča tveganje za zaspanost, težave pri dihanju (depresija dihanja), komo in so lahko življenjsko nevarne. Zaradi tega pride sočasna uporaba v poštev le, če ni drugih možnosti zdravljenja. Če pa zdravnik predpiše zdravilo **Remifentanil Teva** skupaj s sedativnimi zdravili, mora zdravnik omejiti odmerek in trajanje sočasnega zdravljenja. Obvestite svojega zdravnika o vseh sedativnih zdravilih, ki jih jemljete, in natančno upoštevajte priporočila zdravnika glede vašega odmerka. Morda vam bo koristilo, da prijatelje ali sorodnike opozorite, naj da bodo pozorni na zgoraj navedene znake in simptome. Če se vam pojavijo ti simptomi, se obrnite na svojega zdravnika.

Uporaba zdravila Remifentanil Teva s hrano in pijačo

Po tem, ko dobite zdravilo Remifentanil Teva, ne uživajte alkohola, dokler si popolnoma ne opomorete.

Nosečnost in dojenje

Remifentanil se ne sme uporabljati med nosečnostjo, razen če je to nedvomno nujno. Priporočamo vam, da po prejemu odmerku zdravila Remifentanil Teva za 24 ur prekinete dojenje.

Če ste noseči, če sumite, da ste noseči, ali če dojite, morate to povedati svojemu zdravniku ali anesteziistu.

Uporaba remifentanila se ne priporoča med porodom ali carskim rezom.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katero koli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

To zdravilo lahko povzroči težave s koncentracijo, koordinacijo, gibanjem in budnostjo. Če vas odpustijo iz bolnišnice istega dne, ko ste imeli operacijo, ne smete voziti ali upravljati strojev. Če vozite prekmalu po prestani operaciji, je to lahko nevarno, zato vam priporočamo, da si za pot domov priskrbite spremstvo.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Remifentanil Teva

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol natrija (23 mg) na ml, kar v bistvu pomeni »brez natrija«.

3. Kako boste dobili zdravilo Remifentanil Teva

Zdravilo Remifentanil Teva boste dobili samo v okoliščinah, ko bo posebej usposobljeno zdravstveno osebje lahko spremljalo delovanje vašega srca in dihanje.

Ker vam bo zdravilo dal zdravnik ali anesteziist, ni verjetno, da boste dobili napačen odmerek. Način dajanja zdravila in velikost odmerka se razlikujeta med posameznimi bolniki, določi pa ju zdravnik ali anesteziist. To je odvisno od tega, kakšno vrsto operacije boste imeli in kako dolgo boste morali biti uspavani.

- Remifentanil boste dobili v obliki injekcije/infuzije, ločeno od drugih zdravil.
- Remifentanil lahko dobite s posamezno injekcijo ali počasno, neprekinjeno infuzijo v veno.
- Remifentanil se ne sme injicirati v hrbtenični kanal.
- Remifentanil se sme uporabljati samo v kombinaciji z drugim zdravilom, ki povzroči uspavanje.

Odmerjanje pri posebnih skupinah bolnikov

Pri ljudeh, ki imajo prekomerno telesno maso ali ki so zelo bolni, je treba odmerek ustrezno zmanjšati in ga nato povečati glede na bolnikov odziv.

Pri bolnikih, ki imajo okvaro delovanja jeter ali ledvic, in pri tistih, ki morajo prestati nevrokirurški poseg, zmanjšanje odmerka ni potrebno.

Če ste dobili večji odmerek zdravila Remifentanil Teva, kot bi smeli

Ker bo zdravnik ali anesteziist med posegom spremljal vaše stanje, je malo verjetno, da bi dobili preveč zdravila Remifentanil Teva. Če kljub temu dobite prevelik odmerek zdravila Remifentanil Teva, bo zdravnik prekinil zdravljenje in začel zdraviti vaše simptome.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Remifentanil Teva neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Po tem, ko vas bodo uspavali z remifentanilom, je mogoče, da boste imeli otrple mišice.

Če boste imeli s tem hude težave, vam bo zdravnik dal zdravilo za sproščanje mišic. Če boste imeli otrple mišice med uporabo remifentanila za lajšanje bolečin, bo zdravnik zmanjšal odmerek ali prekinil z uporabo zdravila. Otrplost mišic bo popustila v nekaj minutah po prenehanju uporabe remifentanila.

Približna pogostost neželenih učinkov, o katerih so poročali, je opredeljena takole:

Pogostnost:

zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov),
pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov),
občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov),
redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov),
zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov),
neznana pogostost (ni je mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Če opazite kar koli od naslednjega, **nemudoma** obvestite medicinsko sestro ali zdravnika.

Zelo pogosti:

- otrplost mišic,
- omedlevica ali omotica (ta simptoma sta lahko posledica nizkega krvnega tlaka),
- slabost s siljenjem na bruhanje in/ali bruhanje.

Pogosti:

- nenavadno počasen srčni utrip,
- upočasnitev ali ustavitev dihanja,
- srbenje,
- drgetanje (po operaciji),
- omotica ali vročinski oblivi po operaciji (ta simptoma sta lahko posledica visokega krvnega tlaka).

Občasni:

- zaprtost,
- bolečine (po operaciji),
- občutek nemira ali zmedenosti, pomodrela koža in/ali zasoplost (to lahko kaže na pomanjkanje kisika v telesnih tkivih).

Redki:

- odsotnost/ustavitev srčnega utripa,
- dremavost (po operaciji),
- pri bolnikih, ki so dobili remifentanil sočasno z enim ali več drugimi anestetiki, so opazili alergijske reakcije, kot so zasoplost, izpuščaj kjerkoli po telesu, nenadno piskajoče dihanje ali oteklost obraza/jezika.

Neznana pogostost:

- odvisnost,
- kašelj.

Poročanje o neželenih učinkih

Preden vas po kirurškem posegu odpustijo iz bolnišnične prebujevalnice, se bo vaš zdravnik prepričal, da ste popolnoma pri zavesti in da nimate nobenih pooperativnih neželenih učinkov, kot so težave z dihanjem, nenavaden srčni utrip in/ali omotica. Če imate te neželene učinke, jih bo zdravnik ustrezno zdravil.

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Remifentanil Teva

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Remifentanil Teva ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na viali in škatli za oznako »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Pogoji shranjevanja

Pred odprtjem: za shranjevanje zdravila ni posebnih pogojev.

Po rekonstituciji in razredčitvi: to zdravilo se lahko shrani za 24 ur pri temperaturi 25 °C. Vendar ga je treba uporabiti takoj. V nasprotnem primeru je za čas in pogoje shranjevanja pred uporabo odgovoren uporabnik. Razredčeno zdravilo se ponavadi ne sme shraniti za več kot 24 ur pri temperaturi od 2 do 8 °C, razen če sta bili rekonstitucija in razredčitev opravljeni v nadzorovanih in preverjeno aseptičnih pogojih. Zdravnik bo poskrbel, da bodo pogoji za shranjevanje zdravila ustrezni.

Zdravilo je samo za enkratno uporabo. Neuporabljeno raztopino je treba zavreči.

Zdravnik ne bo uporabil zdravila Remifentanil Teva, če bo opazil vidne znake kvarjenja. Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. Vaš zdravnik bo odstranil zdravila, ki jih ne potrebujete več. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Remifentanil Teva

Zdravilna učinkovina je remifentanil. Ena viala vsebuje 1 mg remifentanila.

Druge sestavine zdravila so:

- glicin (E640),
- klorovodikova kislina (E507),
- natrijev hidroksid (E524).

Izgled zdravila Remifentanil Teva in vsebina pakiranja

Remifentanil Teva 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za injiciranje ali infundiranje je bel do skoraj bel ali rumenkast stisnjen prašek v brezbarvni stekleni viali, zaprti z zamaškom iz gume in belo zaporko. Na voljo je v kartonskih škatlah z 1 ali 5 vialami.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Remifentanil Teva

ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec*Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom*

TEVA Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemska

Izdelovalec

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 82

Madžarska

Za zdravilo je izdano dovoljenje za promet v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija	Remifentanil Teva 1 mg Pulver zur Konzentrat zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung
Belgija	Remifentanil Teva 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie of infusie
Ciper	Remifentanil TEVA 1mg Powder for Concentrate for Solution for Injection or Infusion
Danska	Remifentanil Teva
Nemčija	Remifentanil Teva 1 mg Pulver zur Herstellung eines Konzentrats zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung
Grčija	Remifentanil Teva 1 mg Κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση
Francija	REMIFENTANIL TEVA 1 mg, poudre à diluer pour solution injectable ou pour perfusion
Madžarska	Remifentanil-Teva 1 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz való koncentrátumhoz
Irska	Remifentanil Teva Powder for Concentrate for Solution for Injection or Infusion
Luksemburg	Remifentanil Teva 1 mg poudre à diluer pour solution injectable ou pour perfusion
Nizozemska	Remifentanil 1 mg PCH, poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie of infusie
Norveška	Remifentanil Teva Pulver til konsentrat til infusjonsvæske/injektsjonsvæske, oppløsning
Portugalska	Remifentanilo Teva
Romunija	Remifentanil Teva 1 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluție injectabilă sau perfuzabilă
Španija	Remifentanilo Teva 1 mg polvo para concentrado para solución inyectable o perfusión EFG
Slovenija	Remifentanil Teva 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Švedska	Remifentanil Teva 1mg pulver till koncentrat till injektions-/ infusionsvätska, lösning

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 29. 9. 2018.-----
Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju.**Inkompatibilnosti**

Remifentanil Teva se ne sme mešati z raztopino Ringerjevega laktata za injiciranje ali z raztopino Ringerjevega laktata in 50 mg/ml (5 %) raztopino glukoze za injiciranje.

Remifentanil Teva se ne sme mešati s propofolom v isti intravenski raztopini. Zdravilo Remifentanil Teva je združljivo s propofolom, če se aplicira skozi IV-kateter s pretokom.

Uporaba zdravila Remifentanil Teva skozi isto intravensko linijo s krvjo/serumom/plazmo se ne priporoča, ker lahko nespecifična esteraza v krvnih pripravkih povzroči hidrolizo remifentanila v njegov neaktivni presnovek.

Zdravila Remifentanil Teva se pred uporabo ne sme mešati z drugimi zdravili.

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Rekonstitucija

Zdravilo Remifentanil Teva pripravite za intravensko uporabo tako, da mu dodate ustrezno količino (kot je navedeno v spodnji razpredelnici) enega od spodaj navedenih vehiklov. Tako dobite rekonstituirano raztopino s koncentracijo remifentanila približno 1 mg/ml.

Pakiranje	Količina dodanega vehikla	Koncentracija rekonstituirane raztopine
Remifentanil Teva 1 mg	1 ml	1 mg/ml
Remifentanil Teva 5 mg	5 ml	1 mg/ml

Raztopino pretresite, tako da se prašek popolnoma raztopi. Rekonstituirana raztopina mora biti bistra, brezbarvna in brez vidnih delcev.

Nadaljnja razredčitev

Po rekonstituciji se zdravila Remifentanil Teva 1 mg ne sme uporabiti brez nadaljnje razredčitve z eno od spodaj navedenih intravenskih tekočin, tako da je končna koncentracija od 20 do 250 µg/ml (50 µg/ml je priporočeno razredčenje za odrasle, 20 do 25 µg/ml pa za pediatrične bolnike, stare eno leto in več).

Pri ciljno nadzorovani infuziji (TCI) je priporočeno razredčenje zdravila Remifentanil Teva od 20 do 50 µg/ml.

Razredčitev je odvisna od tehnične zmogljivosti naprave za infundiranje in predvidenih potreb pri bolniku.

Za razredčitev uporabite eno od naslednjih raztopin:

- voda za injekcije,
- 50 mg/ml (5 %) raztopina glukoze za injiciranje,
- 50 mg/ml (5 %) raztopina glukoze za injiciranje in 9 mg/ml (0,9 %) raztopina natrijevega klorida za injiciranje,
- 9 mg/ml (0,9 %) raztopina natrijevega klorida za injiciranje,
- 4,5 mg/ml (0,45 %) raztopina natrijevega klorida za injiciranje.

Pri aplikaciji skozi IV-kateter s pretokom smete uporabiti tudi naslednje intravenske tekočine:

- raztopina Ringerjevega laktata za injiciranje,
- raztopina Ringerjevega laktata in 50 mg/ml (5 %) raztopina glukoze za injiciranje.

Zdravilo Remifentanil Teva je združljivo s propofolom, če se aplicira skozi IV-kateter s pretokom.

Ne uporabljajte nobenih drugih vehiklov. Raztopino je treba pred uporabo pregledati vizualno in se prepričati, da ne vsebuje nobenih delcev. Uporabiti smete samo bistro raztopino brez opaznih delcev.

Najbolje je, če raztopino remifentanila za intravensko infuzijo pripravite tik pred uporabo. Vsebina vial je samo za enkratno uporabo. Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite skladno z lokalnimi predpisi.

Razpredelnice s smernicami za hitrost infundiranja zdravila Remifentanil Teva pri ročno nadzorovani infuziji in razpredelnice z ustrezno koncentracijo remifentanila v krvi v stanju dinamičnega ravnovesja med uporabo ciljno nadzorovane infuzije za različne hitrosti ročno nadzorovane infuzije so v povzetku glavnih značilnosti zdravila (SPC) Remifentanil Teva.

Informacije o shranjevanju

Glejte poglavje 5 »Shranjevanje zdravila Remifentanil Teva«.

Po prvem odprtju

Dokazali so, da ostane raztopina kemijsko in fizikalno stabilna 24 ur, če je shranjena pri temperaturi 25 °C in če je bila rekonstituirana z eno od naslednjih raztopin:

- voda za injekcije,
- 50 mg/ml (5 %) raztopina glukoze za injiciranje,
- 50 mg/ml (5 %) raztopina glukoze za injiciranje in 9 mg/ml (0,9%) raztopina natrijevega klorida za injiciranje,
- 9 mg/ml (0,9 %) raztopina natrijevega klorida za injiciranje,
- 4,5 mg/ml (0,45 %) raztopina natrijevega klorida za injiciranje,
- raztopina Ringerjevega laktata za injiciranje,
- raztopina Ringerjevega laktata in 50 mg/ml (5 %) raztopina glukoze za injiciranje.

Dokazali so, da ostane raztopina kemijsko in fizikalno stabilna 24 ur, če je shranjena pri temperaturi 25 °C in po nadaljnji razredčitvi z eno od naslednjih raztopin:

- voda za injekcije,
- 50 mg/ml (5 %) raztopina glukoze za injiciranje,
- 50 mg/ml (5 %) raztopina glukoze za injiciranje in 9 mg/ml (0,9%) raztopina natrijevega klorida za injiciranje,
- 9 mg/ml (0,9 %) raztopina natrijevega klorida za injiciranje,
- 4,5 mg/ml (0,45 %) raztopina natrijevega klorida za injiciranje.

Dokazali so, da ostane raztopina kemijsko in fizikalno stabilna 8 ur, če je shranjena pri temperaturi 25 °C in po nadaljnji razredčitvi z eno od naslednjih raztopin:

- raztopina Ringerjevega laktata za injiciranje,
- raztopina Ringerjevega laktata in 50 mg/ml (5 %) raztopina glukoze za injiciranje.

Iz mikrobiološkega stališča je treba zdravilo porabiti takoj. Če se zdravilo ne uporabi takoj, je uporabnik odgovoren za čas in pogoje hranjenja pred uporabo, shraniti pa se praviloma ne sme za več kot 24 ur pri temperaturi od 2 do 8 °C, razen če sta bili rekonstitucija in razredčitev opravljeni v nadzorovanih in preverjeno aseptičnih pogojih.

Neporabljene ostanke raztopine je treba zavreči.

Način uporabe

Zdravilo Remifentanil Teva je namenjeno samo za intravensko uporabo in se ne sme dajati v obliki epiduralne ali intratekalne injekcije.

Remifentanil se po rekonstituciji liofiliziranega praška ne sme uporabiti brez nadaljnje razredčitve.

Remifentanil se daje v neprekinjeni infuziji z uporabo kalibrirane infuzijske naprave v intravensko linijo s hitrim pretokom ali z namensko intravensko linijo. Ta infuzijska linija mora biti priključena na vensko kanilo ali v njeni neposredni bližini, da bi bil morebitni prazen prostor čim manjši.

Paziti je treba, da ne pride do zapore ali prekinitve infuzijske linije, ter poskrbeti za pravilno čiščenje po uporabi, tako da se iz linij odstranijo vsi ostanki remifentanila. Intravenske linije/infuzijski sistem je treba po uporabi odstraniti, da se prepreči nenameren vnos zdravila.

Remifentanil se lahko aplicira s pomočjo ciljno nadzorovane infuzije z uporabo odobrene infuzijske naprave, ki vključuje farmakokinetični model Minto s kovariatoma za starost in nenaščobno telesno maso (LBM).

Specifične smernice za ročno in ciljno nadzorovano infuzijo so v povzetku glavnih značilnosti zdravila (SPC) Remifentanil Teva. Informacije in priporočila za odmerjanje so v razdelkih o indukciji, vzdrževanju in prenehanju uporabe zdravila Remifentanil Teva pri odraslih, otrocih in bolnikih, ki potrebujejo posebno nego, na primer pri starejših, tistih z okvaro ledvic ali boleznimi srca ali pri bolnikih, ki se zdravijo na oddelku za intenzivno nego.