



OBALNE LEKARNE KOPER
GALENSKI LABORATORIJ
OIC-Hrpelje 14 C, Kozina

REHIDRAL

peroralni prašek

22,3 g

Napitek iz Rehidral praška priporočamo za nadomeščanje mineralov in tekočine pri diareji in po večjih telesnih aktivnostih.

ODMERJANJE IN UPORABA:

Vsebino vrečke raztopite v 1 L prekuhane vode.

Po športnih aktivnostih priporočamo vsebino 1 vrečke dnevno.

Pri diareji priporočamo prve 4 ure čim pogostejše uživanje raztopine v odmerku 50 -100 ml na kg telesne mase.

V naslednjih dneh po vsaki mehkejši ali tekoči stolici še 10 ml raztopine na kg telesne mase.

1 vrečka (22,3 g) vsebuje

16,20 g glukoze, 1,15 g natrijevega klorida, 1,50 g kalijevega klorida, 2,60 g natrijevega citrata in 0,85 g natrijevega hidrogenkarbonata.

Po jemanju zdravila lahko bolnik bruha, kar je lahko posledica prehitrega pitja raztopine.

V takem primeru počakajte 5 - 10 minut in mu nato dajajte raztopino v majhnih požirkih.

Če se bruhanje kljub temu ne ustavi, takoj prekinite zdravljenje in se posvetujte z zdravnikom!

Previdna uporaba raztopine je potrebna pri bolnikih s srčnimi obolenji, poslabšanim delovanjem ledvic, intoleranco na glukozo in dieto z nadzorovanim vnosom kalija ali natrija.

Zdravilo lahko uporabljajo nosečnice in doječe matere.

Posebna previdnost pa je potrebna v primeru nosečnosti toksemije.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo Rehidral je galenski izdelek, ki se izdaja brez recepta v lekarnah.



Serijska št.:04951013 Uporabno do:10.2015