

NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Tacni 0,5 mg trde kapsule
Tacni 1 mg trde kapsule
Tacni 5 mg trde kapsule
 takrolimus

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Tacni in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Tacni
3. Kako jemati zdravilo Tacni
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Tacni
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Tacni in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Tacni spada v skupino zdravil, ki jih imenujemo imunosupresivi. Po presaditvi organa (npr. jeter, ledvic, srca) bo imunski sistem telesa poskušal zavrniti novi organ.

Zdravilo Tacni se uporablja za obvladovanje telesnega imunskega odziva, kar omogoči, da telo sprejme presajeni organ.

Zdravilo Tacni se pogosto uporablja v kombinaciji z drugimi zdravili, ki prav tako zavirajo imunski sistem.

Zdravilo Tacni lahko dobite tudi zaradi trajajočega zavračanja presajenih jeter, ledvice, srca ali drugega organa, če zdravila, ki ste jih jemali pred tem, niso obvladala imunskega odziva po presaditvi.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Tacni

Ne jemljite zdravila Tacni

- Če ste alergični na takrolimus ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- Če ste alergični na sirolimus ali kateri koli makrolidni antibiotik (npr. eritromicin, klaritromicin, josamicin).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Tacni se posvetujte z zdravnikom:

- če jemljete zdravila, ki so omenjena v poglavju »Druga zdravila in zdravilo Tacni«,
- če imate ali ste imeli težave z jetri,
- če imate drisko, ki traja več kot en dan,
- če morate opraviti kakšno cepljenje.

Zdravnik bo morda moral prilagoditi vaš odmerek zdravila Tacni.

Redno morate biti v stiku s svojim zdravnikom. Zdravnik lahko od časa do časa naredi različne preiskave krvi, urina, delovanja srca in vida, da bi določil ustrezen odmerek zdravila Tacni. Med jemanjem zdravila Tacni morate omejiti izpostavljenost sončni svetlobi in UV (ultravijoličnim) žarkom, ker imunosupresivi lahko povečajo tveganje za pojav kožnega raka. Nositi morate primerna zaščitna oblačila in uporabljati sredstva za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem.

Druga zdravila in zdravilo Tacni

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli zdravilo.

Zdravila Tacni ne smete jemati skupaj s ciklosporinom.

Druga zdravila, ki jih jemljete, lahko vplivajo na koncentracijo zdravila Tacni v krvi, pa tudi jemanje zdravila Tacni lahko vpliva na koncentracijo drugih zdravil v krvi, zato utegne biti potrebno povečanje ali zmanjšanje odmerka. Še zlasti morate zdravniku povedati, če jemljete ali ste v zadnjem času jemali zdravila, kot so:

- protiglivična zdravila in antibiotiki, zlasti t. i. makrolidni antibiotiki, ki se uporabljajo za zdravljenje okužb, npr. ketokonazol, flukonazol, itraconazol, vorikonazol, klotrimazol, eritromicin, klaritromicin, josamicin in rifampicin,
- zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje okužbe z virusom HIV (npr. ritonavir),
- zdravila za zdravljenje želodčne razjede in refluksa (npr. omeprazol, lansoprazol ali cimetidin),
- antiemetiki, ki se uporabljajo za zdravljenje slabosti in bruhanja (npr. metoklopramid),
- cisaprid ali antacid magnezijev-aluminijev hidroksid, ki se uporablja za zdravljenje zgage,
- kontracepcijske tablete ali druga hormonska zdravljenja z etinilestradiolom, hormonska zdravljenja z danazolom,
- zdravila, ki se jih uporablja za zdravljenje visokega krvnega tlaka ali težav s srcem (npr. nifedipin, nikardipin, diltiazem in verapamil),
- zdravila, ki jih imenujemo "statini" in se uporabljajo za zdravljenje zvišanega holesterola in trigliceridov,
- fenitoin ali fenobarbital, ki se uporabljata za zdravljenje epilepsije,
- kortikosteroida prednizolon in metilprednizolon, ki spadata v skupino kortikosteroidov, ki se jih uporablja za zdravljenje vnetij in zaviranje imunskega sistema (npr. zavračanje presadka),
- nefazodon, ki se uporablja za zdravljenje depresije,
- pripravki rastlinskega izvora, ki vsebujejo šentjanževko (*Hypericum perforatum*) ali drugi pripravki rastlinskega izvora.

Povejte svojemu zdravniku, če jemljete ali morate jemati ibuprofen, amfotericin B ali protivirusna zdravila (npr. aciklovir). Če se ta zdravila jemljejo skupaj z zdravilom Tacni, se lahko poslabšajo težave z ledvicami ali živčnim sistemom.

Zdravnik mora vedeti tudi, če med jemanjem zdravila Tacni jemljete dodatke kalija ali določene diuretike, ki se jih uporablja za zdravljenje odpovedovanja srca, hipertenzije in ledvičnih obolenj (npr. amilorid, triamteren ali spironolakton), nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID, npr. ibuprofen), ki se jih uporablja pri povišani telesni temperaturi, pri vnetjih in bolečinah, antikoagulate (sredstva za redčenje krvi) ali peroralna zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni.

Če morate opraviti cepljenje, predhodno obvestite svojega zdravnika, da jemljete to zdravilo.

Zdravilo Tacni skupaj s hrano in pijačo

Vzemite zdravilo Tacni na prazen želodec ali 2 do 3 ure po jedi. Počakajte vsaj eno uro preden zaužijete naslednji obrok. Med zdravljenjem z zdravilom Tacni se morate izogibati uživanju grenivk (tudi pitju grenivkinega soka), saj lahko to vpliva na koncentracijo zdravila v krvi.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Takrolimus se izloča v materino mleko. Zato med prejemanjem zdravila Tacni ne smete dojiti.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Takrolimus ima lahko blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Ne vozite avtomobila ali upravljajte z orodji ali stroji, če ste po jemanju tega zdravila omotični, zaspani ali ne vidite jasno. Ti učinki so pogostejši, če hkrati uživate alkohol.

Zdravilo Tacni vsebuje laktozo

Zdravilo Tacni vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Tacni

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ko greste z receptom v lekarno, se vedno prepričajte, da ste dobili enako zdravilo s takrolimusom, razen če se je zdravnik, ki je strokovnjak za presaditve, strinjal z zamenjavo z drugim zdravilom s takrolimusom.

To zdravilo je potrebno jemati dvakrat na dan. Če videz tega zdravila ni enak kot običajno ali so se spremenila navodila za jemanje, se čim prej pogovorite z zdravnikom ali s farmacevtom, da se prepričate, da imate pravo zdravilo.

Začetni odmerek za preprečitev zavrnitve presajenega organa bo določil zdravnik na podlagi vaše telesne mase. Začetni odmerki tik po presaditvi so običajno v razponu od 0,075 do 0,30 mg na kg telesne mase na dan, odvisno od presajenega organa.

Vaš odmerek je odvisen od vašega splošnega stanja in od tega, katera druga imunosupresivna zdravila jemljete. Zdravnik bo redno izvajal preiskave krvi, da bo določil pravi odmerek in da ga bo od časa do časa prilagodil. Ko se bo vaše stanje ustalilo, bo zdravnik verjetno zmanjšal odmerek takrolimusa. Zdravnik vam bo natančno povedal, koliko kapsul morate jemati in kako pogosto.

Zdravilo Tacni se jemlje peroralno dvakrat na dan, običajno zjutraj in zvečer. Zdravilo Tacni morate praviloma jemati na prazen želodec oziroma vsaj 1 uro pred jedjo ali 2 do 3 ure po jedi. Kapsule morate zaužiti cele, s kozarcem vode. Med jemanjem zdravila Tacni se morate izogibati uživanju grenivk in pitju grenivkega soka. Ne zaužijte sušilnega sredstva, ki je v folijskem ovoju.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Tacni, kot bi smeli

Če ste nehote vzeli prevelik odmerek zdravila, pojdite takoj k svojemu zdravniku ali na urgenco najbližje bolnišnice.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Tacni

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste pozabili vzeti kapsule, počakajte, da bo čas za naslednji odmerek in potem nadaljujte kot prej.

Če ste prenehali jemati zdravilo Tacni

Prekinitev zdravljenja lahko poveča tveganje za zavrnitev presajenega organa. Ne prekinjajte zdravljenja, če vam tega ne naroči zdravnik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zdravilo Tacni zavira obrambni mehanizem vašega telesa in tako prepreči zavrnitev presajenega organa. Zaradi tega telo ne more premagovati okužb tako dobro kot običajno. Tako se lahko zgodi, da boste med jemanjem zdravila Tacni bolj kot običajno nagnjeni k okužbam kot so okužbe kože, ust, želodca in črevesja, pljuč ter sečil.

Pojavijo se lahko hudi neželeni učinki, vključno z alergijskimi in anafilaktičnimi reakcijami (lahko pride do nenadnega srbečega izpuščaja (koprivnice), otekanja dlani, stopal, gležnjev, obraza, ustnic, ust ali grla (kar lahko povzroči težave pri požiranju ali dihanju), lahko boste imeli občutek, da boste omedleli). To je lahko smrtno nevarno. Občasni neželeni učinek je hemolitično-uremični sindrom, bolezen za katero je značilna akutna odpoved ledvic (malo urina ali nič urina), mikroangiopatska hemolitična anemija (znižano število eritrocitov s hudo utrujenostjo), porumenelost kože ali oči (zlatenica) in znižano število trombocitov z nenormalnimi podplutbami ali krvavitvami in znaki okužbe. To je lahko smrtno nevarno. Redek neželeni učinek je trombotična trombocitopenična purpura (ali TTP), za katero je značilna zvišana telesna temperatura in podplutbe pod kožo, ki se lahko pojavijo kot drobne rdeče pike, z ali brez nerazložljive hude utrujenosti, zmedenost, porumenelost kože ali oči (zlatenica), s simptomi akutne ledvične odpovedi (malo urina ali nič urina). To je lahko smrtno nevarno. Po zdravljenju so poročali o benignih in malignih tumorjih, ki so bili posledica imunosupresije.

Možni neželeni učinki so naštetih po naslednjih skupinah:

Zelo pogosti neželeni učinki: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov.

Pogosti neželeni učinki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov.

Občasni neželeni učinki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov.

Redki neželeni učinki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov.

Zelo redki neželeni učinki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov.

Zelo pogosti neželeni učinki: pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov

- zvišana vrednost krvnega sladkorja, sladkorna bolezen, zvišanje koncentracije kalija v krvi
- težave s spanjem
- tresenje, glavobol
- zvišan krvni tlak
- driska, siljenje na bruhanje
- težave z ledvicami

Pogosti neželeni učinki: pojavijo se pri največ 1 od 10 bolnikov

- zmanjšanje števila krvnih celic (trombocitov, rdečih ali belih krvnih celic), povečanje števila belih krvnih celic, spremembe števila rdečih krvnih celic
- znižanje koncentracije magnezija, fosfatov, kalija, kalcija ali natrija v krvi, preobremenitev s tekočino, zvišanje koncentracije sečne kisline ali lipidov v krvi, zmanjšan apetit, povečana kislost krvi, druge spremembe elektrolitov v krvi (razvidno iz krvnih preiskav)
- simptomi tesnobe, zmedenost in dezorientiranost, depresija, motnje razpoloženja, nočne more, halucinacije, duševne motnje
- epileptični napadi, motnje zavesti, mravljinčenje in odrevenelost (včasih boleča) dlani in stopal, omotica, zmanjšana sposobnost za pisanje, bolezn živčevja
- zamegljen vid, večja občutljivost na svetlobo, očesne bolezni
- zvonjenje v ušesih
- zmanjšan pretok krvi skozi srčne žile, hitrejši srčni utrip
- krvavitve, delna ali popolna zgora krvnih žil, znižan krvni tlak
- zasoplost, spremembe v pljučnem tkivu, nabiranje tekočine okrog pljuč, vnetje žrela, kašelj, gripi podobni simptomi

- vnetje ali razjede, ki povzročajo bolečine v trebuhu ali drisko, krvavitve v želodcu, vnetje ali razjede v ustih, nabiranje tekočine v trebuhu, bruhanje, bolečine v trebuhu, prebavne težave, zaprtje, vetrovi, napenjanje, mehko blato, želodčne težave
- spremembe jetrnih encimov in delovanja jeter, porumenelost kože zaradi težav z jetri, okvara jetrnega tkiva in vnetje jeter
- srbenje, izpuščaj, izpadanje las, akne, močnejše znojenje
- bolečine v sklepih, udih ali hrbtu, mišični krči
- nezadostno delovanje ledvic, zmanjšano nastajanje urina, motnje uriniranja ali boleče uriniranje
- splošna oslabelost, povišana telesna temperatura, zastajanje tekočin v telesu, bolečine in nelagodje, zvišanje vrednosti encima alkalne fosfataze v krvi, povečanje telesne mase, moteno občutenje temperature
- nezadostno delovanje presajenega organa

Občasni neželeni učinki: pojavijo se pri največ 1 od 100 bolnikov

- motnje strjevanja krvi, zmanjšanje števila vseh krvnih celic
- dehidracija, zmanjšanje ravni beljakovin ali sladkorja v krvi, povečanje koncentracije fosfatov v krvi
- koma, možganska krvavitev, kap, paraliza, možganska motnja, motnje govora in izražanja, težave s spominom
- motnost očesne leče
- okvara sluha
- nereden srčni utrip, prenehanje srčnih utripov, zmanjšana zmogljivost srca, bolezen srčne mišice, povečanje srčne mišice, močnejši srčni utrip, nenormalen EKG, nepravilen srčni ritem in srčni utrip
- krvni strdek v veni okončine, šok
- težave z dihanjem, bolezen dihal, astma
- zapora črevesa, zvišana raven encima amilaze v krvi, refluks želodčne vsebine v žrelo, upočasnjeno praznjenje želodca
- dermatitis, pekoč občutek na sončni svetlobi
- bolezen sklepov
- nezmožnost uriniranja, boleče menstruacije in nenormalne menstruacijske krvavitve
- odpoved nekaterih organov, gripi podobna bolezen, večja občutljivost za vročino in mraz, občutek pritiskanja na prsi, živčnost ali nenormalno počutje, zvišanje vrednosti encima laktat-dehidrogenaze v krvi, hujšanje

Redki neželeni učinki: pojavijo se pri največ 1 od 1.000 bolnikov

- povečana togost mišic
- slepota
- naglušnost
- nabiranje tekočine okrog srca
- nenadna zasoplost
- nastanek ciste v trebušni slinavki
- težave s pretokom krvi v jetrih
- resna bolezen z mehurji na koži, v ustih, na očeh in spolovilih, močnejša poraščenost
- žeja, padec, občutek tiščanja v prsih, zmanjšana gibljivost, razjeda

Zelo redki neželeni učinki: pojavijo se pri največ 1 od 10.000 bolnikov

- mišična šibkost
- ehokardiografske nepravilnosti
- odpoved jeter, zožitev žolčevoda
- boleče uriniranje s krvjo v urinu
- povečanje mase maščobnega tkiva

Poročali so o pojavu aplazije rdečih krvnih celic (zelo znižano število rdečih krvničk), agranulocitozi (zelo znižano število belih krvničk) in hemolitični anemiji (znižano število rdečih krvničk zaradi nenormalnega razpada).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Tacni

- Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
- Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.
- Shranjujte v originalni ovojnini (v aluminijasti foliji) za zagotovitev zaščite pred vlago in svetlobo.
- Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca. Po odprtju aluminijaste vrečke je potrebno izdelek porabiti v roku enega leta.
- Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Tacni

Tacni 0,5 mg trde kapsule

Zdravilna učinkovina je takrolimus.

0,5 mg: Ena kapsula vsebuje 0,5 mg takrolimusa.

Pomožne snovi so:

- Vsebina kapsul: povidon K-30, premrežen natrijev karmelozat (E468), brezvodna laktoza, magnezijev stearat.
- Ovojnica kapsul: titanov dioksid (E171), rumeni železov oksid (E172), želatina.

Tacni 1 mg trde kapsule

Zdravilna učinkovina je takrolimus.

1 mg: Ena kapsula vsebuje 1 mg takrolimusa.

Pomožne snovi so:

- Vsebina kapsul: povidon K-30, premrežen natrijev karmelozat (E468), brezvodna laktoza, magnezijev stearat.
- Ovojnica kapsul: titanov dioksid (E171), želatina.

Tacni 5 mg trde kapsule

Zdravilna učinkovina je takrolimus.

5 mg: Ena kapsula vsebuje 5 mg takrolimusa.

Pomožne snovi so:

- Vsebina kapsul: povidon K-30, premrežen natrijev karmelozat (E468), brezvodna laktoza, magnezijev stearat.
- Ovojnica kapsul: titanov dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172), želatina.

Izgled zdravila Tacni in vsebina pakiranja

Tacni 0,5 mg trde kapsule

Trde kapsule s pokrovčkom in telesom slonokoščene barve, v katerih je bel prašek.

Tacni 0,5 mg trde kapsule so na voljo v pretisnih omotih s po 10 kapsulami. Pretisni omoti s sušilnim sredstvom, ki kapsule varuje pred vlago, so hranjeni v vrečki iz aluminijaste folije. Sušilnega sredstva se ne sme zaužiti.

Tacni 1 mg trde kapsule

Trde kapsule s pokrovčkom in telesom bele barve, v katerih je bel prašek.

Tacni 1 mg trde kapsule so na voljo v pretisnih omotih s po 10 kapsulami. Pretisni omoti s sušilnim sredstvom, ki kapsule varuje pred vlago, so hranjeni v vrečki iz aluminijaste folije. Sušilnega sredstva se ne sme zaužiti.

Tacni 5 mg trde kapsule

Trde kapsule s pokrovčkom in telesom rdeče barve, v katerih je bel prašek.

Tacni 5 mg trde kapsule so na voljo v pretisnih omotih s po 10 kapsulami. Pretisni omoti s sušilnim sredstvom, ki kapsule varuje pred vlago, so hranjeni v vrečki iz aluminijaste folije. Sušilnega sredstva se ne sme zaužiti.

Zdravilo Tacni je na voljo v pretisnih omotih po 10 kapsul.

20, 30, 50, 50x1, 60, 90 in 100 kapsul

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdajanja zdravila

H/Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nizozemska

Izdelovalci

Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10-Políg Areta 31620 Huarte-Pamplona, Navarra
Španija

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Nizozemska

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Nizozemska

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
Ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków
Poljska

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

UK:	Tacni 0.5mg Hard capsules Tacni 1mg Hard capsules Tacni 5mg Hard capsules
AT:	Tacni transplant 0,5 mg Hartkapseln Tacni transplant 1 mg Hartkapseln Tacni transplant 5 mg Hartkapseln
BE:	Tacni 0,5 mg, capsules, hard Tacni 1 mg, capsules, hard Tacni 5 mg, capsules, hard
BG:	Tacni 0,5 mg капсули, твърди Tacni 1 mg капсули, твърди Tacni 5 mg капсули, твърди
CY:	Tacni, 0.5mg καψάκια σκληρά Tacni, 1mg καψάκια σκληρά Tacni, 5mg καψάκια σκληρά
CZ:	Tacni 0,5 mg, tvrdé tobolky Tacni 1 mg, tvrdé tobolky Tacni 5 mg, tvrdé tobolky
DE:	Tacni 0,5 mg Hartkapsel Tacni 1 mg Hartkapsel Tacni 5 mg Hartkapsel
DK:	Tacniteva 0,5 mg Tacniteva 1 mg Tacniteva 5 mg
EL:	Tacni 0,5 mg καψάκια σκληρά Tacni 1 mg καψάκια σκληρά Tacni 5 mg καψάκια σκληρά
ES:	Tacni 0,5 mg cápsulas duras EFG Tacni 1 mg cápsulas duras EFG Tacni 5 mg cápsulas duras EFG
FI:	Tacni, 0.5 mg kapseli, kova Tacni, 1 mg kapseli, kova Tacni, 5 mg kapseli, kova
HU:	Tacni 0,5 mg kemény kapszula Tacni 1 mg kemény kapszula Tacni 5 mg kemény kapszula
IE:	Tacni 0.5mg Hard Capsules Tacni 1mg Hard Capsules Tacni 5mg Hard Capsules
IS:	Tacni 0,5mg hart hylki

	Tacni 1mg hart hylki
	Tacni 5mg hart hylki
IT:	Tacni 0.5mg Capsule rigide
	Tacni 1mg Capsule rigide
	Tacni 5mg Capsule rigide
LU:	Tacni, 0.5mg Gélules
	Tacni, 1mg Gélules
	Tacni, 5mg Gélules
NL:	Tacni 0,5 mg, capsules, hard
	Tacni 1 mg, capsules, hard
	Tacni 5 mg, capsules, hard
NO:	Tacni, 0,5 mg kapsler, harde
	Tacni, 1 mg kapsler, harde
	Tacni, 5 mg kapsler, harde
PL:	Tacni
	Tacni
	Tacni
PT:	Tacni 0,5 mg Cápsulas
	Tacni 1 mg Cápsulas
	Tacni 5 mg Cápsulas
RO:	TACNI 0,5 mg capsule
	TACNI 1 mg capsule
	TACNI 5 mg capsule
SE:	Tacni, 0,5 mg kapsel, hård
	Tacni, 1 mg kapsel, hård
	Tacni, 5 mg kapsel, hård
SI:	Tacni 0,5 mg trde kapsule
	Tacni 1 mg trde kapsule
	Tacni 5 mg trde kapsule

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 9.11.2017.