

NAVODILO ZA UPORABO

Oxis Turbuhaler 4,5 mikrograma/odmerek prašek za inhaliranje **Oxis Turbuhaler 9 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje** formoterolijev fumarat dihidrat

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Oxis Turbuhaler in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Oxis Turbuhaler
3. Kako jemati zdravilo Oxis Turbuhaler
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Oxis Turbuhaler
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO OXIS TURBUHALER IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Oxis Turbuhaler je inhalator. Vsebuje zdravilno učinkovino imenovano formoterol in spada v skupino zdravil, ki jim pravimo 'dolgodelujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β_2 ' ali 'bronhodilatatorji'.

Zdravilo Oxis Turbuhaler deluje tako, da sprošča mišice v dihalih in tako pomaga olajšati dihanje. Učinek zdravila Oxis Turbuhaler običajno nastopi v 1 do 3 minutah in traja do 12 ur.

Vaš zdravnik vam je predpisal zdravilo Oxis Turbuhaler za lajšanje težav z dihanjem, ki jih imate zaradi astme ali kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB).

Astma

Za zdravljenje astme vam bo zdravnik predpisal dva ločena inhalatorja: zdravilo Oxis Turbuhaler in inhalator z glukokortikoidom (zdravilo proti vnetju). Inhalatorja morate uporabljati sočasno.

- Zdravilo Oxis Turbuhaler se uporablja za preprečevanje pojava simptomov astme.
- Nekateri bolniki uporabljajo zdravilo Oxis Turbuhaler, kadar potrebujejo dodatne odmerke za lajšanje simptomov astme, zaradi česar lažje dihajo.
- Zdravilo Oxis Turbuhaler se lahko uporablja pred naporom za preprečevanje simptomov povzročenih z naporom.

Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)

Zdravilo Oxis Turbuhaler se lahko uporablja za lajšanje simptomov KOPB pri odraslih. KOPB je dolgotrajna bolezen dihalnih poti v pljučih, ki jo pogosto povzroči kajenje.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO OXIS TURBUHALER

Ne uporabljajte zdravila Oxis Turbuhaler

- če ste alergični (preobčutljivi) na formoterol ali laktozo (ki vsebuje manjše količine mlečnih beljakovin).

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Oxis Turbuhaler

V nekaterih primerih se sme zdravilo Oxis Turbuhaler uporabljati le s posebno previdnostjo. Pred uporabo zdravila Oxis Turbuhaler se posvetujte s svojim zdravnikom, če imate:

- sladkorno bolezen. Morda boste med uporabo zdravila Oxis Turbuhaler potrebovali dodatne preiskave za določitev koncentracije sladkorja v krvi;
- zelo visok krvni tlak ali ste kdaj imeli težave s srcem,
- tumor skorje nadledvične žleze, ki izloča hormone (feokromocitom);
- razširitev žile, ki se lahko pretrga (anevrizmo);
- nizko koncentracijo kalija v krvi. Morda bo zdravnik med zdravljenjem spremljal koncentracijo kalija z ustreznimi preiskavami krvi.

Če opazite, da ste ob jemanju zdravila Oxis Turbuhaler zasopli ali težko dihate, nadaljujte z jemanjem zdravila, vendar čim prej obiščite svojega zdravnika, saj boste morda potrebovali dodatno zdravljenje.

Če se vam dihanje ali piskanje TAKOJ po uporabi inhalatorja poslabša (lahko pride tudi do kašlja in stiskanja v prsih), takoj prenehajte uporabljati zdravilo Oxis Turbuhaler in se posvetujte z zdravnikom. To je posledica krča dihalnih poti v pljučih (imenovanega paradoksn bronhospazem), vendar se pojavi le zelo redko (glejte tudi 4. poglavje).

Vaš zdravnik (medicinska sestra) vam bosta pomagala doseči nadzor nad simptomi vaše astme. Odmerek zdravila vam bodo postopoma znižali do najmanjšega odmerka, ki še učinkovito nadzoruje simptome astme. Kljub temu sami ne prilagajajte odmerka, ampak se najprej posvetujte z zdravnikom (medicinsko sestro).

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. Zdravilo Oxis Turbuhaler lahko vpliva na delovanje drugih zdravil in nekatera zdravila lahko vplivajo na delovanje zdravila Oxis Turbuhaler.

Še zlasti morate zdravniku povedati, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- zdravila, ki jih imenujemo antagonisti adrenergičnih receptorjev beta (kot sta atenolol ali propranolol za zdravljenje visokega pritiska), nekatere kapljice za oko (npr. timolol za zdravljenje glavkoma);
- zdravila za zdravljenje hitrega ali nerednega srčnega utripa (kinidin);
- peroralne kortikosteroide (zdravila za lajšanje bolečin in vnetij),
- ksantine (kot sta teofilin ali aminofilin), ki se pogosto uporabljajo pri zdravljenju astme,
- antihistaminike (terfenadin, astemizol, mizolastin); ki se uporabljajo za zdravljenje alergij;
- eritromicin (za zdravljenje vnetij);
- triciklične antidepresive (amitriptilin);
- diuretike za zdravljenje visokega pritiska (furosemid);
- digoksin, ki se uporablja za zdravljenje bolezni srca;
- druga zdravila, ki sproščajo mišice v dihalih (bronhodilatatorje, npr. salbutamol);
- efedrin, ki se uporablja za zdravljenje astme ali kot dekongestiv.

Če boste imeli operacijo, povejte svojemu zdravniku ali zobozdravniku, da jemljete zdravilo Oxis Turbuhaler, saj lahko slednje medsebojno deluje z nekaterimi zdravili, ki se uporabljajo v splošni anesteziji.

Dodatek zdravil iz skupine antiholinergikov (kot sta na primer tiotropij ali ipratropijev bromid) k zdravljenju z zdravilom Oxis Turbuhaler, lahko pripomore k še večji razširitvi vaših dihalnih poti.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

- Če ste noseči ali nameravate zanositi, se pred uporabo zdravila Oxis Turbuhaler posvetujte z zdravnikom – ne uporabljajte zdravila Oxis Turbuhaler, če vam tega izrecno ne naroči zdravnik.

Če zanosite med zdravljenjem z zdravilom Oxis Turbuhaler, ne prenehajte z uporabo zdravila, se pa takoj posvetujte z zdravnikom.

- Če dojdete, se pred uporabo zdravila Oxis Turbuhaler posvetujte s svojim zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Oxis Turbuhaler ne vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Oxis Turbuhaler

Oxis Turbuhaler vsebuje laktozo, ki je vrsta sladkorja. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se z njim posvetujte, preden vzamete to zdravilo. Količina laktoze, ki je v tem zdravilu, običajno ne povzroča težav pri bolnikih, ki ne prenašajo laktoze.

Pomožna snov laktoza vsebuje tudi majhne količine mlečnih beljakovin, ki lahko povzročijo alergijsko reakcijo.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO OXIS TURBUHALER

- Pri uporabi zdravila Oxis Turbuhaler natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Odmerka zdravila Oxis Turbuhaler ne smete povečevati brez posveta s svojim zdravnikom.
- Če redno uporabljate zdravilo Oxis Turbuhaler pri astmi ali KOPB, nadaljujte z uporabo zdravila, četudi so simptomi bolezni odsotni.

Pomembne informacije o simptomih astme ali KOPB

Če med uporabo zdravila Oxis Turbuhaler občutite, da dihanje postaja težje ali piskajoče, nadaljujte z uporabo zdravila, vendar pa čim prej obiščite zdravnika, saj boste morda potrebovali dodatno zdravljenje.

Nemudoma se posvetujte z zdravnikom:

- če težje dihate ali se ponoči pogosto zbujate zaradi astme,
- če se vam je začel pojavljati občutek stiskanja v prsih,
- če z uporabo predpisanega odmerka ne dosežete olajšanja,
- če morate uporabljati večji odmerek od običajnega več kot dva dni v tednu,
- če morate pred naporom uporabljati zdravilo bolj pogosto kot običajno.

Ti znaki lahko pomenijo, da astma ali KOPB ni dobro obvladana in morda boste potrebovali drugačno ali dodatno zdravljenje.

Odmerjanje zdravila Oxis Turbuhaler 4,5 mikrograma/odmerek

Uporaba zdravila Oxis Turbuhaler pri otrocih, mlajših od 6 let, ni priporočljiva.

Astma

Odrasli (stari 18 let ali več)

- Običajni vzdrževalni odmerek: 1 do 2 vdiha, enkrat ali dvakrat na dan.
- Zdravnik vam lahko predpiše večji odmerek, tj. do 4 vdihe, enkrat ali dvakrat na dan.
- Nekateri bolniki uporabljajo zdravilo Oxis Turbuhaler kot »olajševalec«. Za lajšanje simptomov astme vam bo morda zdravnik svetoval, da dodatno vzamete 1 do 2 vdiha po potrebi.
- Preprečevanje simptomov, ki se pojavijo pri telesnem naporu: 2 vdiha pred naporom.
- Celotni dnevni odmerek zdravila ne sme preseči 8 vdihov. Ta vključuje vdihe, ki jih jemljete redno, vdihe, ki jih vzamete ob pojavu simptomov astme ali pred naporom. Kljub temu vam zdravnik lahko svetuje, da vzamete do največ 12 vdihov na dan.
- Pri tem upoštevajte, da ne smete vzeti več kot 6 vdihov naenkrat.

Otroci in mladostniki (stari 6 let ali več)

- Običajni vzdrževalni odmerek: 2 vdiha, enkrat ali dvakrat na dan.
- Nekateri bolniki uporabljajo zdravilo Oxis Turbuhaler kot »olajševalec«. Za lajšanje simptomov astme bo zdravnik morda svetoval, da otrok ali mladostnik dodatno vzame 1 do 2 vdiha po potrebi.
- Preprečevanje simptomov, ki se pojavijo pri telesnem naporu: 1 ali 2 vdiha pred naporom.
- Celotni dnevni odmerek zdravila ne sme preseči 4 vdihe. Ta vključuje vdihe, ki jih otrok (mladostnik) jemlje redno, vdihe, ki jih vzame ob pojavu simptomov astme ali pred naporom. Kljub temu zdravnik lahko svetuje, da otrok ali mladostnik vzame do največ 8 vdihov na dan.
- Pri tem upoštevajte, da ne sme vzeti več kot 2 vdiha naenkrat.

Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)

- Običajni vzdrževalni odmerek: 2 vdiha, enkrat ali dvakrat na dan.
- Dnevni odmerek pri redni uporabi zdravila ne sme preseči 4 vdihe.
- Zdravnik vam lahko svetuje, da za lajšanje simptomov KOPB vzamete dodatne vdihe.
- Če vam je zdravnik poleg redne uporabe zdravila predpisal dodatne vdihe za lajšanje simptomov, dnevni odmerek ne sme preseči 8 vdihov. Pri tem upoštevajte, da ne smete vzeti več kot 4 vdihe naenkrat.

Odmerjanje zdravila Oxis Turbuhaler 9 mikrogramov/odmerek

Uporaba zdravila Oxis Turbuhaler pri otrocih, mlajših od 6 let, ni priporočljiva.

Astma

Odrasli (stari 18 let in več)

- Običajni vzdrževalni odmerek: 1 vdih, enkrat ali dvakrat na dan.
- Zdravnik vam lahko predpiše večji odmerek, tj. do 2 vdiha, enkrat ali dvakrat na dan.
- Nekateri bolniki uporabljajo zdravilo Oxis Turbuhaler kot »olajševalec«. Za lajšanje simptomov astme vam bo morda zdravnik svetoval, da dodatno vzamete 1 vdih po potrebi.
- Preprečevanje simptomov, ki se pojavijo pri telesnem naporu: 1 vdih pred naporom.
- Celotni dnevni odmerek zdravila ne sme preseči 4 vdihe. Ta vključuje vdihe, ki jih jemljete redno, vdihe, ki jih vzamete ob pojavu simptomov astme ali pred naporom. Kljub temu vam zdravnik lahko svetuje, da vzamete do največ 6 vdihov na dan.
- Pri tem upoštevajte, da ne smete vzeti več kot 3 vdihe naenkrat.

Otroci in mladostniki (stari 6 let ali več)

- Običajni vzdrževalni odmerek: 1 vdih, enkrat ali dvakrat na dan.
- Nekateri bolniki uporabljajo zdravilo Oxis Turbuhaler kot »olajševalec«. Za lajšanje simptomov astme bo zdravnik morda svetoval, da otrok ali mladostnik dodatno vzame 1 vdih po potrebi.
- Preprečevanje simptomov, ki se pojavijo pri telesnem naporu: 1 vdih pred naporom.
- Celotni dnevni odmerek zdravila ne sme preseči 2 vdihov. Ta vključuje vdihe, ki jih otrok (mladostnik) jemlje redno, vdihe, ki jih vzame ob pojavu simptomov astme ali pred naporom. Kljub temu zdravnik lahko svetuje, da otrok ali mladostnik vzame do največ 4 vdihe na dan.
- Pri tem upoštevajte, da ne sme vzeti več kot 1 vdih naenkrat.

Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)

- Običajni vzdrževalni odmerek: 1 vdih, enkrat ali dvakrat na dan.
- Dnevni odmerek pri redni uporabi zdravila ne sme preseči 2 vdiha.
- Zdravnik vam lahko svetuje, da za lajšanje simptomov KOPB vzamete dodatne vdihe.
- Če vam je zdravnik poleg redne uporabe zdravila predpisal dodatne vdihe za lajšanje simptomov, dnevni odmerek ne sme preseči 4 vdihov. Pri tem upoštevajte, da ne smete vzeti več kot 2 vdiha naenkrat.

Navodila za uporabo in ravnanje

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite celotna navodila.

Turbuhaler je večodmerni inhalator, ki oddaja zelo majhne količine praška (slika 1). Ko vdihnete skozi Turbuhaler, pride prašek v pljuča. Zato je pomembno, da **močno in globoko vdihnete** skozi ustnik.

Priprava novega inhalatorja za uporabo


Preden inhalator Turbuhaler **prvič uporabite**, ga morate pripraviti za uporabo.



Slika 1

Odvijte in dvignite pokrovček.

Inhalator držite pokonci, tako da je ročaj spodaj (slika 2). Medtem ko vrtite ročaj, ne držite za ustnik. **Zavrtite ročaj, kolikor daleč gre v eno smer, in potem nazaj, kolikor daleč gre v nasprotno smer.** Ni pomembno, v katero smer ga zavrtite najprej. Med tem postopkom boste slišali klik.



Slika 2

Inhalator je zdaj pripravljen za uporabo.

Za uporabo odmerka nadaljujte po navodilih, opisanih v nadaljevanju.

KAKO UPORABLJATI OXIS TURBUHALER

Za uporabo enega odmerka sledite navodilom spodaj.

1. Odvijte in dvignite pokrovček.
2. **Inhalator držite pokonci**, tako da je ročaj spodaj (slika 2). Medtem ko vrtite ročaj, ne držite za ustnik. Da boste inhalator napolnili z odmerkom, **zavrtite ročaj, kolikor daleč gre v eno smer, in potem nazaj, kolikor daleč gre v nasprotno smer.** Ni pomembno, v katero smer ga zavrtite najprej. Med tem postopkom boste slišali klik.
3. Držite inhalator odmaknjen od ust. **Izdihnite.** Ne izdihnite v ustnik!

4. Ustnik previdno namestite med zobe, zaprite ustnice ter **močno in globoko vdihnite skozi pripomoček** (slika 3). Ustnika ne smete stisniti z zobmi ali zagristi vanj.



Slika 3

5. **Inhalator vzemite iz ust, preden izdihnete.**
6. Če vam je zdravnik predpisal več kot en odmerek, ponovite korake od 2 do 5.
7. **Znova namestite pokrovček**, tako da ga tesno privijete nazaj.
8. **Po inhaliranju predpisanega odmerka, si usta splaknite z vodo.**

OPOZORILO:

Nikoli ne izdihnite v ustnik.

Po uporabi vedno pravilno namestite pokrovček.

Količina oddanega praška je zelo majhna, zato zdravila po inhaliranju morda ne boste okusili. Toda če ste upoštevali navodila, ste še vedno lahko prepričani, da ste vdihnili odmerek.

Čiščenje

Zunanost ustnika redno (vsak teden) očistite s suho krpicco.


Za čiščenje ustnika ne uporabljajte vode.

Kazalnik odmerkov

Ko se v okencu kazalnika prvič pokaže rdeča oznaka, je v inhalatorju preostalo še približno 20 odmerkov (slika 4). Ko rdeča oznaka doseže spodnji rob okenca, inhalator ne bo več oddal pravilne količine zdravila in ga je treba zavreči (slika 5). Zvoka, ki ga slišite, ko stresete inhalator, ne oddaja zdravilo, temveč sušilno sredstvo.



Slika 4



Slika 5

Odlaganje

Inhalator Turbuhaler vedno zavrzite odgovorno, ker v njem ostane še nekaj zdravila. Za nasvet se obrnite na svojega farmacevta.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Oxis Turbuhaler, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Oxis Turbuhaler, kot bi smeli ali je npr. otrok pomotoma zaužil zdravilo, se takoj posvetujte z zdravnikom ali pojdite v bolnišnico.

Lahko se pojavijo naslednji neželeni učinki: tresenje, glavobol in neprijetni občutki ob močnem ali hitrem utripanju srca.

Če ste pozabili uporabiti odmerek zdravila Oxis Turbuhaler

- Če ste pozabili uporabiti odmerek, ga uporabite, takoj ko se spomnite. Če pa je že skoraj čas za naslednji odmerek, izpustite pozabljeni odmerek.
- **Ne uporabite** dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Oxis Turbuhaler

Zdravila Oxis Turbuhaler ne smete prenehati uporabljati brez posveta z zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi Oxis Turbuhaler neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Neželeni učinki so običajno blagi in izginejo v enem do dveh tednih zdravljenja. Svojemu zdravniku povejte, če vas kateri od spodaj naštetih učinkov moti ali traja dlje časa, pa tudi če vas moti kakšen drug nenavaden učinek, ki tu ni naveden.

Pogosti (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov):

- glavobol,
- tresenje,
- neprijetni občutki ob hitrem ali močnem utripanju srca.

Občasni (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov):

- motnje spanja
- nemir, huda tesnoba,
- hiter srčni utrip,
- mišični krči.

Redki (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov):

- neenakomeren srčni utrip,
- občutek siljenja na bruhanje,
- preobčutljivostne reakcije, npr. krč dihalnih poti (bronhospazem), kožni izpuščaji, koprivnica, srbenje,
- nizke vrednosti kalija v krvi.

Zelo redki (pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov):

- bolečina ali tiščanje v prsnem košu, lahko povezano tudi z občutkom dušenja (angina pectoris),
- zvišane vrednosti krvnega sladkorja,
- motnje okusa,
- omotica,
- nihanje krvnega tlaka,
- v zelo redkih primerih lahko tudi sama zdravila za inhaliranje povzročijo krč dihalnih poti (paradokсни bronhospazem; glejte tudi poglavje »Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Oxis Turbuhaler«).

Podobno kot druga zdravila iz skupine agonistov receptorjev β_2 , lahko tudi zdravilo Oxis Turbuhaler povzroči spremembe koncentracij nekaterih snovi v vaši krvi, vendar se te lahko določi le z laboratorijsko preiskavo.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu ali vam zdravilo povzroča kakršnekoli druge težave, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA OXIS TURBUHALER

- Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
- Shranjujte pri temperaturi do 30°C, s tesno privitim pokrovčkom.
- Po uporabi morate inhalator vedno dobro zapreti s pokrovčkom.
- Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na inhalatorju in zunanji ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.
- Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Oxis Turbuhaler

Zdravilna učinkovina je formoterol v obliki formoterolijevega fumarata dihidrata. Pomožna snov je laktoza monohidrat, ki vsebuje majhne količine mlečnih beljakovin.

Oxis Turbuhaler 4,5 mikrograma: en vdih vsebuje 4,5 mikrograma formoterolijevega fumarata dihidrata.

Oxis Turbuhaler 9 mikrogramov: en vdih vsebuje 9 mikrogramov formoterolijevega fumarata dihidrata.

Izgled zdravila Oxis Turbuhaler in vsebina pakiranja

Zdravilo Oxis Turbuhaler je inhalator, ki vsebuje prašek. Prašek za inhaliranje je bele barve. V inhalatorju je 60 odmerkov.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street
London, W2 6BD
Velika Britanija

Izdelovalca

AstraZeneca AB
S-151 85 Södertälje
Švedska
in
AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park
Macclesfield, Cheshire
SK10 2NA
Velika Britanija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

AstraZeneca UK Limited
Podružnica v Sloveniji
Verovškova ulica 55
1000 Ljubljana
Tel: 01/5135 600
Fax: 01/5135 635

Navodilo je bilo odobreno 17.1.2013

Navedene blagovne znamke so last skupine podjetij AstraZeneca.
© AstraZeneca 2013