

NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Alprazolam Grindeks 0,25 mg tablete
Alprazolam Grindeks 0,5 mg tablete
Alprazolam Grindeks 1 mg tablete

alprazolam

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Alprazolam Grindeks in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Alprazolam Grindeks
3. Kako jemati zdravilo Alprazolam Grindeks
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Alprazolam Grindeks
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Alprazolam Grindeks in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Alprazolam Grindeks je pomirjevalo in spada v skupino benzodiazepinov.

Zdravilo Alprazolam Grindeks se uporablja pri odraslih za zdravljenje simptomov tesnobe, ki so hudi, ovirajo bolnika ali mu povzročajo hudo stisko. To zdravilo je namenjeno le za kratkotrajno uporabo.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Alprazolam Grindeks

Ne jemljite zdravila Alprazolam Grindeks

- če ste alergični na alprazolam, druge benzodiazepine ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če imate bolezen, imenovano miastenija gravis, ki povzroča šibkost in utrujenost mišic;
- če imate hude težave s prsnim košem ali težave z dihanjem (npr. kronični bronhitis ali emfizem);
- če imate sindrom apneje v spanju - to je stanje, pri katerem je dihanje med spanjem neredno in se za kratek čas celo ustavi;
- če imate hude težave z jetri.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Alprazolam Grindeks se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če:

- zlorabljate ali ste zlorabljali alkohol, droge ali zdravila;
- ste alprazolam jemali dlje časa, saj se lahko učinek zmanjša;
- je vaše splošno stanje oslabiljeno;
- imate težave s pljuči, ledvicami ali jetri;
- jemljete druga zdravila za duševne bolezni.

Odvisnost

Uporaba zdravila Alprazolam Grindeks lahko povzroči fizično in psihično odvisnost od zdravila. Tveganje za odvisnost se poveča z odmerkom in trajanjem zdravljenja. Zato mora biti trajanje zdravljenja čim krajše. Upoštevajte zdravnikova priporočila glede odmerjanja (glejte poglavje 3). Psihično odvisnost opazite tako, da ne želite prenehati jemati zdravila. Fizična odvisnost pomeni, da se pojavijo odtegnitveni simptomi, ko se zdravljenje s tem zdravilom nenadoma prekine. Tveganje je večje tudi pri bolnikih, ki zlorablajo ali so zlorabljali alkohol ali zdravila (glejte tudi poglavje 3 »Če ste prenehali jemati zdravilo Alprazolam Grindeks«). Zloraba zdravila je znano tveganje pri uporabi zdravila Alprazolam Grindeks. Zloraba tega zdravila lahko privede do prevelikega odmerjanja in smrti. Vedno upoštevajte zdravnikova priporočila glede odmerjanja. To zdravilo lahko iščejo osebe, ki zlorablajo zdravila na recept, zato ga je treba hraniti zunaj dosega drugih oseb.

Motnje spomina

Med zdravljenjem z alprazolamom lahko pride do motenj spomina. To se običajno zgodi nekaj ur po zaužitju zdravila. Če opazite tak simptom, se posvetujte z zdravnikom. Da bi zmanjšali tveganje, poskrbite, da boste med jemanjem tega zdravila spali nemoteno celo noč (7 do 8 ur).

Duševna bolezen (psihoza)

Če imate psihozo, hudo duševno bolezen, ki moti vaše vedenje, delovanje in samokontrolo, potem zdravilo Alprazolam Grindeks za vas ni primerno.

Vpliv na razpoloženje

Uporaba alprazolama lahko poveča tveganje za epizode hipomanije (blažja oblika manije) in manije (hiperaktivno duševno stanje, pretirana vznesenost in energija) pri bolnikih z depresijo. Takoj se posvetujte z zdravnikom, če se pri vas pojavijo znaki hipomanije ali manije.

Depresija, misli o samopoškodovanju ali samomoru

Zdravljenje z alprazolamom lahko poveča tveganje za pojav misli o samopoškodovanju ali samomoru, če imate depresijo. Pred začetkom zdravljenja z alprazolamom se posvetujte z zdravnikom.

Če je zdravljenje z alprazolamom potrebno in če ste depresivni ali ste že razmišljali o samopoškodovanju ali samomoru, vas bo zdravnik pozorno spremljal. Če se vam kadar koli pojavijo misli o samopoškodovanju ali samomoru, se **nemudoma** posvetujte z zdravnikom ali pojdite v bolnišnico.

Starejši

Pri uporabi alprazolama bodite še posebej previdni, če ste starejši, ker lahko povzroči večjo utrujenost in/ali mišično oslabeledost, kar lahko poveča tveganje za padce.

Otroci in mladostniki

Tega zdravila ne dajajte otrokom in mladostnikom, mlajšim od 18 let, ker varnost in učinkovitost nista bili dokazani.

Druga zdravila in zdravilo Alprazolam Grindeks

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Na učinek zdravljenja lahko vpliva sočasna uporaba zdravila Alprazolam Grindeks z drugimi zdravili za zdravljenje spodaj naštetih bolezni. Zdravnik vam bo morda moral prilagoditi odmerek.

- duševne težave (antipsihotična zdravila, vključno s klopazinom);
- motnje spanja (uspavalne tablete);
- alergije ali seneni nahod (nekateri antihistaminiki);
- večja operacija (anestetiki);
- huda bolečina (narkotični analgetiki, npr. dekstropoksifen);
- terapija proti odvisnosti od drog (nadomestno zdravljenje);
- težave, kot sta anksioznost ali depresija, vključno z nekaterimi antidepresivi, ki vsebujejo fluoksetin, fluvoksamin, nefazodon ali imipramin;
- srčno popuščanje (digoksin);

- okužbe (antibiotiki, ki vsebujejo eritromicin, klaritromicin ali telitromicin);
- glivične okužbe (itrakonazol, flukonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol);
- zdravila za zdravljenje angine pectoris in visokega krvnega tlaka, kot je diltiazem;
- HIV in AIDS (imenovani zaviralci proteaze HIV, kot je ritonavir);
- zgaga in razjeda na želodcu, kot sta cimetidin ali omeprazol;
- astma in bronhitis, kot je teofilin;
- epilepsija, kot je karbamazepin;
- zdravila za sproščanje mišic. Pri sočasni uporabi z alprazolamom lahko pride do povečanja mišično-relaksacijskega učinka in tveganja za padce.

Sočasna uporaba zdravila Alprazolam Grindeks in opioidov (močnih protibolečinskih zdravil, zdravil za nadomestno zdravljenje in nekaterih zdravil proti kašlju) poveča tveganje za dremavost, težave z dihanjem (depresija dihanja), komo in je lahko smrtno nevarna. Zaradi tega je treba o sočasni uporabi razmisliti le, če druge možnosti zdravljenja niso mogoče.

Če pa vam zdravnik vseeno predpiše zdravilo Alprazolam Grindeks skupaj z opioidi, mora odmerek in trajanje sočasnega zdravljenja omejiti.

Zdravnika obvestite o vseh opioidnih zdravilih, ki jih jemljete, in natančno upoštevajte zdravnikova priporočila glede odmerjanja. Koristno bi bilo obvestiti prijatelje ali sorodnike, da so pozorni na zgoraj navedene znake in simptome. Ob pojavu takšnih simptomov se posvetujte z zdravnikom.

Na učinek zdravljenja z alprazolamom lahko vpliva tudi sočasno zdravljenje s katerim koli od naslednjih zdravil: kontracepcijske tablete, rifampicin (pri okužbah) ali šentjanževka (zdravilo rastlinskega izvora).

Zdravilo Alprazolam Grindeks skupaj z alkoholom

Med zdravljenjem z zdravilom Alprazolam Grindeks se morate izogibati uživanju alkohola, saj lahko alkohol na nepredvidljive načine spremeni in okrepi učinek zdravila Alprazolam Grindeks.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Če ste noseči ali nameravate zanositi, morate o tem takoj obvestiti zdravnika. Opazovanja pri ljudeh so pokazala, da je alprazolam lahko škodljiv za plod (povečano tveganje za malformacijo (razcepljeno nebo)). Med nosečnostjo se lahko alprazolam uporablja le, če zdravnik presodi, da so koristi zdravljenja večje od tveganja za nerojenega otroka in da je zdravilo primerno za vas. Če zdravilo Alprazolam Grindeks uporabljate do poroda, o tem obvestite zdravnika, saj se lahko pri vašem novorojenčku po porodu pojavijo odtegnitveni simptomi.

Dojenje

Zdravila Alprazolam Grindeks ne smete jemati, če dojite. Alprazolam prehaja v materino mleko. Če se je zdravnik odločil, da morate prejemati to zdravilo, boste morali prenehati z dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Tudi če se uporablja po navodilih, lahko zdravilo Alprazolam Grindeks spremeni reakcijske sposobnosti do te mere, da se zmanjša sposobnost upravljanja vozil in strojev. To tveganje je še posebej visoko na začetku zdravljenja, ob vsakem povečanju odmerka, če ne spite dovolj ali če poleg tega uživate alkohol ali jemljete druge snovi, ki delujejo na osrednji živčni sistem. Zato se morate vsaj v prvih dneh zdravljenja popolnoma vzdržati vožnje, upravljanja strojev ali drugih nevarnih dejavnosti. Odločitev v vsakem posameznem primeru sprejme lečeči zdravnik.

Zdravilo Alprazolam Grindeks vsebuje laktozo, natrij in natrijev benzoat (E 211)

Laktoza: Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

Natrij: To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar v bistvu pomeni »brez natrija«.

Natrijev benzoat: To zdravilo vsebuje 0,12 mg natrijevega benzoata v eni tableti.

3. Kako jemati zdravilo Alprazolam Grindeks

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če zdravnik ne predpiše drugače, veljajo naslednje smernice za odmerjanje

Začetni odmerek: običajno je odmerek na začetku zdravljenja 0,25 mg do 0,5 mg alprazolama trikrat na dan.

Vzdrževalni odmerek: če je klinično potrebno, vam lahko zdravnik poveča odmerek na 3 mg do 4 mg v majhnih korakih, razdeljen na več posameznih odmerkov.

Starejši in občutljivi bolniki ali oslabei bolniki

Če ste starejši in občutljiv bolnik in potrebujete manjši odmerek, boste običajno začeli z odmerkom 0,25 mg dvakrat do trikrat na dan. Ta odmerek se lahko počasi poveča, če je potrebno in če ne opazite neželenih učinkov.

Bolniki s težavami ledvic ali jeter

Če imate težave z ledvicami ali jetri, vam bo zdravnik prilagodil odmerek.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Otroci in mladostniki, mlajši od 18 let, ne smejo jemati zdravila Alprazolam Grindeks.

Način uporabe

Zdravilo Alprazolam Grindeks je za peroralno uporabo. Tablete zaužijte z nekaj tekočine (npr. s pol kozarca vode).

Tablete imajo razdelilno zarezo in jih je mogoče deliti na enaka odmerka.

Trajanje zdravljenja

Tveganje za odvisnost in zlorabo se lahko poveča z odmerkom in trajanjem zdravljenja. Zdravnik vam bo zato predpisal najnižji možni učinkovit odmerek in trajanje zdravljenja ter pogosto ponovno ocenil potrebo po nadaljevanju zdravljenja.

Najdaljše trajanje zdravljenja ne sme biti daljše od 2-4 tednov. Dolgotrajno zdravljenje ni priporočljivo. Če se zdravilo uporablja več kot nekaj tednov, se lahko pojavi zmanjšan učinek zdravila.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Alprazolam Grindeks, kot bi smeli

Če ste vzeli preveč zdravila Alprazolam Grindeks, se nemudoma posvetujte z zdravnikom ali lokalno bolnišnico.

Znaki (blagega) prevelikega odmerjanja so lahko dremavost, občutek lahkotnosti, motnje vida, nejasen govor, padec krvnega tlaka, nestabilna hoja/gibi in mišična oslabelost. V primeru hude zastrupitve lahko pride do globokega spanca in celo nezvesti, motenj dihanja in srčno-žilnega kolapsa. Nujno je spremljanje na intenzivnem oddelku.

Stopnjo zastrupitve mora oceniti zdravnik, ki bo odločil o ukrepih za zdravljenje.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Alprazolam Grindeks

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Če ste pozabili vzeti odmerek, izpuščen odmerek preskočite in nadaljujte z jemanjem zdravila Alprazolam Grindeks, kot vam je predpisal zdravnik.

Če ste prenehali jemati zdravilo Alprazolam Grindeks

Preden prenehate jemati zdravilo Alprazolam Grindeks, se vedno posvetujte z zdravnikom, saj je treba odmerek postopoma zmanjševati. Če prenehate jemati tablete ali nenadoma zmanjšate odmerek, lahko

pride do »povratnih« učinkov, zaradi katerih lahko postanete začasno bolj tesnobni ali nemirni ali imate težave s spanjem. Nekateri ljudje lahko občutijo tudi »odtegnitvene« učinke (glejte poglavje 4 »Odvisnost in odtegnitveni simptomi«). Ti simptomi bodo izginili, ko se bo vaše telo ponovno prilagodilo. Če ste zaskrbljeni, vam lahko zdravnik pove več o tem. Zdravnik bo zato po končanem zdravljenju odmerek postopoma zmanjševal. Zmanjševanje odmerka poteka glede na individualne potrebe, saj je postopno prenehanje zdravljenja odvisno od več dejavnikov (npr. od trajanja zdravljenja in vašega dnevnega odmerka). O načinu postopnega zmanjševanja odmerka se posvetujte z zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Razlogi za takojšen obisk zdravnika

Če opazite katerega od naslednjih simptomov, nemudoma obiščite zdravnika, saj bo treba zdravljenje prekiniti. Zdravnik vam bo nato svetoval, kako boste zdravljenje prekinili.

- Zdravljenje z alprazolamom lahko povzroči resne vedenjske ali psihiatrične učinke - na primer vznemirjenost, nemir, agresivnost, razdražljivost, hudo jezo, lažna prepričanja, nočne more in halucinacije ali drugo neprimerno vedenje.
- Nenadno sopenje, težave pri požiranju ali dihanju, otekanje vek, obraza ali ustnic, izpuščaj ali srbenje (predvsem po vsem telesu).

Razlogi za čimprejšnji obisk zdravnika

Čim prej obvestite zdravnika, če opazite naslednje simptome, saj bo morda treba spremeniti vaš odmerek ali zdravljenje:

- izguba spomina (amnezija),
- porumenelost kože in beločnic (zlatenica).

Odvisnost in odtegnitveni simptomi

Med jemanjem zdravil, kot je alprazolam, se lahko razvije odvisnost, kar poveča verjetnost pojava odtegnitvenih simptomov ob prekinitvi zdravljenja. Odtegnitveni simptomi so pogostejši, če:

- zdravljenje prekinete nenadoma,
- ste jemali visoke odmerke,
- ste to zdravilo jemali dlje časa,
- ste v preteklosti zlorabljali alkohol ali droge.

To lahko povzroči učinke, kot so glavobol, bolečine v mišicah, huda tesnoba, napetost, nemir, zmedenost, spremembe razpoloženja, nespečnost in razdražljivost.

V hudih primerih odtegnitve se lahko pojavijo tudi naslednji simptomi: navzea (občutek slabosti), bruhanje, potenje, želodčni krči, mišični krči, občutek neresničnosti ali odtujenosti, preobčutljivost na zvok, svetlobo ali dotik, otrplost in ščemenje v stopalih in dlaneh, halucinacije (ko v budnem stanju vidite ali slišite stvari, ki jih ni), tresenje ali epileptični krči. Povejte zdravniku, če se kateri izmed odtegnitvenih simptomov poslabša ali ne izgine.

Drugi neželeni učinki, ki se lahko pojavijo, so:

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov

- depresija,
- zaspanost in dremavost,
- sunkoviti, neusklajeni gibi,
- nezmožnost zapomniti si delčke informacij,
- nejasen govor,
- omotica, občutek lahkotnosti,

- glavoboli,
- zaprtje,
- suha usta,
- utrujenost,
- razdražljivost.

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov

- izguba apetita,
- zmedenost in dezorientiranost,
- spremembe v želji po spolnosti (moški in ženske),
- živčnost ali občutek tesnobe ali vznemirjenosti,
- nespečnost (nezmožnost spanja ali motnje spanja),
- težave z ravnotežjem in nestabilnost (občutek, podoben vinjenosti), zlasti podnevi,
- pomanjkanje pozornosti ali koncentracije,
- nezmožnost ostati buden, občutek lenobnosti,
- tresenje ali drgetanje,
- dvojni ali zamegljen vid,
- občutek slabosti,
- kožne reakcije,
- spremembe telesne mase.

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

- občutek vznemirjenosti ali pretiranega navdušenja, ki povzroča nenavadno vedenje,
- halucinacije (videnje ali slišanje stvari, ki jih ni),
- razburjenost ali jeza,
- bruhanje,
- mišična krči ali šibkost,
- inkontinenca,
- krčevite bolečine v spodnjem delu hrbta in stegnih, ki lahko kažejo na motnjo v menstrualnem ciklusu,
- zasvojenost z zdravilom,
- odtegnitveni simptomi.

Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

- neredna menstruacija ali nastajanje prevelike količina prolaktina (hormona, ki spodbuja nastajanje mleka) pri ženskah,
- sovražnost ali agresija,
- nenormalne misli,
- zvijanje udov ali sunkoviti gibi,
- hiperaktivnost,
- razdražen želodec,
- težave z delovanjem jeter (to pokažejo krvni testi), vnetje jeter (hepatitis)
- motnje delovanja živčevja. Simptomi lahko vključujejo: hitro bitje srca in nestabilen krvni tlak (občutek vrtoглаvice, lahkotnosti ali omedlevice)
- huda alergijska reakcija z otekanjem obraza ali grla,
- otekanje gležnjev, stopal ali prstov na roki,
- kožna reakcija, ki je posledica občutljivosti na sončno svetlobo,
- težave z uriniranjem ali zadrževanjem urina,
- zvišan očesni tlak, ki lahko vpliva na vid,
- zloraba zdravila.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Alprazolam Grindeks

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Alprazolam Grindeks

- Učinkovina je alprazolam.
- Alprazolam Grindeks 0,25 mg tablete
Ena tableta vsebuje 0,25 mg alprazolama.
- Alprazolam Grindeks 0,5 mg tablete
Ena tableta vsebuje 0,5 mg alprazolama.
- Alprazolam Grindeks 1 mg tablete
Ena tableta vsebuje 1 mg alprazolama.
- Druge sestavine zdravila so: laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza (E 460), predgelirani koruzni škrob, natrijev dokusat, natrijev benzoat (E 211), magnezijev stearat (E 572), brezvodni koloidni silicijev dioksid (E 551), rdeči železov oksid (E 172) (*samo 0,5 mg tablete*), indigotin (E 132) (*samo 1 mg tablete*).

Izgled zdravila Alprazolam Grindeks in vsebina pakiranja

Zdravilo Alprazolam Grindeks 0,25 mg tablete je bela ali skoraj bela ovalna (10 mm x 5 mm) tableta z razdelilno zarezo na eni strani in vtisnjeno oznako »0,25« na drugi strani.

Zdravilo Alprazolam Grindeks 0,5 mg tablete je svetlo rožnata do rožnata ovalna (10 mm x 5 mm) tableta z razdelilno zarezo na eni strani in vtisnjeno oznako »0,5« na drugi strani.

Zdravilo Alprazolam Grindeks 1 mg tablete je svetlo modra do modra ovalna (10 mm x 5 mm) tableta z razdelilno zarezo na eni strani in vtisnjeno oznako »1« na drugi strani.

Zdravilo Alprazolam Grindeks je na voljo v OPA/Alu/PVC//Alu pretisnih omotih, ki vsebujejo 10, 20, 30, 50, 60 ali 100 tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Alprazolam Grindeks

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

AS GRINDEKS
Krustpils iela 53,
Rīga, LV-1057,
Latvija

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Nemčija	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Avstrija	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Belgija	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimés
Bolgarija	Алпразолам Гриндекс 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg таблетки
	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablets
Hrvaška	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Češka	Alprazolam Grindeks
Danska	Alprazolam Grindeks
Estonija	Ixhalanex
Finska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletit
Francija	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,25 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,5 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 1 mg comprimé sécable
Grčija	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg δισκία
Madžarska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tableta
Irska	Alprazolam Grindeks 250 microgram, 500 microgram, 1 mg tablets
Italija	Alprazolam Grindeks
Latvija	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletēs
Litva	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletės
Luksemburg	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Pöllen
Nizozemska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletten
Poljska	Alprazolam Grindeks
Portugalska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Romunija	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimate
Slovaška	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablety
Slovenija	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Španija	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Švedska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletter

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 22. 5. 2024.