

## Navodilo za uporabo

**Everolimus Teva 2,5 mg tablete**

**Everolimus Teva 5 mg tablete**

**Everolimus Teva 7,5 mg tablete**

**Everolimus Teva 10 mg tablete**

everolimus

**Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

### Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Everolimus Teva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Everolimus Teva
3. Kako jemati zdravilo Everolimus Teva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Everolimus Teva
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

### 1. Kaj je zdravilo Everolimus Teva in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Everolimus Teva je zdravilo proti raku, ki vsebuje zdravilno učinkovino everolimus. Everolimus zmanjša oskrbo tumorja s krvjo in upočasni rast ter širjenje rakastih celic.

Zdravilo Everolimus Teva uporabljamo za zdravljenje odraslih bolnikov z:

- napredovalimi tumorji, ki se imenujejo nevroendokrini tumorji in izvirajo iz želodca, črevesja, pljuč ali trebušne slinavke. Bolniki prejmejo zdravilo Everolimus Teva v primeru, da tumorja ni mogoče operirati in ne sprošča prekomernih količin specifičnih hormonov ali drugih podobnih naravnih snovi.

### 2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Everolimus Teva

Zdravilo Everolimus Teva vam lahko predpiše samo zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem bolnikov z rakom.

Skrbno se držite njegovih navodil. Lahko se razlikujejo od splošnih informacij v tem navodilu za uporabo. Če imate vprašanja o zdravilu Everolimus Teva ali vas zanima, zakaj so vam ga predpisali, se obrnite na svojega zdravnika.

#### NE jemljite zdravila Everolimus Teva:

- če ste **alergični** na everolimus, na spojine, ki so sorodne everolimusu, na primer na sirolimus ali temsirolimus, ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Če mislite, da bi bili lahko alergični, se posvetujte z zdravnikom.

## Opozorila in previdnostni ukrepi

### Pred začetkom jemanja zdravila Everolimus Teva se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate težave z jetri ali ste kdaj prej imeli kakršno koli bolezen, ki bi lahko prizadela jetra. V tem primeru vam bo moral zdravnik morda predpisati drugačen odmerek zdravila Everolimus Teva.
- če imate sladkorno bolezen (visoko raven sladkorja v krvi). Zdravilo Everolimus Teva lahko zviša raven sladkorja v krvi in povzroči poslabšanje sladkorne bolezni. Morda boste zato potrebovali insulin in/ali peroralna antidiabetična zdravila. Zdravniku povejte, če ste prekomerno žejni ali urinirate pogosteje kot prej.
- če morate biti med zdravljenjem z zdravilom Everolimus Teva cepljeni.
- če imate visoko raven holesterola. Zdravilo Everolimus Teva lahko zviša raven holesterola in/ali drugih maščob v krvi.
- če ste imeli nedavno večjo operacijo ali imate še vedno nezaceljeno rano po operaciji. Zdravilo Everolimus Teva lahko poveča tveganje za težave pri celjenju rane.
- če imate okužbo. Verjetno bo treba okužbo pozdraviti, preden začnete jemati zdravilo Everolimus Teva.
- če ste imeli kdaj prej hepatitis B, ker se med zdravljenjem z zdravilom Everolimus Teva virus lahko reaktivira (glejte poglavje 4 “Možni neželeni učinki”).

Zdravilo Everolimus Teva lahko tudi:

- oslabi imunski sistem, zato se lahko med jemanjem zdravila Everolimus Teva poveča tveganje, da se okužite.
- vpliva na delovanje ledvic, zato bo zdravnik v času, ko jemljete zdravilo Everolimus Teva, spremljal delovanje vaših ledvic.
- povzroča zadihanost, kašelj in zvišano telesno temperaturo.

Če pride do teh simptomov, **povejte zdravniku.**

Med zdravljenjem boste redno opravljali preiskave krvi za preverjanje števila krvnih celic (belih in rdečih krvnih celic ter trombocitov) v telesu, da bi lahko opazili, če bi imelo zdravilo Everolimus Teva neželene učinke na te celice. Krvne preiskave boste opravljali tudi za preverjanje delovanja ledvic (raven kreatinina), delovanja jeter (ravni aminotransferaz) in ravni sladkorja ter holesterola v krvi. To je potrebno zato, ker zdravilo Everolimus Teva lahko vpliva tudi nanje.

### Otroci in mladostniki

Zdravilo Everolimus Teva NI namenjeno uporabi pri otrocih in mladostnikih (starih manj kot 18 let).

### Druga zdravila in zdravilo Everolimus Teva

Zdravilo Everolimus Teva lahko vpliva na delovanje nekaterih drugih zdravil. Če jemljete druga zdravila sočasno z zdravilom Everolimus Teva, vam bo moral zdravnik morda spremeniti odmerke zdravila Everolimus Teva ali drugih zdravil.

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Naslednja zdravila lahko povečajo tveganje za neželene učinke ob uporabi zdravila Everolimus Teva:

- ketokonazol, itrakonazol, vorikonazola ali flukonazol in druga protiglivična zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje glivičnih okužb,
- klaritromicin, telitromicin ali eritromicin, antibiotiki za zdravljenje bakterijskih okužb,
- ritonavir in druga zdravila za zdravljenje okužbe s HIV/AIDSa,
- verapamil ali diltiazem za zdravljenje bolezni srca ali visokega krvnega tlaka,
- dronedaron, zdravilo, ki pomaga uravnati srčni utrip,
- ciklosporin, zdravilo za preprečevanje zavrnitve presadka
- imatinib za zaviranje razmnoževanja nenormalnih celic

- zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE, na primer ramipril), ki jih uporabljamo za zdravljenje visokega krvnega tlaka ali drugih srčnožilnih obolenj.

Naslednja zdravila lahko zmanjšajo učinkovitost zdravila Everolimus Teva:

- rifampicin za zdravljenje tuberkuloze (TBC),
- efavirenz ali nevirapin za zdravljenje okužbe s HIV/AIDSa,
- šentjanževka (*Hypericum perforatum*), zelišče za zdravljenje depresije in drugih bolezni,
- deksametazon, kortikosteroidno zdravilo za zdravljenje različnih bolezni, med drugim vnetnih oziroma imunskih težav,
- fenitoin, karbamazepin ali fenobarbital in drugi antiepileptiki, ki preprečujejo epileptične napade oziroma krče.

Tem zdravilom se morate izogibati med jemanjem zdravila Everolimus Teva. Če jemljete katero od njih, vam bo zdravnik morda zdravilo zamenjal za drugo ali pa vam bo spremenil odmerek zdravila Everolimus Teva.

### **Zdravilo Everolimus Teva skupaj s hrano in pijačo**

Zdravilo Everolimus Teva morate jemati vsak dan ob istem času, vedno s hrano ali vedno brez nje. V času zdravljenja z zdravilom Everolimus Teva ne uživajte grenivk ali soka grenivk, kar lahko tako povečate tveganje za nastanek neželenih učinkov.

### **Nosečnost, dojenje in plodnost**

#### *Nosečnost*

Zdravilo Everolimus Teva lahko škoduje nerojenemu otroku in med nosečnostjo NI priporočljivo. Zdravniku povejte, če ste noseči ali mislite, da bi lahko bili noseči. Zdravnik se bo pogovoril z vami, ali bi morali med nosečnostjo jemati to zdravilo.

Ženske, ki bi lahko zanosile, morajo med zdravljenjem uporabljati zelo učinkovito kontracepcijo. Če kljub zaščiti pred nosečnostjo mislite, da ste zanosili, se posvetujte z zdravnikom **preden** nadaljujete z jemanjem zdravila Everolimus Teva.

#### *Dojenje*

Zdravilo Everolimus Teva lahko škoduje dojenemu otroku. Med zdravljenjem NE smete dojiti. Zdravniku povejte, če dojite.

#### *Plodnost pri ženskah*

Pri nekaterih bolnicah, ki so prejemale zdravilo Everolimus Teva, so opazali odsotnost menstrualnih krvavitev (amenoreja).

Zdravilo Everolimus Teva lahko vpliva na plodnost pri ženskah. Če načrtujete otroka, se posvetujte z zdravnikom.

#### *Plodnost pri moških*

Zdravilo Everolimus Teva lahko vpliva na plodnost pri moških. Če načrtujete otroka, se posvetujte z zdravnikom.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Če ste neobičajno utrujeni (utrujenost je zelo pogost neželeni učinek), bodite pri vožnji in upravljanju s stroji posebno pozorni.

### **Zdravilo Everolimus Teva vsebuje laktozo**

Zdravilo Everolimus Teva vsebuje laktozo (mlečni sladkor). Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

### 3. Kako jemati zdravilo Everolimus Teva

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek je 10 mg in ga vzamete enkrat na dan. Zdravnik vam bo povedal, koliko tablet zdravila Everolimus Teva morate vzeti.

Če imate težave z jetri, vam bo zdravnik morda predpisal manjši začetni odmerek zdravila Everolimus Teva (2,5 mg, 5 mg ali 7,5 mg na dan).

Če pride do določenih neželenih učinkov v času jemanja zdravila Everolimus Teva (glejte poglavje 4), vam bo zdravnik morda zmanjšal odmerek ali prekinil zdravljenje z zdravilom Everolimus Teva bodisi za krajši čas ali pa dokončno.

Zdravilo Everolimus Teva jemljite enkrat na dan, vsak dan ob približno istem času, vedno s hrano ali vedno brez nje.

Tableto(e) pogoltnite celo(e) s kozarcem vode. Tablet NE žvečite in ne drobite.

#### Če ste vzeli večji odmerek zdravila Everolimus Teva, kot bi smeli

- Če ste vzeli preveč zdravila Everolimus Teva ali je nekdo drug pomotoma vzel vaše tablete, pojdite **takoj** k vašemu zdravniku ali v bolnišnico. Morda bo potrebno urgentno zdravljenje.
- S seboj vzemite škatlico vaših tablet in to navodilo za uporabo, da bo zdravnik vedel, kaj ste zaužili.

#### Če ste pozabili vzeti zdravilo Everolimus Teva

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. NE vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnje tablete.

#### Če ste prenehali jemati zdravilo Everolimus Teva

NE prekinite jemanja zdravila Everolimus Teva, če vam tega ni naročil zdravnik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

### 4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od naslednjih znakov alergijske reakcije, **PRENEHAJTE jemati zdravilo Everolimus Teva in takoj poiščite zdravniško pomoč**:

- oteženo dihanje ali požiranje,
- otekanje obraza, ustnic, jezika ali grla,
- hudo srbenje kože z rdečim izpuščajem ali s spremembami nad nivojem kože.

**Resni neželeni učinki zdravila Everolimus Teva so lahko:**

**Zelo pogosti** (*lahko se pojavijo pri več kot 1 od 10 bolnikov*)

- zvišana telesna temperatura, mraženje (znaki okužbe)
- zvišana telesna temperatura, kašelj, oteženo dihanje, piskajoče dihanje (znaki vnetja pljuč, ki ga imenujemo tudi pljučnica)

**Pogosti** (*lahko se pojavijo pri največ 1 od 10 bolnikov*)

- huda žeja, povečano izločanje urina, povečan apetit s hujšanjem, utrujenost (znaki sladkorne bolezni)
- krvavitev, na primer v črevesni steni
- zelo zmanjšano izločanje urina (znak ledvične odpovedi)

**Občasni** (*lahko se pojavijo pri največ 1 od 100 bolnikov*)

- zvišana telesna temperatura, kožni izpuščaj, bolečine in vnetje v sklepih skupaj z utrujenostjo, izgubo apetita, slabostjo, zlatenico (porumenelostjo kože), bolečino v zgornjem desnem delu trebuha, blatom svetle barve in temnim urinom (to so lahko znaki reaktivacije hepatitisa B)
- zadihanost, oteženo dihanje v ležečem položaju, otekanje stopal ali nog (znaki srčnega popuščanja)
- otekanje in/ali bolečina ene noge, običajno v mečih, rdeča ali topla koža nad prizadetim predelom (znaki zapore krvne žile (vene) v nogi zaradi krvnega strdka)
- nenadno pomanjkanje sape, bolečina v prsnem košu ali izkašljevanje krvi (možni znaki pljučne embolije, to je stanja, do katerega pride, če se zamaši ena ali več arterij v pljučih)
- zelo zmanjšano izločanje urina, otekanje nog, občutek zmedenosti, bolečine v hrbtu (znaki nenadne odpovedi ledvic)
- izpuščaj, srbenje, koprivnica, oteženo dihanje ali požiranje, omotičnost (znaki resne alergijske reakcije, ki jo imenujemo tudi preobčutljivost)

**Redki** (*lahko se pojavijo pri največ 1 od 1.000 bolnikov*)

- zadihanost ali hitro dihanje (znaki sindroma akutne dihalne stiske)

**Če pride do katerega od zgoraj navedenih neželenih učinkov, takoj obvestite zdravnika, saj so posledice lahko življenjsko nevarne.**

**Drugi možni neželeni učinki zdravila Everolimus Teva so:**

**Zelo pogosti** (*lahko se pojavijo pri več kot 1 od 10 bolnikov*)

- visoka raven sladkorja v krvi (hiperglikemija)
- izguba apetita
- motnje okušanja (disgevzija)
- glavobol
- krvavitve iz nosu (epistaksa)
- kašelj
- razjede ustne sluznice
- bolečine v želodcu skupaj s slabostjo (navzeo) ali drisko
- kožni izpuščaj
- srbenje (pruritus)
- občutek šibkosti ali utrujenosti
- utrujenost, zadihanost, omotičnost, bledica, znaki zmanjšane števila eritrocitov (anemija)
- otekanje rok, dlani, stopal, gležnjev ali drugih delov telesa (znaki edema)
- hujšanje
- visoka raven lipidov (maščob) v krvi (hiperholesterolemija)

**Pogosti** (*lahko se pojavijo pri največ 1 od 10 bolnikov*)

- spontane krvavitve ali pojavljanje modric (znaki zmanjšane števila trombocitov, kar imenujemo tudi trombocitopenija)
- zadihanost (dispneja)
- žeja, zmanjšano izločanje urina, temen urin, suha pordela koža, razdražljivost (znaki dehidracije)
- težave s spanjem (nespečnost)
- glavobol, omotičnost (znaki zvišanega krvnega tlaka, kar imenujemo tudi hipertenzija)
- zvišana telesna temperatura, vnetje grla, razjede ustne sluznice zaradi okužbe (znaki znižanega števila belih krvnih celic, levkopenija, limfopenija in/ali nevtropenija)
- zvišana telesna temperatura

- vnetje ustne, želodčne ali črevesne sluznice
- suha usta
- zgaga (dispepsija)
- bruhanje
- oteženo požiranje (disfagija)
- bolečine v trebuhu
- mozoljavost
- izpuščaj in bolečine po dlaneh in podplatih (sindrom dlani in stopal)
- pordela koža (eritem)
- bolečine v sklepih
- bolečine v ustih
- motnje menstrualnega ciklusa kot so neredne krvavitve
- zvišana raven lipidov (maščob) v krvi (hiperlipidemija, zvišana raven trigliceridov)
- znižana raven kalija v krvi (hipokaliemija)
- znižana raven fosfatov v krvi (hipofosfatemija)
- znižana raven kalcija v krvi (hipokalcemija)
- suha koža, luščenje kože, kožne spremembe
- bolezni nohtov, lomljivost nohtov
- rahlo izpadanje las
- nenormalni izvidi jetrnih krvnih testov (zvišana vrednost alanin-aminotransferaze in aspartat aminotransferaze)
- nenormalni izvidi krvnih preiskav delovanja ledvic (zvišana vrednost kreatinina)
- izcedek iz očesa s srbenjem, rdečino in oteklino
- beljakovine v urinu

**Občasni** (lahko se pojavijo pri največ 1 od 100 bolnikov)

- šibkost, spontane krvavitve in pojavljanje modric ter pogoste okužbe z znaki kot so zvišana telesna temperatura, mraženje, vnetje grla, razjede ustne sluznice (znaki zmanjšane števila krvnih celic, kar imenujemo tudi pancitopenija)
- izguba zmožnosti okušanja (agevzija)
- izkašljevanje krvi (hemoptiza)
- motnje menstrualnega ciklusa kot je izostanek menstruacije (amenoreja)
- pogostejše odvajanje urina čez dan
- bolečine v prsnem košu
- slabo celjenje ran
- vročinski oblivi
- rožnato ali rdeče obarvano oko (konjunktivitis)

**Redki** (lahko se pojavijo pri največ 1 od 1.000 bolnikov)

- utrujenost, zadihanost, omotičnost, bledica (znaki zmanjšane števila rdečih krvnih celic, lahko zaradi vrste anemije, ki jo imenujemo izolirana eritrocitna aplazija)
- otekanje obraza, predela okrog oči, ust in v ustih in/ali grlu z otekanjem jezika in oteženim dihanjem ali požiranjem (to imenujemo tudi angioedem), kar so lahko znaki alergijske reakcije.

**Če navedeni neželeni učinki postanejo močnejše izraženi, obvestite zdravnika in/ali farmacevta. Večina neželenih učinkov je blago do zmerno izraženih in večinoma izzvenijo, če za nekaj dni prekinete zdravljenje.**

**Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke  
 Sektor za farmakovigilanco  
 Nacionalni center za farmakovigilanco  
 Slovenčeva ulica 22  
 SI-1000 Ljubljana  
 Tel: +386 (0)8 2000 500  
 Faks: +386 (0)8 2000 510  
 e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si  
 spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

## 5. Shranjevanje zdravila Everolimus Teva

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. Za shranjevanje zdravila niso potrebni posebni pogoji shranjevanja.

Pretisni omot odprite šele tik pred uporabo tablet. Ne uporabljajte tega zdravila, če opazite, da je pakiranje poškodovano ali da je bilo že odprto.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

### Kaj vsebuje zdravilo Everolimus Teva

- Zdravilna učinkovina je everolimus.  
 Ena tableta Everolimus Teva 2,5 mg vsebuje 2,5 mg everolimusa.  
 Ena tableta Everolimus Teva 5 mg vsebuje 5 mg everolimusa.  
 Ena tableta Everolimus Teva 7,5 mg vsebuje 7,5 mg everolimusa.  
 Ena tableta Everolimus Teva 10 mg vsebuje 10 mg everolimusa.
- Druge sestavine zdravila so butilhidroksitoluen (E321), hipromeloza, laktoza monohidrat, brezvodna laktoza, krospovidon in magnezijev stearat.

### Izgled zdravila Everolimus Teva in vsebina pakiranja

Everolimus Teva 2,5 mg tablete so bele barve, podolgovate, ploščate z zaobljenim robom, dolge približno 10 mm, široke 4 mm, z oznako »EV« na eni strani in »2,5« na drugi strani tablete.

Everolimus Teva 5 mg tablete so bele barve, podolgovate, ploščate z zaobljenim robom, dolge približno 12 mm, široke 5 mm, z oznako »EV« na eni strani in »5« na drugi strani tablete.

Everolimus Teva 7,5 mg tablete so bele barve, podolgovate, ploščate z zaobljenim robom, dolge približno 14 mm, široke 5,5 mm, z oznako »EV« na eni strani in »7,5« na drugi strani tablete.

Everolimus Teva 10 mg tablete so bele barve, podolgovate, ploščate z zaobljenim robom, dolge približno 15 mm, široke 6 mm, z oznako »EV« na eni strani in »10« na drugi strani tablete.

Zdravilo Everolimus Teva je na voljo v pretisnih omotih, ki vsebujejo 10, 30, 30x1, 50x1, 60 ali 90 tablet.

Na trgu morda ni vseh pakiranj.

### **Način in režim predpisovanja in izdaja zdravila**

Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.

### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec**

*Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom*

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031GA Haarlem  
Nizozemska

*Izdelovalci*

TEVA Gyógyszergyár Zrt.  
Pallagi út 13  
4042 Debrecen  
Madžarska

TEVA UK Ltd  
Brampton Road, Hampden Park  
BN22 9AG Eastbourne  
Velika Britanija

Teva Operations Poland Sp. z o.o.  
ul. Mogilska 80.  
31-546 Kraków  
Poljska

Merckle GmbH  
Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren  
89143 Baden-Wuerttemberg  
Nemčija

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)  
Prilaz baruna Filipovića 25  
10000 Zagreb  
Hrvaška

### **Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:>**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Avstrija:  | Everolimus ratiopharm 2,5 mg / 5 mg / 7,5 mg / 10 mg Tabletten |
| Belgija:   | Everolimus Teva 2,5 mg / 5 mg / 7,5 mg / 10 mg tabletten       |
| Bolgarija: | Еверолимус Тева 10mg таблетки                                  |
| Ciper:     | Everolimus Teva 2,5 / 5 / 7,5 / 10 mg δισκία                   |
| Češka:     | Everolimus Teva                                                |
| Danska:    | Everolimus Teva                                                |
| Estonija:  | Everolimus Teva                                                |
| Finska:    | Everolimus ratiopharm 2,5 / 5 / 10 mg tabletti                 |
| Francija:  | Everolimus Teva 2.5 / 5 / 10 mg comprimé                       |
| Grčija:    | Everolimus Teva 2,5 / 5 / 7,5 / 10 mg δισκία                   |
| Hrvaška:   | Everolimus Pliva 2,5 / 5 / 7,5 / 10 mg tablete                 |

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Irska:            | Everolimus Teva 2.5 mg, 5 mg & 10 mg Tablets                   |
| Italija:          | Everolimus Teva                                                |
| Latvija:          | Everolimus Teva 10 mg tabletes                                 |
| Madžarska:        | Everolimus Teva 5 / 10 mg tabletta                             |
| Nemčija:          | Everolimus-ratiopharm 2,5 mg / 5 mg / 7,5 mg / 10 mg Tabletten |
| Nizozemska:       | Everolimus Teva 2,5 / 5 / 10 mg, tabletten                     |
| Norveška:         | Everolimus Teva                                                |
| Poljska:          | Everolimus Teva                                                |
| Portugalska:      | Everolimus Teva                                                |
| Slovaška:         | Everolimus Teva 5 / 7,5 / 10 mg                                |
| Slovenija:        | Everolimus Teva 2,5 mg / 5 mg / 7,5 mg / 10 mg tablete         |
| Španija:          | Everolimus Teva 2,5 / 5 / 10 mg comprimidos EFG                |
| Švedska:          | Everolimus Teva                                                |
| Velika Britanija: | Everolimus Teva 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg Tablets            |

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 3.5.2017.**