

Navodilo za uporabo

Maprazax 0,25 mg tablete

Maprazax 0,5 mg tablete

Maprazax 1 mg tablete

alprazolam

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Maprazax in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Maprazax
3. Kako jemati zdravilo Maprazax
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Maprazax
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Maprazax in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Maprazax vsebuje učinkovino alprazolam. Spada v skupino zdravil, imenovanih benzodiazepini (zdravila za lajšanje tesnobe).

Zdravilo Maprazax se pri odraslih uporablja za zdravljenje simptomov tesnobe, ki so hudi, onespobljajoči ali povzročajo bolnikom hudo stisko. To zdravilo je namenjeno samo za kratkotrajno uporabo.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Maprazax

Ne jemljite zdravila Maprazax:

- če ste alergični na alprazolam ali druge benzodiazepine ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če imate bolezen, imenovano »miastenija gravis« (huda šibkost mišic),
- če imate hude težave z dihanjem ali pljuči (npr. kronični bronhitis ali emfizem),
- če imate »apnejo v spanju« (začasne prekinitve dihanja med spanjem),
- če imate hude težave z jetri,
- v primeru akutne zastrupitve z alkoholom ali drugimi zdravili, ki vplivajo na osrednji živčni sistem.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Maprazax se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

Bodite previdni pri uporabi zdravila Maprazax:

- če imate bolezen ledvic, jeter ali pljuč,
- če se slabo počutite,
- če imate ali ste kdaj imeli duševno motnjo, ki jo je bilo treba zdraviti bolnišnično,
- če jemljete druga zdravila za zdravljenje duševnih motenj,

- če uživate alkohol, zlorablajte zdravila ali jemljete narkotike (nemudoma se posvetujte z zdravnikom za pomoč pri odtegnitvi),
- če ste kdaj pomislili, da bi si vzeli življenje (nemudoma se posvetujte z zdravnikom za pomoč in ustrezno zdravljenje),
- če ste že jemali zdravila za pomiritev ali zdravljenje hude tesnobe, ker se vaše telo lahko na to vrsto zdravil hitro navadi, tako da vam takšno zdravilo ne bo več pomagalo,
- če ste starejša oseba. Benzodiazepine in podobna zdravila je treba pri starejših bolnikih uporabljati previdno zaradi tveganja za sedacijo in/ali oslabelost kosti in mišic, kar lahko povzroči padce, ki imajo pri tej populaciji pogosto resne posledice;
- če jemljete protibolečinsko zdravilo, ki vsebuje dekstropropoksifen. V kombinaciji z alprazolamom lahko povzroči težave z dihanjem.

Odvisnost

Uporaba zdravila Maprazax tablete lahko povzroči telesno in duševno odvisnost od zdravila. Če opazite, da imate težave pri prenehanju jemanja tega zdravila, ste morda od njega duševno odvisni. Telesna odvisnost pomeni, da se pri nenadni prekinitvi zdravljenja s tem zdravilom pojavijo odtegnitveni simptomi. Tveganje za odvisnost se povečuje z odmerkom in trajanjem zdravljenja. Da bi zmanjšali tveganja, mora biti odmerek zdravila čim manjši in trajanje zdravljenja čim krajše. Upoštevajte zdravnikova priporočila glede odmerjanja. Tveganje je večje tudi pri bolnikih, ki zlorablajo ali so v preteklosti zlorabljali alkohol in zdravila (glejte poglavje 3 »Če ste prenehali jemati zdravilo Maprazax«).

Zloraba

Zloraba zdravila je znano tveganje za to zdravilo (glejte poglavje 4). Če se to zdravilo zlorablja, lahko povzroči preveliko odmerjanje in smrt. Vedno upoštevajte zdravnikova priporočila glede odmerjanja. To zdravilo je lahko zahtevno pri ljudeh, ki zlorablajo zdravila na recept, in ga je potrebno hraniti nedostopno drugim ljudem.

Učinki na spomin

Med zdravljenjem z zdravilom Maprazax lahko pride do motenj spomina. To se običajno zgodi nekaj ur po zaužitju zdravila. Če opazite takšen simptom, se posvetujte z zdravnikom.

Učinki na razpoloženje

Zdravljenje z zdravilom Maprazax lahko poveča tveganje za hipomanijo ali manijo pri bolnikih z depresijo. Takoj se posvetujte z zdravnikom, če opazite simptome manije ali hipomanije.

Če imate depresijo, se lahko med jemanjem tega zdravila pojavijo misli o samopoškodovanju ali samomoru. Pred jemanjem zdravila Maprazax se posvetujte z zdravnikom.

Če je zdravljenje s tem zdravilom potrebno in ste depresivni ali ste v preteklosti razmišljali o samomoru ali samopoškodovanju, vas bo zdravnik skrbno spremljal. Če se vam kadar koli pojavijo misli o samopoškodovanju ali samomoru, se takoj posvetujte z zdravnikom ali pojdite v bolnišnico.

Pomembno je, da si dvakrat na dan umijete zobe z zobno kremo, ki vsebuje fluorid, ker lahko zdravilo Maprazax povzroči suha usta, kar lahko poškoduje vaše zobe, če ne vzdržujete ustne higijene.

Če kar koli od navedenega velja za vas ali če o tem niste prepričani, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Otroci in mladostniki

Uporaba zdravila Maprazax ni priporočljiva pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let.

Druga zdravila in zdravilo Maprazax

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Še zlasti povejte zdravniku, če jemljete:

- druga zdravila, ki imajo sedativni učinek in se uporabljajo pri zdravljenju tesnobe, depresije ali nespečnosti (npr. nefazodon, fluvoksamin, fluoksetin),
- zdravila za zdravljenje težav s spanjem,
- močne analgetike (npr. morfin, kodein ali dekstropropoksifen),
- zdravila za zdravljenje duševnih motenj, npr. shizofrenije (antipsihotiki, vključno s klopazinom),
- zdravila za zdravljenje epilepsije (npr. karbamazepin),
- zdravila za zdravljenje alergij (antihistaminiki),
- zdravila za zdravljenje okužb (rifampicin),
- zdravila za zdravljenje glivičnih okužb (npr. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, vorikonazol),
- zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb (npr. eritromicin, klaritromicin, telitromicin),
- zdravila za zdravljenje okužbe s HIV (zaviralci proteaze HIV, npr. ritonavir),
- zdravila za zdravljenje astme in bronhitisa (npr. teofilin),
- kontracepcijske tablete (za preprečevanje nosečnosti),
- digoksin (za zdravljenje bolezni srca),
- diltiazem (za zdravljenje visokega krvnega tlaka in bolezni srca),
- cimetidin, omeprazol (za zdravljenje razjede na želodcu in lajšanje zgage),
- mišične relaksante (pri kombiniranju z alprazolamom se lahko poveča učinek na relaksacijo mišic, kar poveča tveganje za padec),
- pripravke na osnovi šentjanževke.

Če imate načrtovan kirurški poseg v splošni anesteziji, zdravniku ali anesteziologu povejte, da jemljete zdravilo Maprazax tablete, ker bo morda potrebno prilagoditi odmere.

Tveganje pri sočasni uporabi z opioidi

Sočasna uporaba zdravila Maprazax in opioidov (močnih analgetikov, zdravil za nadomestno zdravljenje in nekaterih zdravil proti kašlju) poveča tveganje za zaspanost, težave z dihanjem (respiratorno depresijo) in komo, kar je lahko življenjsko ogrožajoče. Zato sočasna uporaba pride v poštev le, kadar druge možnosti zdravljenja niso možne.

Če vam zdravnik zdravilo Maprazax predpiše skupaj z opioidi, mora odmerek in trajanje sočasnega zdravljenja omejiti zdravnik.

Obvestite zdravnika o vseh opioidnih zdravilih, ki jih jemljete, in natančno upoštevajte njegova priporočila za odmerjanje. Priporočljivo bi bilo, da bi prijatelje ali sorodnike seznanili z zgoraj navedenimi znaki in simptomi. Ob takih simptomih se obrnite na zdravnika.

Zdravilo Maprazax skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Zdravilo Maprazax lahko jemljete s hrano ali brez nje.

Pomembno je, da med jemanjem zdravila Maprazax ne pijete alkohola, saj alkohol poveča sedativne učinke zdravila.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Izkušnje pri ljudeh kažejo, da bi to zdravilo lahko škodovalo nerojenemu otroku (povečano tveganje za malformacije, kot je razcep ustne votline). Zaradi morebitnega tveganja za otroka, med nosečnostjo ne

jemljite zdravila Maprazax, razen če vam je zdravnik predpisal drugače.

Med nosečnostjo se zdravilo Maprazax lahko uporablja šele, ko zdravnik ugotovi, da klinično stanje matere zahteva ustrezno zdravljenje in da koristi uporabe zdravila za mater odtehtajo tveganja za otroka.

Če uporabljate zdravilo Maprazax tablete vse do poroda, to povejte zdravniku, ker se lahko pri novorojenčku po rojstvu pojavijo odtegnitveni simptomi.

Dojenje

Zdravilo Maprazax prehaja v materino mleko, zato med zdravljenjem ne dojite.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Maprazax lahko povzroči zaspanost, vrtoglavico, izgubo spomina, poslabšano koncentracijo in oslabeledost mišic. Te težave so lahko izrazitejše, če ne spite dovolj.

Če opazite katerega koli od zgoraj navedenih neželenih učinkov, ne vozite in ne upravljajte strojev.

Zdravilo Maprazax vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred jemanjem tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Maprazax

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če je mogoče, naj zdravljenje začne, spremlja in konča isti zdravnik.

Zdravljenje se običajno začne z manjšim odmerkom, ki se nato po potrebi postopoma povečuje v skladu z navodili zdravnika.

Predpisanega odmerka nikoli ne spreminjajte sami. Pri starejših in občutljivih bolnikih se lahko pri jemanju večjih odmerkov pojavi zmedenost, zato vam bo zdravnik predpisal odmerek, prilagojen vaši starosti in splošnemu stanju.

Trajanje zdravljenja:

Tveganje za odvisnost se lahko poveča z odmerkom in trajanjem zdravljenja. Zdravnik bo zato predpisal najmanjši učinkovit odmerek in najkrajše trajanje zdravljenja ter pogosto ocenjeval potrebo po nadaljevanju zdravljenja (glejte poglavje 2 – Opozorila in previdnostni ukrepi).

Trajanje zdravljenja ne sme biti daljše od 2 do 4 tednov. Dolgotrajno zdravljenje ni priporočljivo.

Tesnoba

Začetni odmerek je od 0,25 mg do 0,5 mg trikrat na dan (skupno od 0,75 mg do 1,5 mg na dan). Pri starejših in občutljivih osebah bo zdravnik predpisal začetni odmerek 0,25 mg trikrat na dan (0,75 mg na dan). Če bo treba, bo zdravnik odmerek postopoma povečeval. Kot vzdrževalni odmerek se jemlje največ 0,5 mg do 3 mg na dan, razdeljen na več posameznih odmerkov.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Uporaba zdravila Maprazax ni priporočljiva pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let.

Zareza ni namenjena delitvi tablete.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Maprazax, kot bi smeli

Pomembno je, da ne vzamete več tablet, kot vam je bilo naročeno. Če pomotoma vzamete preveč tablet, se lahko pojavijo zaspanost, dremavost, zmedenost, izguba zavesti, oslabeledost mišic, motnja koordinacije

(ataksija), občutek mraza, nerazločen govor, padec krvnega tlaka, oteženo dihanje ter reakcije, kot so agresivnost, tesnoba, halucinacije in nemir. Če pomotoma vzamete preveč tablet, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Maprazax

Če pozabite vzeti odmerek, ga vzemite takoj, ko se spomnite, razen če je že čas za naslednji odmerek.

Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadomestili izpuščeni odmerek.

Če ste prenehali jemati zdravilo Maprazax

Preden se odločite prenehati uporabljati zdravilo Maprazax tablete, o tem povejte zdravniku, ker je treba odmerjanje tega zdravila zmanjševati postopoma. Pomembno je, da odmerek zdravila zmanjšate postopoma v dogovoru z zdravnikom. Zdravila Maprazax tablete ne prenehajte jemati nenadoma.

V primeru nenadnega prenehanja jemanja zdravila Maprazax tablete se lahko pojavijo odtegnitveni simptomi, kot so glavobol, bolečine v mišicah, tesnoba, nemir, zmedenost, razdražljivost in težave s spanjem. V hudih primerih se lahko pojavijo naslednji simptomi: sprememba zaznavanja resničnosti, sprememba stanja zavesti (občutek ločitve od lastnega telesa), togost in zbadanje v rokah in nogah, preobčutljivost na svetlobo, hrup in telesni stik, halucinacije ali epileptični krči (konvulzije). Ti simptomi se lahko pojavijo več dni po prenehanju jemanja tablet. Ob prenehanju zdravljenja s tem zdravilom se lahko simptomi, zaradi katerih je bila uporaba zdravila Maprazax tablete potrebna, ponovijo z večjo intenzivnostjo kot pred tem. Poleg navedenih simptomov se lahko pojavijo tudi nihanja razpoloženja.

Zdravnik bo zato odmerek, ko bo potrebno prenehanje zdravljenja, zmanjševal postopoma. Zmanjševanje odmerka je prilagojeno individualnim potrebam in je odvisno od več dejavnikov (npr. trajanja zdravljenja in vašega dnevnega odmerka). O postopnem zmanjševanju odmerka se posvetujte z zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega koli od naslednjih simptomov, se nemudoma posvetujte z zdravnikom, ker bo treba zdravljenje prenehati. Zdravnik vam bo povedal, kako postopoma zmanjšati odmerek in prenehati jemati zdravilo:

- otekanje vek, obraza ali ust, jezika ali žrela,
- nenadno piskanje v pljučih med dihanjem,
- težko požiranje ali dihanje,
- izpuščaj ali srbenje (zlasti, če je prizadeto celo telo).

Če opazite katerega koli od naslednjih simptomov, se čim prej posvetujte z zdravnikom, saj bo morda treba spremeniti odmerek zdravila ali zdravljenje:

- zlatenica (porumenelost kože in beločnic),
- reakcije, kot so hud nemir in vznemirjenost, agresija, nenadzorovan bes in razdražljivost, nočne more, nespečnost, halucinacije ali psihološka motnja, za katero so značilni moteno zaznavanje resničnosti (psihoza), iluzije, izguba spomina (amnezija), občutek zaspanosti (izrazita zaspanost in izguba ravnotežja), neprimerno vedenje ter druge vedenjske motnje. Te reakcije so pogostejše pri starejših ljudeh;
- depresija/depresivne misli.

Med zdravljenjem z zdravilom Maprazax se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki:

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov)

- depresija
- sedacija (zaspanost)
- huda zaspanost
- nenadzorovani gibi
- težave s spominom
- nerazločen govor
- omotica
- glavobol
- dremavost
- zaprtost
- suha usta
- utrujenost
- razdražljivost

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- zmanjšan apetit
- zmedenost in dezorientiranost
- spremembe spolne sle (pri moških in ženskah)
- tesnoba
- nespečnost
- živčnost
- motnje ravnotežja in koordinacije (podobne občutku zaspanosti), zlasti podnevi
- težave s koncentracijo
- nezmožnost ohranjanja pozornosti, počasnost, pomanjkanje volje in energije
- tresenje (tremor)
- vrtoglavica
- zamegljen vid
- navzea
- kožne reakcije
- spolna disfunkcija
- spremembe telesne mase (izguba ali povečanje telesne mase)

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- čezmerna telesna dejavnost in občutek izjemno vedrega razpoloženja (manija)
- halucinacije (slušno in vidno zaznavanje stvari, ki ne obstajajo)
- občutek jeze ali stiske
- izguba spomina (amnezija)
- mišična šibkost
- nezmožnost nadzora nad uriniranjem (inkontinenca)
- motnje menstruacijskega cikla
- bruhanje
- driska
- odvisnost od zdravila
- odtegnitveni simptomi

Neznana pogostnost (pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov)

- hiperprolaktinemija – stanje, pri katerem se lahko poveča koncentracija prolaktina v krvi (hormon, ki spodbuja tvorbo mleka v mlečnih žlezah)

- povečan apetit
- zmanjšan apetit
- blažja oblika manije
- agresivno/sovražno vedenje
- čuden način razmišljanja (nenormalno razmišljanje)
- psihomotorična hiperaktivnost
- vztrajno nehotno mišično trzanje, krči ali mišični gibi
- prebavne motnje
- oteženo požiranje
- vnetje jeter (hepatitis)
- poslabšano delovanje jeter
- zlatenica
- alergijsko stanje, ki povzroča nenadno in včasih hudo otekanje, ki običajno prizadene ustnice, usta, žrelo, dihala in oči (angioedem)
- alergijska kožna reakcija, ki jo povzroči izpostavljenost soncu
- zastajanje urina
- otekanje nog
- zvišan očesni tlak
- zmanjšana sposobnost reagiranja
- težave z govorom
- nizek krvni tlak
- zloraba zdravila

Pri občutljivejših posameznikih se lahko izrazi predhodno obstoječa depresija.

Odvisnost in odtegnitveni simptomi

Jemanje zdravil, kot je zdravilo Maprazax tablete (celo v terapevtskih odmerkih), lahko povzroči nastanek telesne in duševne zasvojenosti. Če je zdravljenje prekinjeno nenadoma, se lahko pojavijo odtegnitveni simptomi (glejte poglavje »Če ste prenehali jemati zdravilo Maprazax«).

Možnost za pojav odtegnitvenih simptomov je večja, če:

- se nenadoma prenehate zdraviti,
- jemljete večje odmerke,
- ste zdravilo jemali dolgo časa,
- ste nagnjeni k zlorabi drog ali alkohola.

Pojavi se lahko oslabeledost spomina, ki jo lahko spremlja neprimerno vedenje (glejte poglavje »Opozorila in previdnostni ukrepi«).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
 Sektor za farmakovigilanco
 Nacionalni center za farmakovigilanco
 Slovenčeva ulica 22
 SI-1000 Ljubljana
 tel.: +386 (0)8 2000 500
 faks: +386 (0)8 2000 510
 e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Maprazax

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila ni posebnih temperaturnih omejitev.
Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Maprazax

- Učinkovina je alprazolam. Ena tableta vsebuje 0,25 mg, 0,5 mg ali 1 mg alprazolama.
- Druge sestavine zdravila so: laktoza monohidrat, predgelirani škrob, polisorbit, krosповidon, povidon in magnezijev stearat.

Zdravilo Maprazax 0,5 mg tablete vsebuje tudi barvilo eritrozin (E127).

Zdravilo Maprazax 1 mg tablete vsebuje tudi barvili eritrozin (E127) in indigotin (E132).

Izgled zdravila Maprazax in vsebina pakiranja

Maprazax 0,25 mg tablete

Bele do skoraj bele, okrogle, bikonveksne tablete, z zarezo na eni strani in približnim premerom 7 mm.

Maprazax 0,5 mg tablete

Bledo rožnate, okrogle, bikonveksne tablete, z zarezo na eni strani in približnim premerom 7 mm.

Maprazax 1 mg tablete

Bledo vijoličaste, okrogle, bikonveksne tablete, z zarezo na eni strani in približnim premerom 7 mm.

Zareza ni namenjena delitvi tablete.

Zdravilo Maprazax tablete je pakirano v pretisnih omotih iz PVC/PVDC/aluminijaste folije.

Na voljo so škatle, ki vsebujejo 30, 90 ali 100 tablet v pretisnih omotih.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Maprazax

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija
tel.: +386 (0)1 300 42 90
faks: +386 (0)1 300 42 91
e-pošta: info@alkaloid.si

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Hrvaška	Maprazax 0,25 mg tablete Maprazax 0,5 mg tablete Maprazax 1 mg tablete
Bolgarija	Maprazax 0.25 mg tablets Maprazax 0.5 mg tablets Maprazax 1 mg tablets
Madžarska	Alprazolam Alkaloid-INT 0,25 mg tableta Alprazolam Alkaloid-INT 0,5 mg tableta Alprazolam Alkaloid-INT 1 mg tableta
Slovenija	Maprazax 0,25 mg tablete Maprazax 0,5 mg tablete Maprazax 1 mg tablete

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 2. 11. 2023.