

DEKSPANTENOL RAZTOPINA 50 mg/g, dermalna in oralna raztopina

dekspantenol

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu (pri vneti ali poškodovani sluznici ter poškodbah kože), se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

- Kaj je zdravilo Dekspantenol raztopina 50 mg/g (v nadaljevanju zdravilo Dekspantenol raztopina) in za kaj ga uporabljamo
- Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Dekspantenol raztopina
- Kako uporabljati zdravilo Dekspantenol raztopina
- Možni neželeni učinki
- Shranjevanje zdravila Dekspantenol raztopina
- Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO DEKSPANTENOL RAZTOPINA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Dekspantenol raztopina vsebuje dekspantenol, ki se v obliki raztopine hitro absorbira skozi kožo in sluznice, kjer se pretvori v pantotensko kislino. Pantotenska kislina je v vodi topen vitamin (B5), ki bistveno vpliva na tvorbo in obnovo kožnega epitelija, pospešuje celjenje ran in blaži vnetja.

Dekspantenol raztopino uporabljamo:

- pri vnetjih ustne, nosne in žrelne sluznice,
- pri manjših sončnih in drugih opeklinah, vneti koži ter manjših površinskih ranah in odrgninah,
- pri težavah z rastjo las.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO DEKSPANTENOL RAZTOPINA

Ne uporabljajte zdravila Dekspantenol raztopina:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) dekspantenol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če imate hemofilijo.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu (pri vneti ali poškodovani sluznici ter poškodbah kože), se morate posvetovati z zdravnikom.

Tega zdravila ne uporabljajte na globokih in umazanih ranah ali kožnih razjedah. Pri takšnih poškodbah poiščite zdravniško pomoč.

Pri uporabi tega zdravila pazite, da vam raztopina ne zaide v oči. Če raztopina vendarle pride v stik z očesno veznico, jo izmijte z vodo ali s fiziološko raztopino.

Otroci

O uporabi zdravila Dekspantenol raztopina pri otrocih se posvetujte z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Dekspantenol raztopina

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali, ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Poročil o medsebojnem delovanju zdravila Dekspantenol raztopina z drugimi zdravili ni.

Odsvetujemo sočasno uporabo tega zdravila z drugimi zdravili na obolenem predelu kože ali sluznice.

Zdravilo Dekspantenol raztopina skupaj s hrano in pijačo

Neposredno po uporabi tega zdravila na ustni sluznici ne uživajte hrane ali pijače, saj lahko ta pospeši odstranjevanje zdravila s sluznice.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite to zdravilo.

Ni poročil o škodljivih učinkih zdravila Dekspantenol raztopina med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Dekspantenol raztopina vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Dekspantenol raztopina vsebuje benzojsko kislino

To zdravilo vsebuje benzojsko kislino (E210), ki blago draži kožo, oči in sluznice.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO DEKSPANTENOL RAZTOPINA

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če zdravnik ne svetuje drugače, je običajen način uporabe in odmerjanje:

Pri vnetjih ustne in žrelne sluznice ali po puljenju zoba

- Raztopino grgrajte 2 do 3 minute večkrat na dan. Najmanj pol ure po uporabi zdravila ne uživajte hrane ali pijače, da le-ta ne bo pospešila odstranjevanja zdravila s sluznice ust in žrela.

Pri vnetju in poškodbah kože (manjše opekline, površinske rane, odrgnine)

- Raztopino razredčite z enakim delom neoporečne pitne vode (1:1) in takšno večkrat dnevno nanesite na obolelo mesto (lahko tudi v obliki vlažnih obkladkov).

Pri vnetju nosne sluznice

- Nosno sluznico večkrat dnevno orosite z nerazredčeno raztopino.

Pri težavah z rastjo las

- Lasišče navlažite z nerazredčeno raztopino ali raztopino razredčite z enakim delom vode oziroma 70-odstotnega etanola (1:1) in z rahlo masažo vtirite v lasišče. Lasišča po nanosu raztopine ne izpirajte.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Dekspantenol raztopina, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Dekspantenol raztopina, kot bi smeli in če se po prevelikem odmerku pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Poročil o prevelikem odmerjanju tega zdravila ni.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Dekspantenol raztopina

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek. Zdravilo uporabite, ko se spomnite. Če je že skoraj čas za naslednji odmerek, pozabljeni odmerek izpustite in zdravljenje nadaljujte v skladu z navodili.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zdravilo Dekspantenol raztopina lahko povzroči draženje kože in sluznic. Pogostnost pojavljanja teh neželenih učinkov ni znana.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli od neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetuje se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

- Tel.: 08 2000 500
- Faks: 08 2000 510
- E-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
- Spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA DEKSPANTENOL RAZTOPINA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

- Zdravilo shranjujte dobro zaprto v originalni ovojnini pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na steklenički in škatli poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjске odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Dekspantenol raztopina

Zdravilna učinkovina je: dekspantenol (Dexpanthenolum).
1 g raztopine vsebuje 50 mg dekspantenola.

Pomožne snovi so: benzojska kislina (E210), citronska kislina monohidrat, prečiščena voda.

Izgled zdravila in vsebina pakiranja

Dekspantenol raztopina je bistra, brezbarvna ali rahlo rumenkasta raztopina.

Pakiranje: škatla, v kateri je rjava steklenička s 130 g raztopine in navodilo za uporabo.

Način in režim izdaje zdravila Dekspantenol raztopina

Izdelek Dekspantenol raztopina je galensko zdravilo.

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Lekarne Maribor
Minařikova ulica 6
2000 Maribor



Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na proizvajalca: Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor.

- Tel.: 02 450 28 00
- E-pošta: info@mb-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano:

november 2023