

NAVODILO ZA UPORABO

ATENOLOL PLIVA 50 mg tablete

atenololum

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Atenolol Pliva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Atenolol Pliva
3. Kako jemati zdravilo Atenolol Pliva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Atenolol Pliva
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO ATENOLOL PLIVA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Farmacevtska oblika in način delovanja

Tablete zdravila Atenolol Pliva tablete 50 mg vsebujejo učinkovino atenolol, ki deluje na srce in ožilje in sodi v skupino zaviralcev receptorjev beta.

Zdravilo Atenolol Pliva se uporablja za zdravljenje hipertenzije (povišanega krvnega tlaka), angine pectoris (bolečine v prsih) in nekaterih aritmij (motenj srčnega ritma). Lahko se uporablja tudi za zgodnje zdravljenje miokardnega infarkta (srčnega napada).

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO ATENOLOL PLIVA

Ne jemljite zdravila Atenolol Pliva

- če ste alergični (preobčutljivi) na atenolol ali katerokoli sestavino zdravila Atenolol Pliva;
- če imate ali ste imeli nenadzorovano srčno popuščanje, srčni blok, zelo počasno ali zelo nepravilno bitje srca;
- če imate zelo nizek krvni tlak ali zelo slabo prekrvitev;
- če vam je zdravnik povedal, da imate nezdravljen feokromocitom (tumor, običajno ob ledvici, ki povzroča zvišan krvni tlak);
- če vam je zdravnik povedal, da imate metabolno acidozo (nenormalno koncentracijo kisline v krvi).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Atenolol Pliva

Svojemu zdravniku povejte, če katera od naslednjih trditev velja za vas.

- Imate astmo ali dobite alergijsko reakcijo, npr. na pik žuželke. Če ste že kdaj imeli astmo ali vam je piskalo v pljučih, zdravila Atenolol Pliva ne smete jemati, če se niste o teh simptomih pogovorili z zdravnikom, ki vam je prvi predpisal to zdravilo.
- Imate bolečine v prsih tipa Prinzmetalove angine.
- Imate slabo prekrvitev, nadzorovano srčno popuščanje ali srčni blok prve stopnje.
- Imate sladkorno bolezen, saj lahko zdravilo Atenolol Pliva spremeni normalen odziv telesa na nizko koncentracijo sladkorja v krvi, pri čemer se običajno poveča srčni utrip.
- Imate tirotoksikozo (bolezensko stanje, ki je posledica prevelike aktivnosti žleze ščitnice), saj lahko zdravilo Atenolol Pliva zakrije njene simptome.
- Imate ledvično bolezen. Morda bodo med zdravljenjem z zdravilom Atenolol Pliva potrebni dodatni pregledi.
- Ste starejši bolnik. Na začetku bodo morda potrebni manjši odmerki.

V primeru, da po jemanju zdravila Atenolol Pliva opazite zmanjšanje srčnega utripa, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Svojemu zdravniku povejte, če imate v bolnišnici napovedan kirurški poseg. Medicinsko osebje, predvsem anesteziologi (če imate napovedan kirurški poseg) morajo biti obveščeni o vašem jemanju zdravila Atenolol Pliva.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Zdravilo Atenolol Pliva lahko vpliva na delovanje drugih zdravil in obratno. Zdravila, ki bi lahko povzročila določene težave pri sočasni uporabi, so:

- verapamil, diltiazem in nifedipin (za zdravljenje hipertenzije in angine pektoris),
- dizopiramid, kinidin ali amiodaron (za zdravljenje aritmij),
- digoksin (pri srčni odpovedi),
- adrenalin (srčni stimulans),
- ibuprofen in indometacin (proti bolečinam in vnetju),
- insulin in peroralni antidiabetiki (za zdravljenje sladkorne bolezni),
- anestetiki.

Obvestite svojega zdravnika, če jemljete zdravilo klonidin (za zdravljenje hipertenzije in migrene). Pri sočasnem jemanju klonidina in zdravila Atenolol Pliva ne smete prenehati z jemanjem klonidina, dokler vam to ne svetuje zdravnik oziroma vam da natančna navodila, kako to storiti.

Jemanje zdravila Atenolol Pliva skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Atenolol Pliva lahko jemljete skupaj s hrano in pijačo.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Zdravilo Atenolol Pliva prehaja skozi posteljico. Če ste noseči ali bi lahko zanosili, o tem obvestite svojega zdravnika. V prvem in drugem trimesečju nosečnosti lahko zdravilo povzroči zmanjšano prekrvavitev posteljice, kar lahko povzroči smrt ploda v maternici,

nezrelost novorojenčka ali prezgodnji porod. V tretjem trimesečju je uporaba zdravila Atenolol Pliva možna le ob strogem zdravniškem nadzoru.

Zdravilo Atenolol Pliva se kopiči v materinem mleku, zato je potrebna previdnost.

Novorojenčki mater, ki so ob porodu ali med dojenjem prejemale atenolol, so izpostavljeni povečanemu tveganju za majhno koncentracijo sladkorja v krvi (hipoglikemija) in upočasnjeno bitje srca (bradikardija).

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Atenolol Pliva najverjetneje ne bo vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, upoštevati pa je potrebno občasen pojav omotice ali utrujenosti. Če se vam to zgodi, se posvetujte z zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO ATENOLOL PLIVA

Pri jemanju zdravila Atenolol Pliva natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravilo Atenolol Pliva pogoltnite s tekočino. Zdravnik vam bo povedal, kdaj in koliko tablet morate vzeti glede na vaše zdravstveno stanje.

Običajni odmerki za odrasle

Za zdravljenje hipertenzije (zvišanega krvnega tlaka) je običajni odmerek od 50 do 100 mg na dan.

Za zdravljenje angine pectoris (bolečine v prsih) je običajni odmerek 100 mg enkrat na dan ali 50 mg dvakrat na dan.

Za zdravljenje aritmij (nerednega bitja srca) je običajni odmerek od 50 do 100 mg na dan.

Za zdravljenje miokardnega infarkta (nenadno hudo poslabšanje ali prenehanje srčne funkcije) je odmerek 15 minut po intravenski aplikaciji (5–10 minut; 1 mg/minuto) 50 mg, 12 ur po intravenski aplikaciji 50 mg, nato pa po 12 urah še 100 mg enkrat dnevno.

Starostniki

Lahko so potrebni manjši odmerki, še zlasti pri bolnikih z okvaro ledvic.

Otroci

Izkušenj z atenololom pri otrocih ni, zato se njegova uporaba pri njih ne priporoča.

Odmerjanje pri okvari ledvic

Atenolol se izloča preko ledvic, zato je potrebno bolnikom s hudo okvaro ledvic prilagoditi odmerek.

Bolniki na hemodializi morajo prejeti 50 mg peroralno po vsaki dializi. Zdravilo je potrebno aplicirati v bolnišnici, saj lahko aplikaciji sledi izrazit padec krvnega tlaka.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Atenolol Pliva, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte s svojim zdravnikom ali pa pojdite na urgentni oddelek najbližje bolnišnice. S seboj morate vzeti tudi škatlo s preostalimi tabletami, da bo zdravstveno osebje vedelo, kaj točno ste zaužili.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Atenolol Pliva

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Če ste pozabili vzeti odmerek, ga vzemite takoj, ko se spomnite, naslednji odmerek pa ob običajnem času.

Če ste prenehali jemati zdravilo Atenolol Pliva

Zdravila Atenolol Pliva ne smete prenehati jemati brez posveta z zdravnikom. V nekaterih primerih je potrebno zdravilo Atenolol Pliva ukiniti postopoma. V času ukinjanja zdravila je potrebno bolnika, zlasti bolnika z ishemično boleznijo srca, spremljati.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Atenolol Pliva neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki so navedeni po pogostnosti.

Pogostnost je definirana kot:

- zelo pogosti: pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov;
- pogosti: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov;
- občasni: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov;
- redki: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov;
- zelo redki: pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov;
- neznan pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti.

Če imate katero od spodaj naštetih motenj, se ta po uvedbi zdravila Atenolol Pliva lahko poslabša:

- psoriaza,
- srčna odpoved,
- astma ali težave z dihanjem,
- slab krvni obtok.

Pogosti neželeni učinki:

- hladne dlani in stopala,
- utrujenost,
- prebavne motnje (driska, slabost),
- počasno bitje srca.

Občasni neželeni učinki:

- glavobol,
- omotica (še posebej ob naglem vstajanju),
- mravljinici v dlaneh,
- motnje spanja,
- zvišanje jetrnih encimov v krvi.

Redki neželeni učinki:

- suha usta,
- izpadanje las,
- spremembe razpoloženja,
- nočne more,
- zmedenost,
- psihoze ali halucinacije,
- rdečkasto obarvane drobne lise in pike na koži,
- nagnjenost k modricam,
- suha očesna sluznica, motnje vida,
- izbruh psoriaze, kožni izpuščaji,
- zlatenica (rumena koža ali očesne beločnice),
- impotenca,
- padec krvnega tlaka ob naglem vstajanju,
- odrevenelost in krči v prstih (Raynaudov sindrom),
- poslabšanje srčnega popuščanja, srčni zastoj (ki lahko povzroči nenormalno bitje srca, omotico ali padec v nezavest),
- bronhospazem pri bolnikih z astmo.

Zelo redki neželeni učinki:

- zvišanje protiteles proti celičnemu jedru (ANA) v krvi.

Neželeni učinki neznane pogostnosti:

- alergijske reakcije, vključno z angioedemom in koprivnico.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA ATENOLOL PLIVA

ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM!

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Atenolol Pliva

Zdravilna učinkovina je atenolol.

Pomožne snovi so: mikrokristalna celuloza (E436), karbomeri, natrijev karmelozat (E466), natrijev lavrilsulfat, kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, brezvoden koloidni silicijev dioksid (E551), smukec (E553b), hidrogenirano rastlinsko olje (tip I), magnezijev stearat (E572).

Izgled zdravila Atenolol Pliva in vsebina pakiranja

Ena tableta zdravila Atenolol Pliva tablete 50 mg vsebuje 50 mg atenolola.

Atenolol Pliva 50 mg tablete so bele do sivkaste, enobarvne ali marmorirane, zaobljene tablete, premera 8 mm, z zarezo na eni strani in vtisnjenim P na drugi strani.

Tableta se lahko deli na enaki polovici.

Škatla s 30 tabletami. V škatli so trije pretisni omoti po deset tablet.

Način in režim zdaje zdravila Atenolol Pliva

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

PLIVA LJUBLJANA d. o. o.

Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana Črnuče

Izdelovalec

PLIVA LJUBLJANA d. o. o.

Pot k sejmišču 35

1231 Ljubljana Črnuče

Pliva Krakow S.A

Mogilska 80

31546 Krakow, Poljska

TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd. Co.

H-4042 Debrecen,

Pallagi ut 13, Madžarska

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Pliva Ljubljana d.o.o.

Pot k sejmišču 35

SI-1231 Ljubljana Črnuče

tel.: +386 1 58 90 390

Navodilo je bilo odobreno

05.10.2010